

ОСНОВНЫЕ ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЧАСТЬ I. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА

УДК 517.587:519.216

Прохоров С.А., Куликовских И.М. Основные ортогональные функции и их приложения. Часть I. Ортогональные функции экспоненциального типа. – Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2013. – 200 с.

ISBN 978-5-93424-652-6

В первой части предлагаемой монографии рассматриваются ортогональные функции экспоненциального типа.

Структура монографии разработана с учетом дальнейшего приложения к построению математических моделей через разложение в ряды Фурье и охватывает следующие вопросы: аналитические, фазовые, интегральные представления, основные и расширенные свойства во временной и частотной областях, рекуррентные соотношения, соотношения взаимосвязи базисных функций, обобщенные характеристики ортогональных функций.

Печатается по решению издательского совета Самарского научного центра РАН

ISBN 978-5-93424-652-6

© Прохоров С.А., 2013
© Куликовских И.М., 2013

Предисловие

Вашему вниманию предлагается первая часть монографии по основным ортогональным функциям и их приложениям. Эта работа по-своему уникальна, потому как ориентирована, в первую очередь, на конкретного читателя - прикладного математика и программиста - для создания адекватных моделей, оптимальных алгоритмов и написания исходного кода с минимальными вычислительными и ресурсными затратами при решении частных задач. Тем не менее математический аппарат, положенный в основу работы, - теория ортогональных многочленов и рядов Фурье - имеет большой теоретический интерес. Поэтому авторы надеются, что данная работа будет интересна более широкой аудитории.

Под основными ортогональными функциями экспоненциального типа, отраженными в названии работы, на данном этапе, понимаются классические обобщенные многочлены Лагерра $L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)$, многочлены Якоби $P_k^{(\alpha, \beta)}(\tau, \gamma)$, заданные на интервале $\tau \in [0, \infty)$ с использованием соответствующей замены экспоненциального типа и введением варьируемого параметра масштаба γ . Математическим аспектам определения функций экспоненциального типа и их свойствам значительно больше внимания уделено в тексте монографии в соответствующих разделах. Главным образом ортогональные функции экспоненциального типа предназначены для приближения функций $f(\tau)$, заданной на положительной полуоси $\tau \in [0, \infty)$, для которой справедливо

$$\arg(\max(f(\tau))) = 0; \lim_{\tau \rightarrow \infty} f(\tau) \rightarrow 0; \int_0^{\infty} (f(\tau))^2 \mu(\tau, \gamma) d\tau < \infty.$$

Вопросы, касающиеся построения моделей $f(\tau)$ и их разложения в ряды Фурье, а также разработки соответствующих алгоритмов оптимизации при решении задач приближения, будут рассмотрены в последующих главах.

Структура предлагаемой части монографии разработана с учетом дальнейшего приложения к построению математических моделей через разложение в ряды Фурье. В целом первая часть работы охватывает следующие вопросы:

- аналитическое представление во временной области;
- основные и расширенные свойства во временной области;
- основные и расширенные соотношения ортогональности во временной области;
- фазовое представление ортогональных функций;
- интегральное представление ортогональных функций;
- аналитическое представление в частотной области;

- основные и расширенные свойства в частотной области;
- основные и расширенные соотношения ортогональности в частотной области;
- рекуррентные соотношения;
- соотношения взаимосвязи базисных функций;
- обобщенные характеристики ортогональных функций;
- соотношения неопределенности.

Каждый из приведенных разделов содержит следующие этапы:

- определение;
- последовательность нумерованных формул:
 - частные случаи 0-5 порядков;
 - графическая интерпретация частных случаев при заданных параметрах.

На сегодняшний день насчитывается большое число справочников, посвященных описанию специальных функций и ортогональных многочленов. Среди наиболее распространенных следующие: I.S. Gradshteyn, I.M. Ryzhik «Table of Integrals, Series, and Products» (2007); Y.A. Brychkov «Handbook of Special Functions: Derivatives, Integrals, Series and Other Formulas»(2008); NIST Handbook of mathematical functions (2010); М. Абрамовиц, И. Стиган «Справочник по специальным функциям»(1979); А.П. Прудников, Ю.А. Брычков, О.И. Маричев «Интегралы и ряды»(т. 2,3) (1983).

В свою очередь авторы хотели бы обратить внимание в предлагаемой монографии на класс анализируемых функций и на специфику конечных формул, что несомненно определяет их новизну. Более того, в рамках данной работы введен ряд новых понятий и определений, которые имеют значительный практический интерес и расширяют теорию ортогональных многочленов в целом.

На данный момент неоднократно проводилась аprobация предлагаемых в монографии формул для построения математических моделей как для создания масштабных проектов - систем «Data Mining», где требуется одновременная обработка больших потоков данных, так и для создания актуальных на данном этапе развития информационных технологий - мобильных приложений на базе таких платформ как iOS, Android, и т.д., основными требованиями которых являются сниженные ресурсные затраты, высокая скорость выполнения операций и низкие требования к объему используемой памяти.

Структура монографии, способ представления материала, фактический материал и графические интерпретации являются исключительно авторскими.

Авторы выражают большую признательность к.ф.-м.н. Л.П. Усольцеву за ценные замечания и внимательное отношение к работе на различных этапах ее формирования.

С.А. Прохоров
И.М. Куликовских

Содержание

Предисловие	3
I ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА	7
1 Аналитические представления во временной области	9
1.1 Аналитические соотношения для ортогональных функций	10
1.2 Аналитические соотношения для производных ортогональных функций	15
1.3 Аналитические соотношения для неопределенных интегралов от ортогональных функций	41
2 Основные и расширенные свойства во временной области	83
3 Основные и расширенные соотношения ортогональности во временной области	85
3.1 Основные соотношения ортогональности	85
3.2 Расширенные соотношения ортогональности	90
4 Фазовые представления ортогональных функций	105
5 Интегральные представления ортогональных функций	111
6 Аналитические представления в частотной области	115
6.1 Преобразование Фурье ортогональных функций	115
6.2 Преобразование Фурье ортогональных фильтров	123
6.3 Преобразование Фурье производных ортогональных функций	131
6.4 Производные преобразований Фурье ортогональных функций	140
6.5 Производные преобразований Фурье ортогональных фильтров	150
7 Основные и расширенные свойства в частотной области	163

8 Основные и расширенные соотношения ортогональности в частотной области	165
8.1 Основные соотношения ортогональности	165
8.2 Расширенные соотношения ортогональности	169
9 Рекуррентные соотношения	175
9.1 Рекуррентные соотношения для ортогональных функций	175
9.2 Рекуррентные соотношения для производных ортогональных функций	176
9.3 Рекуррентные соотношения для неопределенных интегралов от ортогональных функций	177
9.4 Рекуррентные соотношения для преобразований Фурье	179
10 Соотношения взаимосвязи базисных функций	181
10.1 Соотношения взаимосвязи ортогональных функций	181
10.2 Соотношения взаимосвязи ортогональных функций и производных ортогональных функций	182
10.3 Соотношения взаимосвязи ортогональных функций и неопределенных интегралов от ортогональных функций	183
10.4 Соотношения взаимосвязи преобразований Фурье	183
11 Обобщенные характеристики ортогональных функций	185
11.1 Длительности ортогональных функций во временной области	186
11.2 Моментные характеристики ортогональных функций во временной области	186
11.3 Длительности ортогональных функций в частотной области	189
11.4 Моментные характеристики ортогональных функций в частотной области	190
12 Соотношения неопределенности	195
Список использованных источников	195

Часть I

ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА

Глава 1

Аналитические представления во временной области

Определение.

Классические ортогональные многочлены $\psi_k(x)$ являются решением дифференциального уравнения [2, 4, 13, 18]

$$(ax^2 + bx + c)\psi_k''(x) + (dx + e)\psi_k'(x) - k(d + (k - 1)a)\psi_k(x) = 0$$

и при заданных параметрах данного уравнения имеем три основных класса многочленов: Якоби, обобщенные Лагерра и Эрмита. Остановимся на рассмотрении ортогональных многочленов Якоби $P_k^{(\alpha,\beta)}(x)$ и обобщенных многочленов Лагерра $L_k^{(\alpha)}(x)$ [2, 4, 13, 16, 17, 19].

Если $a = -1$, $b = 0$, $c = 1$, $d = -\alpha - \beta - 2$ и $e = -\alpha + \beta$, и имеем ортогональные многочлены Якоби [13, 16]

$$P_k^{(\alpha,\beta)}(x) = \frac{(-1)^k}{k!2^k}(1-x)^{-\alpha}(1+x)^{-\beta} \frac{d^k((1-x)^{\alpha+k}(1+x)^{\beta+k})}{dx^k}$$

с весовой функцией $\mu^{\{P_k^{(\alpha,\beta)}(x)\}}(x) = (1-x)^\alpha(1+x)^\beta$, удовлетворяющие условию

$$\int_{-1}^1 P_k^{(\alpha,\beta)}(x)P_n^{(\alpha,\beta)}(x)\mu^{\{P_k^{(\alpha,\beta)}(x)\}}(x)dx = \frac{2^{\alpha+\beta+1}\Gamma(\alpha+k+1)\Gamma(\beta+k+1)}{k!(\alpha+\beta+2k+1)\Gamma(\alpha+\beta+k+1)}\delta_{k,n},$$

где $\delta_{k,n}$ – символ Кроненкера. При $k = n$ последнее соотношение имеет вид $\|P_k^{(\alpha,\beta)}\|^2$ и называется нормой ортогональных функций Якоби.

Если $a = 0$, $b = 1$, $c = 0$, $d = -1$ и $e = \alpha + 1$, имеем обобщенные ортогональные многочлены Лагерра [13, 16]

$$L_k^{(\alpha)}(x) = (-1)^k x^{-\alpha} e^x \frac{d^k(x^{\alpha+k} e^{-x})^k}{dx^k}$$

с весовой функцией $\mu^{\{L_k^{(\alpha)}(x)\}}(x) = x^\alpha e^{-x}$, удовлетворяющие условию

$$\int_0^\infty L_k^{(\alpha)}(x)L_n^{(\alpha)}(x)\mu^{\{L_k^{(\alpha)}(x)\}}(x)dx = k!\Gamma(\alpha+k+1)\delta_{k,n}.$$

При $k = n$ вышеприведенное соотношение обозначается $\|L_k^{(\alpha)}\|^2$ и называется нормой обобщенных ортогональных функций Лагерра.

В последующем ортогональные многочлены $\psi_k(x)$, заданные на интервале $[0, \infty)$ с использованием замены экспоненциального типа, определим как ортогональные функции экспоненциального типа $\psi_k(\tau, \gamma)$.

Замены переменных аргумента $x = f(\tau, \gamma)$, позволяющие определить функции Якоби и обобщенные функции Лагерра [3, 9] представлены в таблице ниже.

Название многочлена	Обозначение $\psi_k(\tau, \gamma)$	Замена аргумента $x = f(\tau, \gamma)$
Обобщенные Лагерра	$L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)$	$x = \gamma\tau$
Якоби	$P_k^{(\alpha, \beta)}(\tau, \gamma)$	$x = 1 - 2 \exp(-c\gamma\tau)$

1.1 Аналитические соотношения для ортогональных функций

$$[1.1] \quad L_k(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \frac{(-\gamma\tau)^s}{s!} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$L_0(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$

$$L_1(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(1 - \gamma\tau);$$

$$L_2(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^2\tau^2 - 4\gamma\tau + 2)/2;$$

$$L_3(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(6 - 18\gamma\tau + 9\gamma^2\tau^2 - \gamma^3\tau^3)/6;$$

$$L_4(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^4\tau^4 - 16\gamma^3\tau^3 + 72\gamma^2\tau^2 - 96\gamma\tau + 24)/24;$$

$$L_5(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(120 - 600\gamma\tau + 600\gamma^2\tau^2 - 200\gamma^3\tau^3 + 25 \times \gamma^4\tau^4 - \gamma^5\tau^5)/120.$$




Рис. 1.1. Вид ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4$

$$[1.2] \quad L_k^{(1)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \frac{(-\gamma\tau)^s}{s!} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$L_0^{(1)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$

$$L_1^{(1)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(2 - \gamma\tau);$$

$$L_2^{(1)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^2\tau^2 - 6\gamma\tau + 6)/2;$$

$$L_3^{(1)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(24 - 36\gamma\tau + 12\gamma^2\tau^2 - \gamma^3\tau^3)/6;$$




Рис. 1.2. Вид ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4, \alpha = 1$

$$[1.3] \quad L_k^{(2)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \frac{(-\gamma\tau)^s}{s!} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$L_0^{(2)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$


$$L_1^{(2)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(3 - \gamma\tau);$$

$$L_2^{(2)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^2\tau^2 - 8\gamma\tau + 12)/2;$$

$$L_3^{(2)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(60 - 60\gamma\tau + 15\gamma^2\tau^2 - \gamma^3\tau^3)/6;$$

$$L_4^{(2)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^4\tau^4 - 24\gamma^3\tau^3 + 180\gamma^2\tau^2 - 480\gamma\tau + 360)/24;$$

$$L_5^{(2)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(2520 - 4200\gamma\tau + 2100\gamma^2\tau^2 - 420\gamma^3\tau^3 + 35\gamma^4\tau^4 - \gamma^5\tau^5)/120.$$

Рис. 1.3. Вид ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4$, $\alpha = 2$

$$[1.4] \quad L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{s} \frac{(-\gamma\tau)^s}{s!} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:


$$L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$

$$L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\alpha + 1 - \gamma\tau);$$

$$L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma) = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^2\tau^2 - 2(\alpha + 2)\gamma\tau + (\alpha + 1)(\alpha + 2));$$

$$L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma) = \frac{1}{6} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)((\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha + 3) - 3(\alpha + 2) \times \\ \times (\alpha + 3)\gamma\tau + 3(\alpha + 3)\gamma^2\tau^2 - \gamma^3\tau^3));$$

$$L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma) = \frac{1}{24} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^4\tau^4 - 4(\alpha + 4)\gamma^3\tau^3 + 6(\alpha + 3) \times \\ \times (\alpha + 4)\gamma^2\tau^2 - 4(\alpha + 2)(\alpha + 3)(\alpha + 4)\gamma\tau + (\alpha + 1)(\alpha + 2) \times \\ \times (\alpha + 3)(\alpha + 4));$$

$$L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma) = \frac{1}{120} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)((\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha + 3)(\alpha + 4) \times \\ \times (\alpha + 5) - 5(\alpha + 2)(\alpha + 3)(\alpha + 4)(\alpha + 5)\gamma\tau + 10(\alpha + 3)(\alpha + 4) \times \\ \times (\alpha + 5)\gamma^2\tau^2 - 10(\alpha + 4)(\alpha + 5)\gamma^3\tau^3 + 5(\alpha + 5)\gamma^4\tau^4 - \gamma^5\tau^5).$$
Рис. 1.4. Вид ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 4$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (0; 5]$, $\alpha = 1$

$$[1.5] \quad P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \times \\ \times \exp\left(-\frac{(4s+1)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$P_0^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$

$$P_1^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(1 - 3 \exp(-2\gamma\tau))/2;$$

$$P_2^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(3 - 30 \exp(-2\gamma\tau) + 35 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau))/8;$$

$$P_3^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(5 - 105 \exp(-2\gamma\tau) + 315 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) - 231 \exp(-6\gamma\tau))/16;$$

$$P_4^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(35 - 1260 \exp(-2\gamma\tau) + 6930 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) - 12012 \exp(-6\gamma\tau) + 6435 \exp(-8\gamma\tau))/128;$$

$$P_5^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(63 - 3465 \exp(-2\gamma\tau) + 15015 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) - 45045 \exp(-6\gamma\tau) + 109395 \exp(-8\gamma\tau) - 46189 \times \\ \times \exp(-10\gamma\tau))/256.$$




Рис. 1.5. Вид ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1, c = 2, \alpha = -1/2, \beta = 0$

$$[1.6] \quad Leg_k(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$Leg_0(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau);$$

$$Leg_1(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(1 - 2 \exp(-2\gamma\tau));$$

$$Leg_2(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(1 - 6 \exp(-2\gamma\tau) + 6 \exp(-4\gamma\tau));$$

$$Leg_3(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(1 - 12 \exp(-2\gamma\tau) + 30 \exp(-4\gamma\tau) - 20 \exp(-6\gamma\tau));$$

$$Leg_4(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(1 - 20 \exp(-2\gamma\tau) + 90 \exp(-4\gamma\tau) - 140 \exp(-6\gamma\tau) + 70 \exp(-8\gamma\tau));$$

$$Leg_5(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(1 - 30 \exp(-2\gamma\tau) + 210 \exp(-4\gamma\tau) - 560 \exp(-6\gamma\tau) + 630 \exp(-8\gamma\tau) - 252 \exp(-10\gamma\tau)).$$




Рис. 1.6. Вид ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 1, c = 2$

$$[1.7] \quad P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \times \exp\left(-\frac{(4s+3)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right);$$

$$P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(3 - 5 \exp(-2\gamma\tau))/2;$$

$$P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) = \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(15 - 70 \exp(-2\gamma\tau) + 63 \times \exp(-4\gamma\tau))/8;$$

$$\begin{aligned} P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) &= \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(35 - 315 \exp(-2\gamma\tau) + 693 \times \exp(-4\gamma\tau) - 429 \exp(-6\gamma\tau))/16; \\ P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) &= \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(315 - 4620 \exp(-2\gamma\tau) + 18018 \times \exp(-4\gamma\tau) - 25740 \exp(-6\gamma\tau) + 12155 \exp(-8\gamma\tau))/128; \\ P_5^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) &= \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(693 - 15015 \exp(-2\gamma\tau) + 45045 \times \exp(-4\gamma\tau) - 218790 \exp(-6\gamma\tau) + 230945 \exp(-8\gamma\tau) - 88179 \times \exp(-10\gamma\tau))/256. \end{aligned}$$




Рис. 1.7. Вид ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1, c = 2, \alpha = 1/2, \beta = 0$

$$[1.8] \quad P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \times \exp(-(s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau);$$

$$P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(2 - 3 \exp(-\gamma\tau));$$

$$P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(3 - 12 \exp(-\gamma\tau) + 10 \exp(-2\gamma\tau));$$

$$P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(4 - 30 \exp(-\gamma\tau) + 60 \exp(-2\gamma\tau) - 35 \exp(-3\gamma\tau));$$

$$P_4^{(1,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(5 - 60 \exp(-\gamma\tau) + 210 \exp(-2\gamma\tau) - 280 \exp(-3\gamma\tau) + 126 \exp(-4\gamma\tau));$$

$$P_5^{(1,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(6 - 105 \exp(-\gamma\tau) + 560 \exp(-2\gamma\tau) - 1260 \exp(-3\gamma\tau) + 1260 \exp(-4\gamma\tau) - 462 \exp(-5\gamma\tau)).$$




Рис. 1.8. Вид ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1, c = 1, \alpha = 1, \beta = 0$

$$[1.9] \quad P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \times \\ \times \exp(-(2s+3)\gamma\tau).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-3\gamma\tau);$$

$$P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-3\gamma\tau)(3 - 4 \exp(-2\gamma\tau));$$

$$P_2^{(2,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-3\gamma\tau)(6 - 20 \exp(-2\gamma\tau) + 15 \exp(-4\gamma\tau));$$

$$P_3^{(2,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-3\gamma\tau)(10 - 60 \exp(-2\gamma\tau) + 105 \times$$

$$\times \exp(-4\gamma\tau) - 56 \exp(-6\gamma\tau));$$

$$P_4^{(2,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(15 - 140 \exp(-2\gamma\tau) + 420 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) - 504 \exp(-6\gamma\tau) + 210 \exp(-8\gamma\tau));$$

$$P_5^{(2,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(21 - 280 \exp(-2\gamma\tau) + 1260 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) - 2520 \exp(-6\gamma\tau) + 2310 \exp(-8\gamma\tau) - 792 \times \\ \times \exp(-10\gamma\tau)).$$




Рис. 1.9. Вид ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1, c = 2, \alpha = 2, \beta = 0$

$$[1.10] \quad P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \times \\ \times \exp(-(2s+\alpha+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$P_0^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-(c\gamma\tau)/2);$$

$$P_1^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-(c\gamma\tau)/2)(\alpha+1-(\alpha+2)\exp(-c\gamma\tau));$$

$$P_2^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-(c\gamma\tau)/2)((\alpha+1)(\alpha+2)-2(\alpha+2) \times \\ \times (\alpha+3)\exp(-c\gamma\tau)+(\alpha+3)(\alpha+4)\exp(-2c\gamma\tau))/2;$$

$$P_3^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-(c\gamma\tau)/2)((\alpha+1)(\alpha+2)(\alpha+3)- \\ -3(\alpha+2)(\alpha+3)(\alpha+4)\exp(-c\gamma\tau)+3(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5) \times \\ \times \exp(-2c\gamma\tau)-(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)\exp(-3c\gamma\tau))/6;$$

$$P_4^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-(c\gamma\tau)/2)((\alpha+1)(\alpha+2)(\alpha+3) \times \\ \times (\alpha+4)-4(\alpha+2)(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)\exp(-c\gamma\tau)+6(\alpha+3) \times \\ \times (\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)\exp(-2c\gamma\tau)-4(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6) \times \\ \times (\alpha+7)\exp(-3c\gamma\tau)+(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8) \times \\ \times \exp(-4c\gamma\tau))/24;$$

$$P_5^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) = \exp(-(c\gamma\tau)/2)((\alpha+1)(\alpha+2)(\alpha+3) \times \\ \times (\alpha+4)(\alpha+5)-5(\alpha+2)(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6) \times \\ \times \exp(-c\gamma\tau)+10(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7) \times \\ \times \exp(-2c\gamma\tau)-10(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8) \times \\ \times \exp(-3c\gamma\tau)+5(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8)(\alpha+9) \times \\ \times \exp(-4c\gamma\tau)-(\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8)(\alpha+9)(\alpha+10) \times \\ \times \exp(-5c\gamma\tau))/120.$$





Рис. 1.10. Вид ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 1, c = 2, \alpha \in [0; 5], \beta = 0$; б) $\gamma \in (0; 2], c = 2, \alpha = 1, \beta = 0$



$$[1.11] \quad P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \times \\ \times \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau);$$

$$P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma) = \exp(-\gamma\tau)(1 - 3 \exp(-2\gamma\tau));$$

$$\begin{aligned}
 P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma) &= \exp(-\gamma\tau)(1 - 8\exp(-2\gamma\tau) + 10\exp(-4\gamma\tau)); \\
 P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma) &= \exp(-\gamma\tau)(1 - 15\exp(-2\gamma\tau) + 45\exp(-4\gamma\tau) - \\
 &- 35\exp(-6\gamma\tau)); \\
 P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma) &= \exp(-\gamma\tau)(1 - 24\exp(-2\gamma\tau) + 126\exp(-4\gamma\tau) - \\
 &- 224\exp(-6\gamma\tau) + 126\exp(-8\gamma\tau)); \\
 P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma) &= \exp(-\gamma\tau)(1 - 35\exp(-2\gamma\tau) + 280\exp(-4\gamma\tau) - \\
 &- 840\exp(-6\gamma\tau) + 1050\exp(-8\gamma\tau) - 462\exp(-10\gamma\tau)).
 \end{aligned}$$




Рис. 1.11. Вид ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1, c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$

$$[1.12] \quad P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \times \\
 \times \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
 P_0^{(0,2)}(\tau, \gamma) &= \exp(-\gamma\tau); \\
 P_1^{(0,2)}(\tau, \gamma) &= \exp(-\gamma\tau)(1 - 4\exp(-2\gamma\tau)); \\
 P_2^{(0,2)}(\tau, \gamma) &= \exp(-\gamma\tau)(1 - 10\exp(-2\gamma\tau) + 15\exp(-4\gamma\tau)); \\
 P_3^{(0,2)}(\tau, \gamma) &= \exp(-\gamma\tau)(1 - 18\exp(-2\gamma\tau) + 63\exp(-4\gamma\tau) - \\
 &- 56\exp(-6\gamma\tau)); \\
 P_4^{(0,2)}(\tau, \gamma) &= \exp(-\gamma\tau)(1 - 28\exp(-2\gamma\tau) + 168\exp(-4\gamma\tau) - \\
 &- 336\exp(-6\gamma\tau) + 210\exp(-8\gamma\tau)); \\
 P_5^{(0,2)}(\tau, \gamma) &= \exp(-\gamma\tau)(1 - 40\exp(-2\gamma\tau) + 360\exp(-4\gamma\tau) - \\
 &- 1200\exp(-6\gamma\tau) + 1650\exp(-8\gamma\tau) - 792\exp(-10\gamma\tau)).
 \end{aligned}$$





Рис. 1.12. Вид ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1, c = 2, \alpha = 0, \beta = 2$


$$[1.13] \quad P_k^{(0,β)}(\tau, \gamma) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s \times \\
 \times \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
 P_0^{(0,β)}(\tau, \gamma) &= \exp(-c\gamma\tau/2); \\
 P_1^{(0,β)}(\tau, \gamma) &= \exp(-c\gamma\tau/2)(1 - (\beta+2)\exp(-c\gamma\tau)); \\
 P_2^{(0,β)}(\tau, \gamma) &= \exp(-c\gamma\tau/2)(1 - 2(\beta+3)\exp(-c\gamma\tau) + (\beta+3) \times \\
 &\times (\beta+4)\exp(-2c\gamma\tau)/2); \\
 P_3^{(0,β)}(\tau, \gamma) &= \exp(-c\gamma\tau/2)(1 - 3(\beta+4)\exp(-c\gamma\tau) + 3(\beta+4) \times \\
 &\times (\beta+5)\exp(-2c\gamma\tau)/2 - (\beta+4)(\beta+5)(\beta+6)\exp(-3c\gamma\tau)/6); \\
 P_4^{(0,β)}(\tau, \gamma) &= \exp(-c\gamma\tau/2)(1 - 4(\beta+5)\exp(-c\gamma\tau) + 3(\beta+5) \times \\
 &\times (\beta+6)\exp(-2c\gamma\tau) - 2(\beta+5)(\beta+6)(\beta+7) \times \\
 &\times \exp(-3c\gamma\tau)/3 + (\beta+5)(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)\exp(-4c\gamma\tau)/24); \\
 P_5^{(0,β)}(\tau, \gamma) &= \exp(-c\gamma\tau/2)(1 - 5(\beta+6)\exp(-c\gamma\tau) + 5(\beta+6) \times \\
 &\times (\beta+7)\exp(-2c\gamma\tau) - 5(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)\exp(-3c\gamma\tau)/3 + \\
 &+ 5(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)(\beta+9)\exp(-4c\gamma\tau)/24 - (\beta+6)(\beta+7) \times \\
 &\times (\beta+8)(\beta+9)(\beta+10)\exp(-5c\gamma\tau)/120).
 \end{aligned}$$



a)



б)

Рис. 1.13. Вид ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 1, c = 2, \beta \in [0; 5], \alpha = 0$; б) $\gamma \in (0; 2], c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$

1.2 Аналитические соотношения для производных ортогональных функций

$$[1.14] \quad \frac{\partial L_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \left(\sum_{s=1}^k \binom{k}{s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \frac{(-\gamma \tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial L_0(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{2} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right);$$


$$\frac{\partial L_1(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{2} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - 3);$$

$$\frac{\partial L_2(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{4} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 8\gamma \tau + 10);$$

$$\frac{\partial L_3(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{12} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 15\gamma^2 \tau^2 + 54\gamma \tau - 42);$$

$$\frac{\partial L_4(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{48} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 24\gamma^3 \tau^3 + 168\gamma^2 \tau^2 - 384\gamma \tau + 216);$$

$$\frac{\partial L_5(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{240} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 35\gamma^4 \tau^4 + 400\gamma^3 \tau^3 - 1800\gamma^2 \tau^2 + 3000\gamma \tau - 1320).$$

Рис. 1.14. Вид 1-ой производной ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1$

$$[1.15] \quad \frac{\partial^2 L_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \left(\sum_{s=2}^k \binom{k}{s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-2}}{(s-2)!} + \sum_{s=1}^k \binom{k}{s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \frac{(-\gamma \tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right).$$


Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^2 L_0(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{4} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial^2 L_1(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\frac{\gamma^2}{4} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - 5);$$

$$\frac{\partial^2 L_2(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 12\gamma \tau + 26);$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 L_3(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= -\frac{\gamma^2}{24} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 21\gamma^2 \tau^2 + 114\gamma \tau - 150); \\ \frac{\partial^2 L_4(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{\gamma^2}{96} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 32\gamma^3 \tau^3 + 312\gamma^2 \tau^2 - 1056\gamma \tau + 984); \\ \frac{\partial^2 L_5(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= -\frac{\gamma^2}{480} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 45\gamma^4 \tau^4 + 680\gamma^3 \tau^3 - 4200\gamma^2 \tau^2 + 10200\gamma \tau - 7320). \end{aligned}$$

Рис. 1.15. Вид 2-ой производной ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1$

$$[1.16] \quad \frac{\partial^3 L_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \left(\sum_{s=3}^k \binom{k}{s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-3}}{(s-3)!} + \frac{3}{2} \sum_{s=2}^k \binom{k}{s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-2}}{(s-2)!} + \frac{3}{4} \sum_{s=1}^k \binom{k}{s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{8} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \frac{(-\gamma \tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^3 L_0(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial^3 L_1(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \frac{\gamma^3}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - 7);$$

$$\frac{\partial^3 L_2(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{16} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 16\gamma \tau + 50);$$

$$\frac{\partial^3 L_3(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \frac{\gamma^3}{48} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 27\gamma^2 \tau^2 + 198\gamma \tau - 378);$$

$$\frac{\partial^3 L_4(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{192} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 40\gamma^3 \tau^3 + 504\gamma^2 \tau^2 - 2304\gamma \tau + 3096);$$

$$\frac{\partial^3 L_5(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \frac{\gamma^3}{960} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 55\gamma^4 \tau^4 + 1040\gamma^3 \tau^3 - 8280\gamma^2 \tau^2 + 27000\gamma \tau - 27720).$$




Рис. 1.16. Вид 3-ой производной ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1$

$$[1.17] \quad \frac{\partial^n L_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{s-n+j}}{(s-n+j)!}, & \text{если } s-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^n L_0(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$\frac{\partial^n L_1(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases};$$

$$\frac{\partial^n L_2(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{2(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases};$$

$$\frac{\partial^n L_3(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{3(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} \frac{3(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases};$$

$$\frac{\partial^n L_4(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{4(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{6(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{4(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{4-n+j}}{(4-n+j)!}, & \text{если } 4-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases};$$

$$\frac{\partial^n L_5(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{5(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{10(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{10(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{5(-\gamma \tau)^{4-n+j}}{(4-n+j)!}, & \text{если } 4-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{5-n+j}}{(5-n+j)!}, & \text{если } 5-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}.$$




Рис. 1.17. Вид n -ой производной ортогональных функций Лагерра 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 1$

$$[1.18] \quad \frac{\partial L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \left(\sum_{s=1}^k \binom{k+1}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L_0^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{\gamma}{2} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right); \\ \frac{\partial L_1^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\gamma}{2} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - 4); \\ \frac{\partial L_2^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{\gamma}{4} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 10\gamma \tau + 18); \\ \frac{\partial L_3^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\gamma}{12} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 18\gamma^2 \tau^2 + 84\gamma \tau - 96); \\ \frac{\partial L_4^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{\gamma}{48} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 28\gamma^3 \tau^3 + 240\gamma^2 \tau^2 - 720\gamma \tau + 600); \\ \frac{\partial L_5^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\gamma}{240} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 40\gamma^4 \tau^4 + 540\gamma^3 \tau^3 - 3000\gamma^2 \tau^2 + 6600\gamma \tau - 4320). \end{aligned}$$




Рис. 1.18. Вид 1-ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $\alpha = 1$

$$[1.19] \quad \begin{aligned} \frac{\partial^2 L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \gamma^2 \left(\sum_{s=2}^k \binom{k+1}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-2}}{(s-2)!} + \sum_{s=1}^k \binom{k+1}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{4} \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right). \end{aligned}$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 L_0^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{\gamma^2}{4} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right); \\ \frac{\partial^2 L_1^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= -\frac{\gamma^2}{4} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - 6); \\ \frac{\partial^2 L_2^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{\gamma^2}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 14\gamma \tau + 38); \\ \frac{\partial^2 L_3^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= -\frac{\gamma^2}{24} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 24\gamma^2 \tau^2 + 156\gamma \tau - 264); \\ \frac{\partial^2 L_4^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{\gamma^2}{96} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 36\gamma^3 \tau^3 + 408\gamma^2 \tau^2 - 1680\gamma \tau + 2040); \\ \frac{\partial^2 L_5^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= -\frac{\gamma^2}{480} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 50\gamma^4 \tau^4 + 860\gamma^3 \tau^3 - 6240\gamma^2 \tau^2 + 18600\gamma \tau - 17520). \end{aligned}$$




Рис. 1.19. Вид 2-ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $\alpha = 1$

$$[1.20] \quad \begin{aligned} \frac{\partial^3 L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\gamma^3 \left(\sum_{s=3}^k \binom{k+1}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-3}}{(s-3)!} + \frac{3}{2} \sum_{s=2}^k \binom{k+1}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-2}}{(s-2)!} + \frac{3}{4} \sum_{s=1}^k \binom{k+1}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{8} \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right). \end{aligned}$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 L_0^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{\gamma^3}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right); \\ \frac{\partial^3 L_1^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= \frac{\gamma^3}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - 8); \\ \frac{\partial^3 L_2^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{\gamma^3}{16} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 18\gamma \tau + 66); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^3 L_3^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= \frac{\gamma^3}{48} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 30\gamma^2 \tau^2 + 252\gamma \tau - 576); \\ \frac{\partial^3 L_4^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{\gamma^3}{192} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 44\gamma^3 \tau^3 + 624\gamma^2 \tau^2 - 3312\gamma \tau + 5400); \\ \frac{\partial^3 L_5^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= \frac{\gamma^3}{960} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 60\gamma^4 \tau^4 + 1260\gamma^3 \tau^3 - 11400\gamma^2 \tau^2 + 43560\gamma \tau - 54720).\end{aligned}$$




Рис. 1.20. Вид 3-ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $\alpha = 1$

$$[1.21] \quad \frac{\partial^n L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{s-n+j}}{(s-n+j)!}, & \text{если } s-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^n L_0^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \\ \frac{\partial^n L_1^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{2(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}; \\ \frac{\partial^n L_2^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{3(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{3(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^n L_3^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{4(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{6(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{4(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}; \\ \frac{\partial^n L_4^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{5(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{10(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{10(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{5(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{4-n+j}}{(4-n+j)!}, & \text{если } 4-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}; \\ \frac{\partial^n L_5^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{6(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{15(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{20(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{15(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{6(-\gamma \tau)^{4-n+j}}{(4-n+j)!}, & \text{если } 4-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{5-n+j}}{(5-n+j)!}, & \text{если } 5-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}.\end{aligned}$$




Рис. 1.21. Вид n-ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 1$, $\alpha = 1$

$$[1.22] \quad \frac{\partial L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \left(\sum_{s=1}^k \binom{k+2}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial L_0^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{2} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial L_1^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{2} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - 5);$$

$$\frac{\partial L_2^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{4} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 12\gamma \tau + 28);$$

$$\frac{\partial L_3^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{12} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 21\gamma^2 \tau^2 + 120\gamma \tau - 180);$$

$$\frac{\partial L_4^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{48} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 32\gamma^3 \tau^3 + 324\gamma^2 \tau^2 - 1200\gamma \tau + 1320);$$

$$\frac{\partial L_5^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{240} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 45\gamma^4 \tau^4 + 700\gamma^3 \tau^3 - 4620\gamma^2 \tau^2 + 12600\gamma \tau - 10920).$$




Рис. 1.22. Вид 1-ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $\alpha = 2$

$$[1.23] \quad \frac{\partial^2 L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \left(\sum_{s=2}^k \binom{k+2}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-2}}{(s-2)!} + \sum_{s=1}^k \binom{k+2}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{4} \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right).$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^2 L_0^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{4} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial^2 L_1^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\frac{\gamma^2}{4} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - 7);$$

$$\frac{\partial^2 L_2^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 16\gamma \tau + 52);$$

$$\frac{\partial^2 L_3^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\frac{\gamma^2}{24} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 27\gamma^2 \tau^2 + 204\gamma \tau - 420);$$

$$\frac{\partial^2 L_4^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{96} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 40\gamma^3 \tau^3 + 516\gamma^2 \tau^2 - 2496\gamma \tau + 3720);$$

$$\frac{\partial^2 L_5^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\frac{\gamma^2}{480} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 55\gamma^4 \tau^4 + 1060\gamma^3 \tau^3 - 8820\gamma^2 \tau^2 + 31080\gamma \tau - 36120).$$




Рис. 1.23. Вид 2-ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $\alpha = 2$

$$[1.24] \quad \frac{\partial^3 L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \left(\sum_{s=3}^k \binom{k+2}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-3}}{(s-3)!} + \frac{3}{2} \sum_{s=2}^k \binom{k+2}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-2}}{(s-2)!} + \frac{3}{4} \sum_{s=1}^k \binom{k+2}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{8} \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^3 L_0^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial^3 L_1^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \frac{\gamma^3}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - 9);$$

$$\frac{\partial^3 L_2^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{16} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 20\gamma \tau + 84);$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^3 L_3^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= \frac{\gamma^3}{48} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 33\gamma^2 \tau^2 + 312\gamma \tau - 828); \\ \frac{\partial^3 L_4^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{\gamma^3}{192} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 48\gamma^3 \tau^3 + 756\gamma^2 \tau^2 - 4560\gamma \tau + 8712); \\ \frac{\partial^3 L_5^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= \frac{\gamma^3}{960} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 65\gamma^4 \tau^4 + 1500\gamma^3 \tau^3 - 15180\gamma^2 \tau^2 + 66360\gamma \tau - 98280).\end{aligned}$$




Рис. 1.24. Вид 3-ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $\alpha = 2$

$$[1.25] \quad \frac{\partial^n L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{s-n+j}}{(s-n+j)!}, & \text{если } s-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^n L_0^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \\ \frac{\partial^n L_1^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{3(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}; \\ \frac{\partial^n L_2^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{6(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{4(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^n L_3^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{10(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{10(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{5(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}; \\ \frac{\partial^n L_4^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{15(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{20(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{15(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{6(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{4-n+j}}{(4-n+j)!}, & \text{если } 4-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}; \\ \frac{\partial^n L_5^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \times \begin{cases} \frac{21(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{35(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{35(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{21(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{7(-\gamma \tau)^{4-n+j}}{(4-n+j)!}, & \text{если } 4-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\ &+ \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{5-n+j}}{(5-n+j)!}, & \text{если } 5-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}.\end{aligned}$$




Рис. 1.25. Вид n -ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 1$, $\alpha = 2$

$$[1.26] \quad \frac{\partial L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \left(\sum_{s=1}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \frac{(-\gamma\tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \frac{(-\gamma\tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$


$$\frac{\partial L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma\tau - \alpha - 3);$$

$$\frac{\partial L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2\tau^2 - 2(\alpha+4)\gamma\tau + \alpha^2 + 10);$$


$$\frac{\partial L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{12} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3\tau^3 - 3(\alpha+5)\gamma^2\tau^2 + 3(\alpha^2 + 9\alpha + 18)\gamma\tau - \alpha^3 - 12\alpha^2 - 41\alpha - 42);$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = & -\frac{\gamma}{48} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4\tau^4 - 4(\alpha+6)\gamma^3\tau^3 + \\ & + 6(\alpha^2 + 11\alpha + 28)\gamma^2\tau^2 - 4(\alpha^3 + 15\alpha^2 + 68\alpha + 96)\gamma\tau + \alpha^4 + 18\alpha^3 + 107\alpha^2 + 258\alpha + 216); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = & \frac{\gamma}{240} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5\tau^5 - 5(\alpha+7)\gamma^4\tau^4 + \\ & + 10(\alpha^2 + 13\alpha + 40)\gamma^3\tau^3 - 10(\alpha^3 + 18\alpha^2 + 101\alpha + 180)\gamma^2\tau^2 + \\ & + 5(\alpha^4 + 22\alpha^3 + 167\alpha^2 + 530\alpha + 600)\gamma\tau - \alpha^5 - 25\alpha^4 - 225\alpha^3 - 935\alpha^2 - 1814\alpha - 1320). \end{aligned}$$



a)



б)

Рис. 1.26. Вид 1-ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 1$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (0; 5]$, $\alpha = 1$


$$[1.27] \quad \frac{\partial^2 L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \left(\sum_{s=2}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \frac{(-\gamma\tau)^{s-2}}{(s-2)!} + \sum_{s=1}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \frac{(-\gamma\tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{4} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \frac{(-\gamma\tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right).$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:


$$\frac{\partial^2 L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= -\frac{\gamma^2}{4} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - \alpha - 5); \\ \frac{\partial^2 L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{\gamma^2}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 2(\alpha + 6)\gamma \tau + \alpha^2 + 11\alpha + 26); \\ \frac{\partial^2 L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= -\frac{\gamma^2}{24} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 3(\alpha + 7)\gamma^2 \tau^2 + 3(\alpha^2 + 13\alpha + 38)\gamma \tau - \alpha^3 - 18\alpha^2 - 95\alpha - 150);\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{\gamma^2}{96} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 4(\alpha + 8)\gamma^3 \tau^3 + 6(\alpha^2 + 15\alpha + 52)\gamma^2 \tau^2 - 4(\alpha^3 + 21\alpha^2 + 134\alpha + 264)\gamma \tau + \alpha^4 + 26\alpha^3 + 227\alpha^2 + 802\alpha + 984); \\ \frac{\partial^2 L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= -\frac{\gamma^2}{480} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 5(\alpha + 9)\gamma^4 \tau^4 + 10 \times (\alpha^2 + 17\alpha + 63)\gamma^3 \tau^3 - 10(\alpha^3 + 24\alpha^2 + 179\alpha + 420)\gamma^2 \tau^2 + 5(\alpha^4 + 30\alpha^3 + 311\alpha^2 + 1338\alpha + 2040)\gamma \tau - \alpha^5 - 35\alpha^4 - 445\alpha^3 - 1555\alpha^2 - 7114\alpha - 7320).\end{aligned}$$



а)



б)

Рис. 1.27. Вид 2-ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 1, \alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (0; 5], \alpha = 1$


$$\begin{aligned}[1.28] \frac{\partial^3 L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\gamma^3 \left(\sum_{s=3}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-3}}{(s-3)!} + \frac{3}{2} \sum_{s=2}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-2}}{(s-2)!} + \frac{3}{4} \sum_{s=1}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^{s-1}}{(s-1)!} + \frac{1}{8} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \frac{(-\gamma \tau)^s}{s!} \right) \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right).\end{aligned}$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^3 L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \frac{\gamma^3}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial^3 L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{8} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma \tau - \alpha - 7);$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^3 L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= \frac{\gamma^3}{16} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 2(\alpha + 8)\gamma \tau + \alpha^2 + 15\alpha + 50); \\ \frac{\partial^3 L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{\gamma^3}{48} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - 3(\alpha + 9)\gamma^2 \tau^2 + 3(\alpha^2 + 17\alpha + 66)\gamma \tau - \alpha^3 - 24\alpha^2 - 173\alpha - 378); \\ \frac{\partial^3 L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= \frac{\gamma^3}{192} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 4(\alpha + 10)\gamma^3 \tau^3 + 6(\alpha^2 + 19\alpha + 84)\gamma^2 \tau^2 - 4(\alpha^3 + 27\alpha^2 + 224\alpha + 576)\gamma \tau + \alpha^4 + 34\alpha^3 + 395\alpha^2 + 1874\alpha + 3096); \\ \frac{\partial^3 L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{\gamma^3}{960} \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 5(\alpha + 11)\gamma^4 \tau^4 + 10 \times (\alpha^2 + 21\alpha + 104)\gamma^3 \tau^3 - 10(\alpha^3 + 30\alpha^2 + 281\alpha + 828)\gamma^2 \tau^2 + 5(\alpha^4 + 38\alpha^3 + 503\alpha^2 + 2770\alpha + 5400)\gamma \tau - \alpha^5 - 45\alpha^4 - 745\alpha^3 - 5715\alpha^2 - 20494\alpha - 27720).\end{aligned}$$

Рис. 1.28. Вид 3-ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 1$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (0; 5]$, $\alpha = 1$

$$[1.29] \quad \frac{\partial^n L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{s-n+j}}{(s-n+j)!}, & \text{если } s-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^n L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases};$$

$$\frac{\partial^n L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(\alpha+1)(-\gamma \tau)^{-n+j}}{(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \\ + \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases};$$


$$\frac{\partial^n L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(\alpha+1)(\alpha+2)(-\gamma \tau)^{-n+j}}{2(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \\ + \begin{cases} \frac{(\alpha+2)(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \\ + \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases};$$

$$\frac{\partial^n L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(\alpha+3)!(-\gamma \tau)^{-n+j}}{6\alpha!(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \\ + \begin{cases} \frac{(\alpha+2)(\alpha+3)(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{2(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \\ + \begin{cases} \frac{(\alpha+3)(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \\ + \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases};$$


$$\frac{\partial^n L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \frac{(\alpha+4)!(-\gamma \tau)^{-n+j}}{24\alpha!(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \\ + \begin{cases} \frac{(\alpha+3)!(-\gamma \tau)^{1-n+j}}{6(\alpha+1)!(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \\ + \begin{cases} \frac{(\alpha+3)(\alpha+4)(-\gamma \tau)^{2-n+j}}{2(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \\ + \begin{cases} \frac{(\alpha+4)(-\gamma \tau)^{3-n+j}}{(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} + \\ + \begin{cases} \frac{(-\gamma \tau)^{4-n+j}}{(4-n+j)!}, & \text{если } 4-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases};$$

$$\frac{\partial^n L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp\left(-\frac{\gamma \tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times$$

$$\begin{aligned}
& \times \left(\begin{cases} \frac{(\alpha+5)!(-\gamma\tau)^{-n+j}}{120\alpha!(-n+j)!}, & \text{если } -n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \right) + \\
& + \left(\begin{cases} \frac{(\alpha+5)!(-\gamma\tau)^{1-n+j}}{24(\alpha+1)!(1-n+j)!}, & \text{если } 1-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \right) + \\
& + \left(\begin{cases} \frac{(\alpha+5)!(-\gamma\tau)^{2-n+j}}{6(\alpha+2)!(2-n+j)!}, & \text{если } 2-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \right) + \\
& + \left(\begin{cases} \frac{(\alpha+4)(\alpha+5)(-\gamma\tau)^{3-n+j}}{2(3-n+j)!}, & \text{если } 3-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \right) + \\
& + \left(\begin{cases} \frac{(\alpha+5)(-\gamma\tau)^{4-n+j}}{(4-n+j)!}, & \text{если } 4-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \right) + \\
& + \left(\begin{cases} \frac{(-\gamma\tau)^{5-n+j}}{(5-n+j)!}, & \text{если } 5-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \right).
\end{aligned}$$



а)



б)

Рис. 1.29. Вид n -ой производной ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $n = 0..5$, $\gamma = 1$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $n = 0..5$, $\gamma \in (0; 5]$, $\alpha = 1$

$$[1.30] \quad \frac{\partial P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} \times (-1)^s (4s+1) \exp\left(-\frac{(4s+1)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{\gamma}{2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right); \\
\frac{\partial P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\gamma}{4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (15 \exp(-2\gamma\tau) - 1); \\
\frac{\partial P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{\gamma}{16} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (315 \exp(-4\gamma\tau) - 150 \exp(-2\gamma\tau) + 3); \\
\frac{\partial P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\gamma}{32} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (3003 \exp(-6\gamma\tau) - 2835 \exp(-4\gamma\tau) + 525 \exp(-2\gamma\tau) - 5); \\
\frac{\partial P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{\gamma}{256} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (109395 \exp(-8\gamma\tau) - 156156 \exp(-6\gamma\tau) + 62370 \exp(-4\gamma\tau) - 6300 \exp(-2\gamma\tau) + 35);
\end{aligned}$$

¹ числовой эквивалент, характеризующий порядок кривой при изменении анализируемого параметра с равномерным шагом в выбранном диапазоне. Например, параметр $\alpha \in [0; 5]$: $\langle 0 \rangle$ - кривая при значении $\alpha = 0$, $\langle 5 \rangle$ - кривая при значении $\alpha = 5$.




Рис. 1.30. Вид 1-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$[1.31] \quad \frac{\partial^2 P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} \times (-1)^s (4s+1)^2 \exp\left(-\frac{(4s+1)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^2 P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial^2 P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\frac{\gamma^2}{8} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (75 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^2 P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{3\gamma^2}{32} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (945 \exp(-4\gamma\tau) - 250 \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^2 P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\frac{\gamma^2}{64} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (39039 \exp(-6\gamma\tau) - 25515 \exp(-4\gamma\tau) + 2625 \exp(-2\gamma\tau) - 5);$$

$$\frac{\partial^2 P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{512} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (1859715 \exp(-8\gamma\tau) - 2030028 \exp(-6\gamma\tau) + 561330 \exp(-4\gamma\tau) - 31500 \exp(-2\gamma\tau) + 35);$$

$$\frac{\partial^2 P_5^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\frac{9\gamma^2}{1024} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (2263261 \exp(-10\gamma\tau) - 3512795 \exp(-8\gamma\tau) + 1691690 \exp(-6\gamma\tau) - 270270 \times \exp(-4\gamma\tau) + 9625 \exp(-2\gamma\tau) - 7).$$




Рис. 1.31. Вид 2-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$[1.32] \quad \frac{\partial^3 P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{8} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} \times (-1)^s (4s+1)^3 \exp\left(-\frac{(4s+1)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^3 P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{8} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial^3 P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \frac{\gamma^3}{16} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (375 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{64} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (25515 \exp(-4\gamma\tau) - 1875 \exp(-2\gamma\tau) + 3);$$

$$\frac{\partial^3 P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \frac{\gamma^3}{128} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (507507 \exp(-6\gamma\tau) - 229635 \exp(-4\gamma\tau) + 13125 \exp(-2\gamma\tau) - 5);$$

$$\frac{\partial^3 P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{1024} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (31615155 \exp(-8\gamma\tau) - 26390364 \exp(-6\gamma\tau) + 5051970 \exp(-4\gamma\tau) - 157500 \exp(-2\gamma\tau) + 35);$$

$$\frac{\partial^3 P_5^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \frac{9\gamma^3}{2048} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (47528481 \exp(-10\gamma\tau) - 59717515 \exp(-8\gamma\tau) + 21991970 \exp(-6\gamma\tau) - 2432430 \times \exp(-4\gamma\tau) + 48125 \exp(-2\gamma\tau) - 7).$$




Рис. 1.32. Вид 3-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$[1.33] \quad \frac{\partial^n P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s (4s+1)^n \exp\left(-\frac{(4s+1)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^n P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial^n P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -\frac{1}{2} \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (3 \cdot 5^n \times \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^n P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \frac{1}{8} \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (35 \cdot 9^n \times \exp(-4\gamma\tau) - 30 \cdot 5^n \exp(-2\gamma\tau) + 3);$$

$$\frac{\partial^n P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -\frac{1}{16} \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (231 \cdot 13^n \times \exp(-6\gamma\tau) - 315 \cdot 9^n \exp(-4\gamma\tau) + 105 \cdot 5^n \exp(-2\gamma\tau) - 5);$$

$$\frac{\partial^n P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \frac{1}{128} \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (6435 \cdot 17^n \times \exp(-8\gamma\tau) - 12012 \cdot 13^n \exp(-6\gamma\tau) + 6930 \cdot 9^n \exp(-4\gamma\tau) - 1260 \cdot 5^n \exp(-2\gamma\tau) + 35);$$

$$\frac{\partial^n P_5^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -\frac{1}{256} \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (46189 \cdot 21^n \times \exp(-10\gamma\tau) - 109395 \cdot 17^n \exp(-8\gamma\tau) + 90090 \cdot 13^n \times \exp(-6\gamma\tau) - 30030 \cdot 9^n \exp(-4\gamma\tau) + 3465 \cdot 5^n \exp(-2\gamma\tau) - 63).$$




Рис. 1.33. Вид n -ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$[1.34] \quad \frac{\partial \text{Leg}_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \times (2s+1) \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial \text{Leg}_0(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial \text{Leg}_1(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-\gamma\tau)(6 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial \text{Leg}_2(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-\gamma\tau)(30 \exp(-4\gamma\tau) - 18 \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial \text{Leg}_3(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-\gamma\tau)(140 \exp(-6\gamma\tau) - 150 \exp(-4\gamma\tau) + 36 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial \text{Leg}_4(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-\gamma\tau)(630 \exp(-8\gamma\tau) - 980 \times$$

$$\times \exp(-6\gamma\tau) + 450 \exp(-4\gamma\tau) - 60 \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial \text{Leg}_5(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-\gamma\tau)(2772 \exp(-10\gamma\tau) - 5670 \times$$

$$\times \exp(-8\gamma\tau) + 3920 \exp(-6\gamma\tau) - 1050 \exp(-4\gamma\tau) + 90 \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) - 1).$$




Рис. 1.34. Вид 1-ой производной ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$

$$[1.35] \quad \frac{\partial^2 \text{Leg}_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \times (2s+1)^2 \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^2 \text{Leg}_0(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^2 \text{Leg}_1(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(18 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^2 \text{Leg}_2(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(150 \exp(-4\gamma\tau) - 54 \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^2 \text{Leg}_3(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(980 \exp(-6\gamma\tau) - 750 \times$$

$$\times \exp(-4\gamma\tau) + 108 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^2 \text{Leg}_4(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(5670 \exp(-8\gamma\tau) - 6860 \times$$

$$\times \exp(-6\gamma\tau) + 2250 \exp(-4\gamma\tau) - 180 \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^2 \text{Leg}_5(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(30492 \exp(-10\gamma\tau) - 51030 \times$$

$$\times \exp(-8\gamma\tau) + 27440 \exp(-6\gamma\tau) - 5250 \exp(-4\gamma\tau) + 270 \exp(-2\gamma\tau) - 1).$$




Рис. 1.35. Вид 2-ой производной ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$

$$[1.36] \quad \frac{\partial^3 \text{Leg}_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \times (2s+1)^3 \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^3 \text{Leg}_0(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^3 \text{Leg}_1(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-\gamma\tau)(54 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^3 \text{Leg}_2(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-\gamma\tau)(750 \exp(-4\gamma\tau) - 162 \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^3 \text{Leg}_3(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-\gamma\tau)(6860 \exp(-6\gamma\tau) - 3750 \times$$

$$\times \exp(-4\gamma\tau) + 324 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^3 \text{Leg}_4(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-\gamma\tau)(51030 \exp(-8\gamma\tau) - 48020 \times$$

$$\times \exp(-6\gamma\tau) + 11250 \exp(-4\gamma\tau) - 540 \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^3 \text{Leg}_5(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-\gamma\tau)(335412 \exp(-10\gamma\tau) - 459270 \times$$




Рис. 1.36. Вид 3-ой производной ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$

$$[1.37] \quad \frac{\partial^n \text{Leg}_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \times \\ \times (2s+1)^n \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^n \text{Leg}_0(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^n \text{Leg}_1(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (2 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^n \text{Leg}_2(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (6 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) - 6 \cdot 3^n \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^n \text{Leg}_3(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (20 \cdot 7^n \exp(-6\gamma\tau) -$$

$$- 30 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) + 12 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^n \text{Leg}_4(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (70 \cdot 9^n \exp(-8\gamma\tau) - 140 \cdot 7^n \times$$

$$\times \exp(-6\gamma\tau) + 90 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) - 20 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^n \text{Leg}_5(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (252 \cdot 11^n \exp(-10\gamma\tau) -$$

$$- 630 \cdot 9^n \exp(-8\gamma\tau) + 560 \cdot 7^n \exp(-6\gamma\tau) - 210 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) +$$

$$+ 30 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 1).$$




Рис. 1.37. Вид n-ой производной ортогональных функций Лежандра 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 0, 25$, $c = 2$

$$[1.38] \quad \frac{\partial P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} \times \\ \times (-1)^s (4s+3) \exp\left(-\frac{(4s+3)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{3\gamma}{2} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{4} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (35 \exp(-2\gamma\tau) - 9);$$

$$\frac{\partial P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{16} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (693 \exp(-4\gamma\tau) - 490 \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) + 45);$$

$$\frac{\partial P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{32} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (6435 \exp(-6\gamma\tau) - 7623 \times$$

$$\times \exp(-4\gamma\tau) + 2205 \exp(-2\gamma\tau) - 105);$$

$$\frac{\partial P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{\gamma}{256} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (230945 \exp(-8\gamma\tau) -$$

$$- 386100 \exp(-6\gamma\tau) + 198198 \exp(-4\gamma\tau) - 32340 \exp(-2\gamma\tau) + 945);$$

$$\frac{\partial P_5^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{512} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (2028117 \exp(-10\gamma\tau) -$$

$$- 4387955 \exp(-8\gamma\tau) + 3281850 \exp(-6\gamma\tau) - 990990 \times$$

$$\times \exp(-4\gamma\tau) + 105105 \exp(-2\gamma\tau) - 2079).$$




Рис. 1.38. Вид 1-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$[1.39] \quad \frac{\partial^2 P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} \times \\ \times (-1)^s (4s+3)^2 \exp\left(-\frac{(4s+3)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^2 P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{9\gamma^2}{4} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right);$$

$$\frac{\partial^2 P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\frac{\gamma^2}{8} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (245 \exp(-2\gamma\tau) - 27);$$

$$\frac{\partial^2 P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{\gamma^2}{32} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (7623 \exp(-4\gamma\tau) - 3430 \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) + 135);$$

$$\frac{\partial^2 P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\frac{\gamma^2}{64} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (96525 \exp(-6\gamma\tau) -$$

$$- 83853 \exp(-4\gamma\tau) + 15435 \exp(-2\gamma\tau) - 315);$$




Рис. 1.39. Вид 2-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$[1.40] \quad \frac{\partial^3 P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{\gamma^3}{8} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} \times (-1)^s (4s+3)^3 \exp\left(-\frac{(4s+3)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:


$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{27\gamma^3}{8} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right); \\ \frac{\partial^3 P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= \frac{\gamma^3}{16} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (1715 \exp(-2\gamma\tau) - 81); \\ \frac{\partial^3 P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{\gamma^3}{64} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (83853 \exp(-4\gamma\tau) - 24010 \exp(-2\gamma\tau) + 405); \\ \frac{\partial^3 P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= \frac{\gamma^3}{128} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (1447875 \exp(-6\gamma\tau) - 922383 \exp(-4\gamma\tau) + 108045 \exp(-2\gamma\tau) - 945); \\ \frac{\partial^3 P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{\gamma^3}{1024} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (83371145 \times \exp(-8\gamma\tau) - 86872500 \exp(-6\gamma\tau) + 23981958 \exp(-4\gamma\tau) - 1584660 \exp(-2\gamma\tau) + 8505); \\ \frac{\partial^3 P_5^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= \frac{9\gamma^3}{2048} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (1072873893 \times \exp(-10\gamma\tau) - 1584051755 \exp(-8\gamma\tau) + 738416250 \times \exp(-6\gamma\tau) - 119909790 \exp(-4\gamma\tau) + 5150145 \exp(-2\gamma\tau) - 18711). \end{aligned}$$


Рис. 1.40. Вид 3-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$[1.41] \quad \frac{\partial^n P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s (4s+3)^n \exp\left(-\frac{(4s+3)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для n -ой производной функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^n P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= 3^n \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right); \\ \frac{\partial^n P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= -\frac{1}{2} \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (5 \cdot 7^n \exp(-2\gamma\tau) - 3 \cdot 3^n); \\ \frac{\partial^n P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= \frac{1}{8} \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (63 \cdot 11^n \exp(-4\gamma\tau) - 70 \cdot 7^n \exp(-2\gamma\tau) + 15 \cdot 3^n); \\ \frac{\partial^n P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= -\frac{1}{16} \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (429 \cdot 15^n \times \exp(-6\gamma\tau) - 693 \cdot 11^n \exp(-4\gamma\tau) + 315 \cdot 7^n \exp(-2\gamma\tau) - 35 \cdot 3^n); \\ \frac{\partial^n P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= \frac{1}{128} \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (12155 \cdot 19^n \times \exp(-8\gamma\tau) - 25740 \cdot 15^n \exp(-6\gamma\tau) + 18018 \cdot 11^n \exp(-4\gamma\tau) - 4620 \cdot 7^n \exp(-2\gamma\tau) + 315 \cdot 3^n); \\ \frac{\partial^n P_5^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= -\frac{1}{256} \left(-\frac{\gamma}{2}\right)^n \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (88179 \cdot 23^n \times \exp(-10\gamma\tau) - 230945 \cdot 19^n \exp(-8\gamma\tau) + 218790 \cdot 15^n \times \exp(-6\gamma\tau) - 90090 \cdot 11^n \exp(-4\gamma\tau) + 15015 \cdot 7^n \exp(-2\gamma\tau) - 693 \cdot 3^n). \end{aligned}$$




Рис. 1.41. Вид n -ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$[1.42] \quad \frac{\partial P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \times \\ \times (s+1) \exp(-(s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = 2\gamma \exp(-\gamma\tau)(3 \exp(-\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -3\gamma \exp(-\gamma\tau)(10 \exp(-2\gamma\tau) - 8 \exp(-\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = 4\gamma \exp(-\gamma\tau)(35 \exp(-3\gamma\tau) - 45 \exp(-2\gamma\tau) + 15 \exp(-\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial P_4^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -5\gamma \exp(-\gamma\tau)(126 \exp(-4\gamma\tau) - 224 \times$$

$$\times \exp(-3\gamma\tau) + 126 \exp(-2\gamma\tau) - 24 \exp(-\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial P_5^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = 6\gamma \exp(-\gamma\tau)(462 \exp(-5\gamma\tau) - 1050 \times$$

$$\times \exp(-4\gamma\tau) + 840 \exp(-3\gamma\tau) - 280 \exp(-2\gamma\tau) + 210 \times$$

$$\times \exp(-\gamma\tau) - 1).$$




Рис. 1.42. Вид 1-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[1.43] \quad \frac{\partial^2 P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \times \\ \times (s+1)^2 \exp(-(s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^2 P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^2 P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -2\gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(6 \exp(-\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^2 P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = 3\gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(30 \exp(-2\gamma\tau) - 16 \exp(-\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^2 P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -4\gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(140 \exp(-3\gamma\tau) - 135 \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) + 30 \exp(-\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^2 P_4^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = 5\gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(630 \exp(-4\gamma\tau) - 896 \times$$

$$\times \exp(-3\gamma\tau) + 378 \exp(-2\gamma\tau) - 48 \exp(-\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^2 P_5^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -6\gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(2772 \exp(-5\gamma\tau) - 5250 \times$$

$$\times \exp(-4\gamma\tau) + 3360 \exp(-3\gamma\tau) - 840 \exp(-2\gamma\tau) + 70 \times$$

$$\times \exp(-\gamma\tau) - 1).$$




Рис. 1.43. Вид 2-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[1.44] \quad \frac{\partial^3 P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \times \\ \times (s+1)^3 \exp(-(s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^3 P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^3 P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = 2\gamma^3 \exp(-\gamma\tau)(12 \exp(-\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -3\gamma^3 \exp(-\gamma\tau)(90 \exp(-2\gamma\tau) - 32 \times$$

$$\times \exp(-\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = 4\gamma^3 \exp(-\gamma\tau)(560 \exp(-3\gamma\tau) - 405 \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) + 60 \exp(-\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_4^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -5\gamma^3 \exp(-\gamma\tau)(3150 \exp(-4\gamma\tau) - 3584 \times$$

$$\times \exp(-3\gamma\tau) + 1134 \exp(-2\gamma\tau) - 96 \exp(-\gamma\tau) + 1);$$




Рис. 1.44. Вид 3-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0,25$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$




Рис. 1.45. Вид n-ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 0,25$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[1.45] \quad \frac{\partial^n P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} \times (-1)^s (s+1)^n \exp(-(s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^n P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^n P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (3 \cdot 2^n \exp(-\gamma\tau) - 2);$$

$$\frac{\partial^n P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (10 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 12 \cdot 2^n \times \exp(-\gamma\tau) + 3);$$

$$\frac{\partial^n P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (35 \cdot 4^n \exp(-3\gamma\tau) - 60 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) + 30 \cdot 2^n \exp(-\gamma\tau) - 4);$$

$$\frac{\partial^n P_4^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (126 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) - 280 \cdot 4^n \exp(-3\gamma\tau) + 210 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 60 \cdot 2^n \exp(-\gamma\tau) + 5);$$

$$\frac{\partial^n P_5^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (462 \cdot 6^n \exp(-5\gamma\tau) - 1260 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) + 1260 \cdot 4^n \exp(-3\gamma\tau) - 560 \cdot 3^n \times \exp(-2\gamma\tau) + 105 \cdot 2^n \exp(-\gamma\tau) - 1).$$

$$[1.46] \quad \frac{\partial P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \times (2s+3) \exp(-(2s+3)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -3\gamma \exp(-3\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-3\gamma\tau) (20 \exp(-2\gamma\tau) - 9);$$

$$\frac{\partial P_2^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-3\gamma\tau) (105 \exp(-4\gamma\tau) - 100 \times \exp(-2\gamma\tau) + 18);$$

$$\frac{\partial P_3^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-3\gamma\tau) (504 \exp(-6\gamma\tau) - 735 \times \exp(-4\gamma\tau) + 300 \exp(-2\gamma\tau) - 30);$$

$$\frac{\partial P_4^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-3\gamma\tau) (2310 \exp(-8\gamma\tau) - 4536 \times \exp(-6\gamma\tau) + 2940 \exp(-4\gamma\tau) - 700 \exp(-2\gamma\tau) + 45);$$

$$\frac{\partial P_5^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-3\gamma\tau) (10296 \exp(-10\gamma\tau) - 25410 \times \exp(-8\gamma\tau) + 22680 \exp(-6\gamma\tau) - 8820 \exp(-4\gamma\tau) + 1400 \times \exp(-2\gamma\tau) - 63).$$




Рис. 1.46. Вид 1-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0,25$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$[1.47] \quad \frac{\partial^2 P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \times \\ \times (2s+3)^2 \exp(-(2s+3)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^2 P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = 9\gamma^2 \exp(-3\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^2 P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\gamma^2 \exp(-3\gamma\tau) (100 \exp(-2\gamma\tau) - 27);$$

$$\frac{\partial^2 P_2^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \exp(-3\gamma\tau) (735 \exp(-4\gamma\tau) - 500 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 54);$$

$$\frac{\partial^2 P_3^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\gamma^2 \exp(-3\gamma\tau) (4536 \exp(-6\gamma\tau) - 5145 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) + 1500 \exp(-2\gamma\tau) - 90);$$

$$\frac{\partial^2 P_4^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \exp(-3\gamma\tau) (25410 \exp(-8\gamma\tau) - 40824 \times \\ \times \exp(-6\gamma\tau) + 20580 \exp(-4\gamma\tau) - 3500 \exp(-2\gamma\tau) + 135);$$

$$\frac{\partial^2 P_5^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\gamma^2 \exp(-3\gamma\tau) (133848 \exp(-10\gamma\tau) - \\ - 279510 \exp(-8\gamma\tau) + 204120 \exp(-6\gamma\tau) - 61740 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) + 7000 \exp(-2\gamma\tau) - 189).$$




Рис. 1.47. Вид 2-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25, c = 2, \alpha = 2, \beta = 0$

$$[1.48] \quad \frac{\partial^3 P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \times \\ \times (2s+3)^3 \exp(-(2s+3)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^3 P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -27\gamma^3 \exp(-3\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^3 P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-3\gamma\tau) (500 \exp(-2\gamma\tau) - 81);$$

$$\frac{\partial^3 P_2^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-3\gamma\tau) (5145 \exp(-4\gamma\tau) - 2500 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 162);$$

$$\frac{\partial^3 P_3^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-3\gamma\tau) (40824 \exp(-6\gamma\tau) - 36015 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) + 7500 \exp(-2\gamma\tau) - 270);$$

$$\frac{\partial^3 P_4^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-3\gamma\tau) (279510 \exp(-8\gamma\tau) - \\ - 367416 \exp(-6\gamma\tau) + 144060 \exp(-4\gamma\tau) - 17500 \exp(-2\gamma\tau) +$$

$$+ 405); \\ \frac{\partial^3 P_5^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-3\gamma\tau) (1740024 \exp(-10\gamma\tau) - \\ - 3074610 \exp(-8\gamma\tau) + 1837080 \exp(-6\gamma\tau) - 432180 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) + 35000 \exp(-2\gamma\tau) - 567).$$




Рис. 1.48. Вид 3-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25, c = 2, \alpha = 2, \beta = 0$

$$[1.49] \quad \frac{\partial^n P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} \times \\ \times (-1)^s (2s+3)^n \exp(-(2s+3)\gamma\tau).$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^n P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-3\gamma)^n \exp(-3\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^n P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-3\gamma\tau) (4 \cdot 5^n \exp(-2\gamma\tau) - \\ - 3 \cdot 3^n);$$

$$\frac{\partial^n P_2^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-3\gamma\tau) (15 \cdot 7^n \exp(-4\gamma\tau) - \\ - 20 \cdot 5^n \exp(-2\gamma\tau) + 6 \cdot 3^n);$$

$$\frac{\partial^n P_3^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-3\gamma\tau) (56 \cdot 9^n \exp(-6\gamma\tau) - \\ - 105 \cdot 7^n \exp(-4\gamma\tau) + 60 \cdot 5^n \exp(-2\gamma\tau) - 10 \cdot 3^n);$$

$$\frac{\partial^n P_4^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-3\gamma\tau) (210 \cdot 11^n \exp(-8\gamma\tau) - \\ - 504 \cdot 9^n \exp(-6\gamma\tau) + 420 \cdot 7^n \exp(-4\gamma\tau) - 140 \cdot 5^n \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 15 \cdot 3^n);$$

$$\frac{\partial^n P_5^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-3\gamma\tau) (792 \cdot 13^n \exp(-10\gamma\tau) - \\ - 2310 \cdot 11^n \exp(-8\gamma\tau) + 2520 \cdot 9^n \exp(-6\gamma\tau) - 1260 \cdot 7^n \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) + 280 \cdot 5^n \exp(-2\gamma\tau) - 21 \cdot 3^n).$$





Рис. 1.49. Вид n -ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$


$$[1.50] \quad \frac{\partial P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{c\gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \times \\ \times (2s+\alpha+1) \exp(-(2s+\alpha+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:



a)

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_0^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{(\alpha+1)c\gamma}{2} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2); \\ \frac{\partial P_1^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{c\gamma}{2} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^2 - (\alpha+2) \times \\ &\times (\alpha+3) \exp(-c\gamma\tau)); \\ \frac{\partial P_2^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{c\gamma}{4} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^2(\alpha+2) - \\ &- 2(\alpha+2)(\alpha+3)^2 \exp(-c\gamma\tau) + (\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5) \exp(-2c\gamma\tau)); \\ \frac{\partial P_3^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{c\gamma}{12} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^2(\alpha+2) \times \\ &\times (\alpha+3) - 3(\alpha+2)(\alpha+3)^2(\alpha+4) \exp(-c\gamma\tau) + 3(\alpha+3)(\alpha+4) \times \\ &\times (\alpha+5)^2 \exp(-2c\gamma\tau) - (\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7) \exp(-3c\gamma\tau)); \\ \frac{\partial P_4^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{c\gamma}{48} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^2(\alpha+2) \times \\ &\times (\alpha+3)(\alpha+4) - 4(\alpha+2)(\alpha+3)^2(\alpha+4)(\alpha+5) \exp(-c\gamma\tau) + \\ &+ 6(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^2(\alpha+6) \exp(-2c\gamma\tau) - 4(\alpha+4) \times \\ &\times (\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)^2 \exp(-3c\gamma\tau) + (\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7) \times \\ &\times (\alpha+8)(\alpha+9) \exp(-4c\gamma\tau)); \\ \frac{\partial P_5^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{c\gamma}{240} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^2 \times \\ &\times (\alpha+2)(\alpha+3)(\alpha+5) - 5(\alpha+2)(\alpha+3)^2(\alpha+4) \times \\ &\times (\alpha+5)(\alpha+6) \exp(-c\gamma\tau) + 10(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^2 \times \\ &\times (\alpha+6)(\alpha+7) \exp(-2c\gamma\tau) - 10(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6) \times \\ &\times (\alpha+7)^2(\alpha+8) \exp(-3c\gamma\tau) + 5(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8) \times \\ &\times (\alpha+9)^2 \exp(-4c\gamma\tau) - (\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8)(\alpha+9) \times \\ &\times (\alpha+10)(\alpha+11) \exp(-5c\gamma\tau)). \end{aligned}$$



b)

Рис. 1.50. Вид 1-ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha \in [0; 5]$, $\beta = 0$; б) $\gamma \in (0; 2]$, $c = 2$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$


$$[1.51] \quad \frac{\partial^2 P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{c^2 \gamma^2}{4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} \times \\ \times (-1)^s (2s+\alpha+1)^2 \exp(-(2s+\alpha+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:


$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 P_0^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{(\alpha+1)^2 c^2 \gamma^2}{4} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2); \\ \frac{\partial^2 P_1^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{c^2 \gamma^2}{4} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^3 - (\alpha+2) \times \\ &\times (\alpha+3)^2 \exp(-c\gamma\tau)); \\ \frac{\partial^2 P_2^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{c^2 \gamma^2}{8} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^3(\alpha+2) - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -2(\alpha+2)(\alpha+3)^3 \exp(-c\gamma\tau) + (\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^2 \times \\
& \times \exp(-2c\gamma\tau); \\
& \frac{\partial^2 P_3^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{c^2 \gamma^2}{24} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^3(\alpha+2) \times \\
& \times (\alpha+3) - 3(\alpha+2)(\alpha+3)^3(\alpha+4) \exp(-c\gamma\tau) + 3(\alpha+3) \times \\
& \times (\alpha+4)(\alpha+5)^3 \exp(-2c\gamma\tau) - (\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)^2 \times \\
& \times \exp(-3c\gamma\tau)); \\
& \frac{\partial^2 P_4^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{c^2 \gamma^2}{96} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^3(\alpha+2) \times \\
& \times (\alpha+3)(\alpha+4) - 4(\alpha+2)(\alpha+3)^3(\alpha+4)(\alpha+5) \exp(-c\gamma\tau) + \\
& + 6(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^3(\alpha+6) \exp(-2c\gamma\tau) - 4(\alpha+4)(\alpha+5) \times
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times (\alpha+6)(\alpha+7)^3 \exp(-3c\gamma\tau) + (\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8) \times \\
& \times (\alpha+9)^2 \exp(-4c\gamma\tau)); \\
& \frac{\partial^2 P_5^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{c^2 \gamma^2}{480} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^3(\alpha+2) \times \\
& \times (\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5) - 5(\alpha+2)(\alpha+3)^3(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6) \times \\
& \times \exp(-c\gamma\tau) + 10(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^3(\alpha+6)(\alpha+7) \times \\
& \times \exp(-2c\gamma\tau) - 10(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)^3(\alpha+8) \times \\
& \times \exp(-3c\gamma\tau) + 5(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8)(\alpha+9)^3 \times \\
& \times \exp(-4c\gamma\tau) - (\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8)(\alpha+9)(\alpha+10)(\alpha+11)^2 \times \\
& \times \exp(-5c\gamma\tau)).
\end{aligned}$$



a)



б)

Рис. 1.51. Вид 2-ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 0, 25, c = 2, \alpha \in [0; 5], \beta = 0$; б) $\gamma \in (0; 2], c = 2, \alpha = 1, \beta = 0$

$$[1.52] \quad \frac{\partial^3 P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{c^3 \gamma^3}{8} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} \times \\
\times (-1)^s (2s+\alpha+1)^3 \exp(-(2s+\alpha+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial^3 P_0^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{(\alpha+1)^3 c^3 \gamma^3}{8} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2); \\
& \frac{\partial^3 P_1^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{c^3 \gamma^3}{8} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^4 - \\
& - (\alpha+2)(\alpha+3)^3 \exp(-c\gamma\tau)); \\
& \frac{\partial^3 P_2^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{c^3 \gamma^3}{16} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^4(\alpha+2) - \\
& - 2(\alpha+2)(\alpha+3)^4 \exp(-c\gamma\tau) + (\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^3 \times \\
& \times \exp(-2c\gamma\tau)); \\
& \frac{\partial^3 P_3^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{c^3 \gamma^3}{48} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^4(\alpha+2) \times
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times (\alpha+3) - 3(\alpha+2)(\alpha+3)^4(\alpha+4) \exp(-c\gamma\tau) + 3(\alpha+3)(\alpha+4) \times \\
& \times (\alpha+5)^4 \exp(-2c\gamma\tau) - (\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)^3 \times \\
& \times \exp(-3c\gamma\tau)); \\
& \frac{\partial^3 P_4^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{c^3 \gamma^3}{192} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^4(\alpha+2) \times \\
& \times (\alpha+3)(\alpha+4) - 4(\alpha+2)(\alpha+3)^4(\alpha+4)(\alpha+5) \exp(-c\gamma\tau) + \\
& + 6(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^4(\alpha+6) \exp(-2c\gamma\tau) - 4(\alpha+4)(\alpha+5) \times \\
& \times (\alpha+6)(\alpha+7)^4 \exp(-3c\gamma\tau) + (\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8) \times \\
& \times (\alpha+9)^3 \exp(-4c\gamma\tau)); \\
& \frac{\partial^3 P_5^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{c^3 \gamma^3}{960} \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^4(\alpha+2) \times \\
& \times (\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5) - 5(\alpha+2)(\alpha+3)^4(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6) \times \\
& \times \exp(-c\gamma\tau) + 10(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^4(\alpha+6)(\alpha+7) \times \\
& \times \exp(-2c\gamma\tau) - 10(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)^4(\alpha+8) \times \\
& \times \exp(-3c\gamma\tau) + 5(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8)(\alpha+9)^4 \times \\
& \times \exp(-4c\gamma\tau) - (\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8)(\alpha+9)(\alpha+10)(\alpha+11)^3 \times \\
& \times \exp(-5c\gamma\tau)).
\end{aligned}$$




Рис. 1.52. Вид 3-ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha \in [0; 5]$, $\beta = 0$; б) $\gamma \in (0; 2]$, $c = 2$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[1.53] \quad \frac{\partial^n P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} \times (-1)^s (2s+\alpha+1)^n \exp(-(2s+\alpha+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^n P_0^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2);$$

$$\frac{\partial^n P_1^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^{n+1} - (\alpha+2)(\alpha+3)^n \exp(-c\gamma\tau));$$

$$\frac{\partial^n P_2^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^{n+1} \times (\alpha+2) - 2(\alpha+2)(\alpha+3)^{n+1} \exp(-c\gamma\tau) + (\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^n \times \exp(-2c\gamma\tau));$$

$$\frac{\partial^n P_3^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^{n+1} \times$$

$$\begin{aligned} &\times (\alpha+2)(\alpha+3) - 3(\alpha+2)(\alpha+3)^{n+1}(\alpha+4) \exp(-c\gamma\tau) + 3 \times \\ &\times (\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^{n+1} \exp(-2c\gamma\tau) - (\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6) \times \\ &\times (\alpha+7)^n \exp(-3c\gamma\tau)); \\ &\frac{\partial^n P_4^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^{n+1} \times \\ &\times (\alpha+2)(\alpha+3)(\alpha+4) - 4(\alpha+2)(\alpha+3)^{n+1}(\alpha+4)(\alpha+5) \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau) + 6(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^{n+1}(\alpha+6) \exp(-2c\gamma\tau) - \\ &- 4(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)^{n+1} \exp(-3c\gamma\tau) + (\alpha+5)(\alpha+6) \times \\ &\times (\alpha+7)(\alpha+8)(\alpha+9)^n \exp(-4c\gamma\tau)); \\ &\frac{\partial^n P_5^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-(\alpha+1)c\gamma\tau/2) ((\alpha+1)^{n+1} \times \\ &\times (\alpha+2)(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5) - 5(\alpha+2)(\alpha+3)^{n+1}(\alpha+4) \times \\ &\times (\alpha+5)(\alpha+6) \exp(-c\gamma\tau) + 10(\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)^{n+1}(\alpha+6) \times \\ &\times (\alpha+7) \exp(-2c\gamma\tau) - 10(\alpha+4)(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)^{n+1} \times \\ &\times (\alpha+8) \exp(-3c\gamma\tau) + 5(\alpha+5)(\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8)(\alpha+9)^{n+1} \times \\ &\times \exp(-4c\gamma\tau) - (\alpha+6)(\alpha+7)(\alpha+8)(\alpha+9)(\alpha+10)(\alpha+11)^n \times \\ &\times \exp(-5c\gamma\tau)). \end{aligned}$$




Рис. 1.53. Вид n -ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $n = 0..5, \gamma = 0, 25, c = 2, \alpha \in [0;5], \beta = 0; 6)$
б) $n = 0..5, \gamma \in (0;2], c = 2, \alpha = 1, \beta = 0$

$$[1.54] \quad \frac{\partial P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \times \\ \times (2s+1) \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-\gamma\tau)(9 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-\gamma\tau)(50 \exp(-4\gamma\tau) - 24 \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-\gamma\tau)(245 \exp(-6\gamma\tau) - 225 \exp(-4\gamma\tau) + 45 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-\gamma\tau)(1134 \exp(-8\gamma\tau) - 1568 \times \exp(-6\gamma\tau) + 630 \exp(-4\gamma\tau) - 72 \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$


$$\frac{\partial P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-\gamma\tau)(5082 \exp(-10\gamma\tau) - 9450 \times \exp(-8\gamma\tau) + 5880 \exp(-6\gamma\tau) - 1400 \exp(-4\gamma\tau) + 105 \times \exp(-2\gamma\tau) - 1).$$


Рис. 1.54. Вид 1-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25, c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$

$$[1.55] \quad \frac{\partial^2 P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \times \\ \times (2s+1)^2 \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^2 P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^2 P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(27 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^2 P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(250 \exp(-4\gamma\tau) - 72 \times \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^2 P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(1715 \exp(-6\gamma\tau) - 1125 \times \exp(-4\gamma\tau) + 135 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^2 P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \gamma^2 \exp(-\gamma\tau)(10206 \exp(-8\gamma\tau) - 10976 \times$$

$$\begin{aligned} & \times \exp(-6\gamma\tau) + 3150 \exp(-4\gamma\tau) - 216 \exp(-2\gamma\tau) + 1); \\ & \frac{\partial^2 P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = -\gamma^2 \exp(-\gamma\tau) (55902 \exp(-10\gamma\tau) - 85050 \times \\ & \times \exp(-8\gamma\tau) + 41160 \exp(-6\gamma\tau) - 7000 \exp(-4\gamma\tau) + 315 \times \\ & \times \exp(-2\gamma\tau) - 1). \end{aligned}$$




Рис. 1.55. Вид 2-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$[1.56] \quad \frac{\partial^3 P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \times (2s+1)^3 \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^3 P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^3 P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-\gamma\tau) (81 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-\gamma\tau) (1250 \exp(-4\gamma\tau) - 216 \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-\gamma\tau) (12005 \exp(-6\gamma\tau) - 5625 \times$$

$$\times \exp(-4\gamma\tau) + 405 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-\gamma\tau) (91854 \exp(-8\gamma\tau) - 76832 \times$$

$$\times \exp(-6\gamma\tau) + 15750 \exp(-4\gamma\tau) - 648 \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-\gamma\tau) (614922 \exp(-10\gamma\tau) -$$

$$- 765450 \exp(-8\gamma\tau) + 288120 \exp(-6\gamma\tau) - 35000 \exp(-4\gamma\tau) +$$

$$+ 945 \exp(-2\gamma\tau) - 1).$$




Рис. 1.56. Вид 3-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$[1.57] \quad \frac{\partial^n P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} \times (-1)^s (2s+1)^n \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^n P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^n P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (3 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^n P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (10 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) - 8 \cdot 3^n \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^n P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (35 \cdot 7^n \exp(-6\gamma\tau) -$$

$$- 45 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) + 15 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^n P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (126 \cdot 9^n \exp(-8\gamma\tau) -$$

$$- 224 \cdot 7^n \exp(-6\gamma\tau) + 126 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) - 24 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) +$$

$$+ 1);$$

$$\frac{\partial^n P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (462 \cdot 11^n \exp(-10\gamma\tau) -$$

$$- 1050 \cdot 9^n \exp(-8\gamma\tau) + 840 \cdot 7^n \exp(-6\gamma\tau) - 280 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) +$$

$$+ 35 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 1).$$




Рис. 1.57. Вид n-ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0, 5$, $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$[1.58] \quad \frac{\partial P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \times (2s+1) \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial P_0^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial P_1^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-\gamma\tau) (12 \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial P_2^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-\gamma\tau) (75 \exp(-4\gamma\tau) - 30 \exp(-2\gamma\tau) +$$

$$\begin{aligned}
& + 1); \\
& \frac{\partial P_3^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-\gamma \tau) (392 \exp(-6\gamma \tau) - 315 \exp(-4\gamma \tau) + \\
& + 54 \exp(-2\gamma \tau) - 1); \\
& \frac{\partial P_4^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \exp(-\gamma \tau) (1890 \exp(-8\gamma \tau) - 2352 \times \\
& \times \exp(-6\gamma \tau) + 840 \exp(-4\gamma \tau) - 84 \exp(-2\gamma \tau) + 1); \\
& \frac{\partial P_5^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \gamma \exp(-\gamma \tau) (8712 \exp(-10\gamma \tau) - 14850 \times \\
& \times \exp(-8\gamma \tau) + 8400 \exp(-6\gamma \tau) - 1800 \exp(-4\gamma \tau) + 120 \times \\
& \times \exp(-2\gamma \tau) - 1).
\end{aligned}$$




Рис. 1.58. Вид 1-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25, c = 2, \alpha = 0, \beta = 2$




Рис. 1.59. Вид 2-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25, c = 2, \alpha = 0, \beta = 2$

$$[1.60] \quad \frac{\partial^3 P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \times \\
\times (2s+1)^3 \exp(-(2s+1)\gamma \tau).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^3 P_0^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-\gamma \tau);$$

$$\frac{\partial^3 P_1^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-\gamma \tau) (108 \exp(-2\gamma \tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_2^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-\gamma \tau) (1875 \exp(-4\gamma \tau) - 270 \times \\
\times \exp(-2\gamma \tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_3^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-\gamma \tau) (19208 \exp(-6\gamma \tau) - 7875 \times \\
\times \exp(-4\gamma \tau) + 486 \exp(-2\gamma \tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_4^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\gamma^3 \exp(-\gamma \tau) (153090 \exp(-8\gamma \tau) - 115248 \times \\
\times \exp(-6\gamma \tau) + 21000 \exp(-4\gamma \tau) - 756 \exp(-2\gamma \tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^3 P_5^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = \gamma^3 \exp(-\gamma \tau) (1054152 \exp(-10\gamma \tau) - \\
- 1202850 \exp(-8\gamma \tau) + 411600 \exp(-6\gamma \tau) - 45000 \exp(-4\gamma \tau) + \\
+ 1080 \exp(-2\gamma \tau) - 1).$$




Рис. 1.60. Вид 3-ой производной ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25, c = 2, \alpha = 0, \beta = 2$

$$[1.61] \quad \frac{\partial^n P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} \times \\ \times (-1)^s (2s+1)^n \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^n P_0^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau);$$

$$\frac{\partial^n P_1^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (4 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^n P_2^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (15 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) - 10 \cdot 3^n \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 1);$$

$$\frac{\partial^n P_3^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (56 \cdot 7^n \exp(-6\gamma\tau) - \\ - 63 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) + 18 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 1);$$

$$\frac{\partial^n P_4^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = (-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (210 \cdot 9^n \exp(-8\gamma\tau) - \\ - 336 \cdot 7^n \exp(-6\gamma\tau) + 168 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) - 28 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 1);$$

$$\frac{\partial^n P_5^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = -(-\gamma)^n \exp(-\gamma\tau) (792 \cdot 11^n \exp(-10\gamma\tau) - \\ - 1650 \cdot 9^n \exp(-8\gamma\tau) + 1200 \cdot 7^n \exp(-6\gamma\tau) - 360 \cdot 5^n \exp(-4\gamma\tau) + \\ + 40 \cdot 3^n \exp(-2\gamma\tau) - 1).$$




Рис. 1.61. Вид n-ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$

$$[1.62] \quad \frac{\partial P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{c\gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s \times \\ \times (2s+1) \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для 1-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial P_0^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{c\gamma}{2} \exp(-c\gamma\tau/2);$$

$$\frac{\partial P_1^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{c\gamma}{2} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 3(\beta+2) \exp(-c\gamma\tau));$$

$$\frac{\partial P_2^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{c\gamma}{2} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 6(\beta+3) \exp(-c\gamma\tau) + \\ + 5(\beta+3)(\beta+4) \exp(-2c\gamma\tau)/2);$$

$$\frac{\partial P_3^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{c\gamma}{2} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 9(\beta+4) \exp(-c\gamma\tau) + \\ + 15(\beta+4)(\beta+5) \exp(-2c\gamma\tau)/2 - 7(\beta+4)(\beta+5)(\beta+6) \times \\ \times \exp(-3c\gamma\tau)/6);$$

$$\frac{\partial P_4^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{c\gamma}{2} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 12(\beta+5) \exp(-c\gamma\tau) + \\ + 15(\beta+5)(\beta+6) \exp(-2c\gamma\tau) - 14(\beta+5)(\beta+6)(\beta+7) \times \\ \times \exp(-3c\gamma\tau)/3 + 3(\beta+5)(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8) \exp(-4c\gamma\tau)/8);$$

$$\frac{\partial P_5^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\frac{c\gamma}{2} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 15(\beta+6) \exp(-c\gamma\tau) + \\ 25(\beta+6)(\beta+7) \exp(-2c\gamma\tau) - 35(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8) \times \\ \times \exp(-3c\gamma\tau)/3 + 15(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)(\beta+9) \exp(-4c\gamma\tau)/8 - \\ - 11(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)(\beta+9)(\beta+10) \exp(-5c\gamma\tau)/120).$$




Рис. 1.62. Вид 1-ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 0, 25, c = 2, \alpha = 0, \beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (0; 2], c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$

$$[1.63] \quad \frac{\partial^2 P_k^{(0, \beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{c^2 \gamma^2}{4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} \times (-1)^s (2s+1)^2 \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для 2-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^2 P_0^{(0, \beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{c^2 \gamma^2}{4} \exp(-c\gamma\tau/2);$$

$$\frac{\partial^2 P_1^{(0, \beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{c^2 \gamma^2}{4} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 9(\beta+2) \exp(-c\gamma\tau));$$

$$\frac{\partial^2 P_2^{(0, \beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} = \frac{c^2 \gamma^2}{4} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 18(\beta+3) \times \exp(-c\gamma\tau) + 25(\beta+3)(\beta+4) \exp(-2c\gamma\tau)/2);$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 P_3^{(0, \beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{c^2 \gamma^2}{4} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 27(\beta+4) \times \exp(-c\gamma\tau) + 75(\beta+4)(\beta+5) \exp(-2c\gamma\tau)/2 - 49(\beta+4)(\beta+5) \times (\beta+6) \exp(-3c\gamma\tau)/6); \\ \frac{\partial^2 P_4^{(0, \beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{c^2 \gamma^2}{4} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 36(\beta+5) \times \exp(-c\gamma\tau) + 75(\beta+5)(\beta+6) \exp(-2c\gamma\tau) - 98(\beta+5)(\beta+6) \times (\beta+7) \exp(-3c\gamma\tau)/3 + 27(\beta+5)(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8) \times \exp(-4c\gamma\tau)/8); \\ \frac{\partial^2 P_5^{(0, \beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^2} &= \frac{c^2 \gamma^2}{4} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 45(\beta+6) \exp(-c\gamma\tau) + 125(\beta+6)(\beta+7) \exp(-2c\gamma\tau) - 245(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8) \times \exp(-3c\gamma\tau/3 + 135(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)(\beta+9) \exp(-4c\gamma\tau)/8 - 121(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)(\beta+9)(\beta+10) \exp(-5c\gamma\tau)/120). \end{aligned}$$




Рис. 1.63. Вид 2-ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 0, 25, c = 2, \alpha = 0, \beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (0; 2], c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$

$$[1.64] \quad \frac{\partial^3 P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{c^3 \gamma^3}{8} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} \times (-1)^s (2s+1)^3 \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для 3-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^3 P_0^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{c^3 \gamma^3}{8} \exp(-c\gamma\tau/2);$$


$$\frac{\partial^3 P_1^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{c^3 \gamma^3}{8} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 27(\beta+2) \times$$

$\times \exp(-c\gamma\tau));$


$$\frac{\partial^3 P_2^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} = -\frac{c^3 \gamma^3}{8} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 54(\beta+3) \times$$

$\times \exp(-c\gamma\tau) + 125(\beta+3)(\beta+4) \exp(-2c\gamma\tau)/2);$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 P_3^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{c^3 \gamma^3}{8} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 81(\beta+4) \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau) + 375(\beta+4)(\beta+5) \exp(-2c\gamma\tau)/2 - 343(\beta+4) \times \\ &\times (\beta+5)(\beta+6) \exp(-3c\gamma\tau)/6); \\ \frac{\partial^3 P_4^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{c^3 \gamma^3}{8} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 108(\beta+5) \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau) + 375(\beta+5)(\beta+6) \exp(-2c\gamma\tau) - 686(\beta+5) \times \\ &\times (\beta+6)(\beta+7) \exp(-3c\gamma\tau)/3 + 243(\beta+5)(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8) \times \\ &\times \exp(-4c\gamma\tau)/8); \\ \frac{\partial^3 P_5^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^3} &= -\frac{c^3 \gamma^3}{8} \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 135(\beta+6) \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau) + 625(\beta+6)(\beta+7) \exp(-2c\gamma\tau) - 1715(\beta+6) \times \\ &\times (\beta+7)(\beta+8) \exp(-3c\gamma\tau)/3 + 1215(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)(\beta+9) \times \\ &\times \exp(-4c\gamma\tau)/8 - 1331(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)(\beta+9)(\beta+10) \times \\ &\times \exp(-5c\gamma\tau)/120). \end{aligned}$$



а)



б)

Рис. 1.64. Вид 3-ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 0, 25, c = 2, \alpha = 0, \beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (0; 2], c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$,

$$[1.65] \quad \frac{\partial^n P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} \times (-1)^s (2s+1)^n \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для n-ой производной функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial^n P_0^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-c\gamma\tau/2);$$

$$\frac{\partial^n P_1^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 3^n(\beta+2) \times$$

$\times \exp(-c\gamma\tau));$

$$\frac{\partial^n P_2^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} = \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 2 \cdot 3^n(\beta+3) \times$$

$\times \exp(-c\gamma\tau) + 5^n(\beta+3)(\beta+4) \exp(-2c\gamma\tau)/2);$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^n P_3^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 3 \cdot 3^n(\beta+4) \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau) + 3 \cdot 5^n(\beta+4) \times \\ &\times (\beta+5) \exp(-2c\gamma\tau)/2 - 7^n(\beta+4)(\beta+5)(\beta+6) \exp(-3c\gamma\tau)/6); \\ \frac{\partial^n P_4^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 4 \cdot 3^n(\beta+5) \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau) + 3 \cdot 5^n(\beta+5)(\beta+6) \exp(-2c\gamma\tau) - 2 \cdot 7^n(\beta+5) \times \\ &\times (\beta+6)(\beta+7) \exp(-3c\gamma\tau)/3 + 9^n(\beta+5)(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8) \times \\ &\times \exp(-4c\gamma\tau)/24); \\ \frac{\partial^n P_5^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} &= \left(-\frac{c\gamma}{2}\right)^n \exp(-c\gamma\tau/2) (1 - 5 \cdot 3^n(\beta+6) \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau) + 5 \cdot 5^n(\beta+6)(\beta+7) \exp(-2c\gamma\tau) - 5 \cdot 7^n(\beta+6) \times \\ &\times (\beta+7)(\beta+8) \exp(-3c\gamma\tau) + 5 \cdot 9^n(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)(\beta+9) \times \\ &\times \exp(-4c\gamma\tau) - 11^n(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)(\beta+9)(\beta+10) \times \\ &\times \exp(-5c\gamma\tau)/120). \end{aligned}$$




Рис. 1.65. Вид n-ой производной ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $n = 0..5, \gamma = 0, 25, c = 2, \alpha = 0, \beta \in [0; 5]$; б) $n = 0..5, \gamma \in (0; 2], c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$

1.3 Аналитические соотношения для неопределенных интегралов от ортогональных функций

$$[1.66] \quad \int L_k(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-\gamma)^s \times \\ \times \sum_{j=0}^s \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s-j}}{(s-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\int L_0(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$

$$\int L_1(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma\tau + 1);$$

$$\int L_2(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2\tau^2 + 2);$$

$$\int L_3(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{3\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3\tau^3 - 3\gamma^2\tau^2 + 6\gamma\tau + 6);$$

$$\int L_4(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{12\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4\tau^4 - 8\gamma^3\tau^3 + 24\gamma^2\tau^2 + 24);$$

$$\int L_5(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{60\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5\tau^5 - 15\gamma^4\tau^4 + 80\gamma^3\tau^3 - 120\gamma^2\tau^2 + 120\gamma\tau + 120).$$




Рис. 1.66. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8$

$$[1.67] \quad \int \tau L_k(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-\gamma)^s \times \\ \times (s+1) \sum_{j=0}^{s+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+1-j}}{(s+1-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau L_0(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma\tau + 2);$$

$$\int \tau L_1(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2\tau^2 + 3\gamma\tau + 6);$$

$$\int \tau L_2(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3\tau^3 + 2\gamma^2\tau^2 + 10\gamma\tau + 20);$$

$$\int \tau L_3(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{3\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4\tau^4 - \gamma^3\tau^3 + 12\gamma^2\tau^2 + 42\gamma\tau + 84);$$

$$\int \tau L_4(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{12\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5\tau^5 - 6\gamma^4\tau^4 + 24\gamma^3\tau^3 + 120\gamma^2\tau^2 - 120\gamma\tau + 120).$$




Рис. 1.67. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8$

$$\begin{aligned}
 [1.68] \quad & \int \tau^2 L_k(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-\gamma)^s \times \\
 & \times (s+1)(s+2) \sum_{j=0}^{s+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+2-j}}{(s+2-j)!}.
 \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
 & \int \tau^2 L_0(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2\tau^2 + 4\gamma\tau + 8); \\
 & \int \tau^2 L_1(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3\tau^3 + 5\gamma^2\tau^2 + 20\gamma\tau + 40); \\
 & \int \tau^2 L_2(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4\tau^4 + 4\gamma^3\tau^3 + 26\gamma^2\tau^2 + \\
 & + 104\gamma\tau + 208); \\
 & \int \tau^2 L_3(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5\tau^5 + \gamma^4\tau^4 + 26\gamma^3\tau^3 + \\
 & + 150\gamma^2\tau^2 + 600\gamma\tau + 1200); \\
 & \int \tau^2 L_4(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{12\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^6\tau^6 - 4\gamma^5\tau^5 + 32 \times \\
 & \times \gamma^4\tau^4 + 160\gamma^3\tau^3 + 984\gamma^2\tau^2 + 3936\gamma\tau + 7872); \\
 & \int \tau^2 L_5(\tau, \gamma) d\tau = \frac{\gamma^3}{960} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^7\tau^7 - 11\gamma^6\tau^6 - 68\gamma^5\tau^5 + \\
 & + 80\gamma^4\tau^4 + 1240\gamma^3\tau^3 + 7320\gamma^2\tau^2 + 29280\gamma\tau + 58560).
 \end{aligned}$$




Рис. 1.68. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8$

$$\begin{aligned}
 [1.69] \quad & \int \tau^3 L_k(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-\gamma)^s \times \\
 & \times (s+1)(s+2)(s+3) \sum_{j=0}^{s+3} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+3-j}}{(s+3-j)!}.
 \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
 & \int \tau^3 L_0(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3\tau^3 + 6\gamma^2\tau^2 + 24\gamma\tau + 48); \\
 & \int \tau^3 L_1(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4\tau^4 + 7\gamma^3\tau^3 + 42\gamma^2\tau^2 + \\
 & + 168\gamma\tau + 336); \\
 & \int \tau^3 L_2(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5\tau^5 + 6\gamma^4\tau^4 + 50\gamma^3\tau^3 + \\
 & + 300\gamma^2\tau^2 + 1200\gamma\tau + 2400); \\
 & \int \tau^3 L_3(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{3\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^6\tau^6 + 3\gamma^5\tau^5 + 48\gamma^4\tau^4 + \\
 & + 378\gamma^3\tau^3 + 2268\gamma^2\tau^2 + 9072\gamma\tau + 18144); \\
 & \int \tau^3 L_4(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{12\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^7\tau^7 - 2\gamma^6\tau^6 + 48 \times \\
 & \times \gamma^5\tau^5 + 384\gamma^4\tau^4 + 3096\gamma^3\tau^3 + 18576\gamma^2\tau^2 + 74304\gamma\tau + 148608); \\
 & \int \tau^3 L_5(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{60\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^8\tau^8 - 9\gamma^7\tau^7 + 74\gamma^6\tau^6 + \\
 & + 288\gamma^5\tau^5 + 3480\gamma^4\tau^4 + 27720\gamma^3\tau^3 + 166320\gamma^2\tau^2 + 665280\gamma\tau + \\
 & + 1330560).
 \end{aligned}$$




Рис. 1.69. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8$

$$\begin{aligned}
 [1.70] \quad & \int \tau^n L_k(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-\gamma)^s \times \\
 & \times \frac{(s+n)!}{s!} \sum_{j=0}^{s+n} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+n-j}}{(s+n-j)!}.
 \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
 & \int \tau^n L_0(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2n!}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!}; \\
 & \int \tau^n L_1(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
 & \left. - \gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} \right);
 \end{aligned}$$

1.3 Аналитические соотношения для неопределенных интегралов от ортогональных функций

43

$$\begin{aligned}
 \int \tau^n L_2(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
 &- 2\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + \frac{1}{2}\gamma^2(n+2)! \times \\
 &\times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} \Big); \\
 \int \tau^n L_3(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
 &- 3\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + \frac{3}{2}\gamma^2(n+2)! \times \\
 &\times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \frac{1}{6}\gamma^3(n+3)! \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} \Big); \\
 \int \tau^n L_4(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
 &- 4\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + 3\gamma^2(n+2)! \times \\
 &\times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \frac{2}{3}\gamma^3(n+3)! \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} + \\
 &+ \frac{1}{24}\gamma^4(n+4)! \sum_{j=0}^{n+4} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{4+n-j}}{(4+n-j)!} \Big); \\
 \int \tau^n L_5(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
 &- 5\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + 5\gamma^2(n+2)! \times \\
 &\times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \frac{5}{3}\gamma^3(n+3)! \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} + \\
 &+ \frac{5}{24}\gamma^4(n+4)! \sum_{j=0}^{n+4} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{4+n-j}}{(4+n-j)!} - \frac{1}{120}\gamma^5(n+5)! \times \\
 &\times \sum_{j=0}^{n+5} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{5+n-j}}{(5+n-j)!} \Big).
 \end{aligned}$$




Рис. 1.70. Вид неопределенного интеграла n -ого рода от ортогональных функций Лагерра 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 8$

$$\begin{aligned}
 [1.71] \quad \int L_k^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \times \\
 &\times (-\gamma)^s \sum_{j=0}^s \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s-j}}{(s-j)!}.
 \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
 \int L_0^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right); \\
 \int L_1^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= 2 \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \tau; \\
 \int L_2^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 - 2\gamma\tau + 2); \\
 \int L_3^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \tau (\gamma^2 \tau^2 - 6\gamma\tau + 12); \\
 \int L_4^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{12\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 12\gamma^3 \tau^3 + 48\gamma^2 \tau^2 - \\
 &- 48\gamma\tau + 24); \\
 \int L_5^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{60} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \tau (\gamma^4 \tau^4 - 20\gamma^3 \tau^3 + 140\gamma^2 \tau^2 - \\
 &- 360\gamma\tau + 360).
 \end{aligned}$$




Рис. 1.71. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8$, $\alpha = 1$

$$\begin{aligned}
 [1.72] \quad \int \tau L_k^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \times \\
 &\times (-\gamma)^s (s+1) \sum_{j=0}^{s+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+1-j}}{(s+1-j)!}.
 \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
 \int \tau L_0^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma\tau + 2); \\
 \int \tau L_1^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{2}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 + 2\gamma\tau + 4); \\
 \int \tau L_2^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 + 6\gamma\tau + 12); \\
 \int \tau L_3^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{3\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 4\gamma^3 \tau^3 + 12\gamma^2 \tau^2 + \\
 &+ 24\gamma\tau + 48); \\
 \int \tau L_4^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{12\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 10\gamma^4 \tau^4 + 40 \times \\
 &\times \gamma^3 \tau^3 + 120\gamma\tau + 240); \\
 \int \tau L_5^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{60\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^6 \tau^6 - 18\gamma^5 \tau^5 + 120 \times \\
 &\times \gamma^4 \tau^4 - 240\gamma^3 \tau^3 + 360\gamma^2 \tau^2 + 720\gamma\tau + 1440).
 \end{aligned}$$




Рис. 1.72. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8, \alpha = 1$

$$[1.73] \quad \int \tau^2 L_k^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \times (-\gamma)^s (s+1)(s+2) \sum_{j=0}^{s+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+2-j}}{(s+2-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^2 L_0^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 + 4\gamma\tau + 8); \\ \int \tau^2 L_1^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{2}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 + 4\gamma^2 \tau^2 + 16\gamma\tau + 32); \\ \int \tau^2 L_2^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 + 2\gamma^3 \tau^3 + 18\gamma^2 \tau^2 + 72\gamma\tau + 144); \\ \int \tau^2 L_3^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 2\gamma^4 \tau^4 + 20\gamma^3 \tau^3 + 96\gamma^2 \tau^2 + 384\gamma\tau + 768); \\ \int \tau^2 L_4^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{12\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^6 \tau^6 - 8\gamma^5 \tau^5 + 40 \times \gamma^4 \tau^4 + 80\gamma^3 \tau^3 + 600\gamma^2 \tau^2 + 2400\gamma\tau + 4800); \\ \int \tau^2 L_5^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{\gamma^3}{960} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^7 \tau^7 - 16\gamma^6 \tau^6 + 108 \times \gamma^5 \tau^5 - 120\gamma^4 \tau^4 + 840\gamma^3 \tau^3 + 4320\gamma^2 \tau^2 + 17280\gamma\tau + 34560). \end{aligned}$$




Рис. 1.73. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8, \alpha = 1$

$$[1.74] \quad \int \tau^3 L_k^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \times (-\gamma)^s (s+1)(s+2)(s+3) \sum_{j=0}^{s+3} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+3-j}}{(s+3-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^3 L_0^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 + 6\gamma^2 \tau^2 + 24\gamma\tau + 48); \\ \int \tau^3 L_1^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{2}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 + 6\gamma^3 \tau^3 + 36\gamma^2 \tau^2 + 144\gamma\tau + 288); \\ \int \tau^3 L_2^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 + 4\gamma^4 \tau^4 + 38\gamma^3 \tau^3 + 228\gamma^2 \tau^2 + 912\gamma\tau + 1824); \\ \int \tau^3 L_3^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{3\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^6 \tau^6 + 36\gamma^4 \tau^4 + 264 \times \gamma^3 \tau^3 + 1584\gamma^2 \tau^2 + 6336\gamma\tau + 12672); \\ \int \tau^3 L_4^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{12\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^7 \tau^7 - 6\gamma^6 \tau^6 + 48 \times \gamma^5 \tau^5 + 240\gamma^4 \tau^4 + 2040\gamma^3 \tau^3 + 12240\gamma^2 \tau^2 + 48960\gamma\tau + 97920); \\ \int \tau^3 L_5^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{60\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^8 \tau^8 - 14\gamma^7 \tau^7 + 104 \times \gamma^6 \tau^6 + 48\gamma^5 \tau^5 + 2280\gamma^4 \tau^4 + 17520\gamma^3 \tau^3 + 105120\gamma^2 \tau^2 + 420480\gamma\tau + 840960). \end{aligned}$$




Рис. 1.74. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8, \alpha = 1$

$$[1.75] \quad \int \tau^n L_k^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \times (-\gamma)^s \frac{(s+n)!}{s!} \sum_{j=0}^{s+n} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+n-j}}{(s+n-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^n L_0^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2n!}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!}; \\ \int \tau^n L_1^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!}\right) - \end{aligned}$$

1.3 Аналитические соотношения для неопределенных интегралов от ортогональных функций

45

$$\begin{aligned}
& -2\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!}; \\
\int \tau^n L_2^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
& - 3\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + \frac{3}{2}\gamma^2(n+2)! \times \\
& \times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} \right); \\
\int \tau^n L_3^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
& - 4\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + 3\gamma^2(n+2)! \times \\
& \times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \frac{2}{3}\gamma^3(n+3)! \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} \right); \\
\int \tau^n L_4^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
& - 5\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + 5\gamma^2(n+2)! \times \\
& \times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \frac{5}{3}\gamma^3(n+3)! \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} + \\
& + \frac{5}{24}\gamma^4(n+4)! \sum_{j=0}^{n+4} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{4+n-j}}{(4+n-j)!} \right); \\
\int \tau^n L_5^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
& - 6\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + \frac{15}{2}\gamma^2(n+2)! \times \\
& \times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \frac{10}{3}\gamma^3(n+3)! \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} + \\
& + \frac{5}{8}\gamma^4(n+4)! \sum_{j=0}^{n+4} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{4+n-j}}{(4+n-j)!} - \frac{1}{20}\gamma^5(n+5)! \times \\
& \times \sum_{j=0}^{n+5} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{5+n-j}}{(5+n-j)!} \left. \right).
\end{aligned}$$




Рис. 1.75. Вид неопределенного интеграла n -ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 8$, $\alpha = 1$

$$[1.76] \quad \int L_k^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \times \\
\times (-\gamma)^s \sum_{j=0}^s \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{s-j}}{(s-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
\int L_0^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right); \\
\int L_1^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = \frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma\tau - 1); \\
\int L_2^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^2\tau^2 - 4\gamma\tau + 4); \\
\int L_3^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = \frac{1}{3\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^3\tau^3 - 9\gamma^2\tau^2 + 24\gamma\tau - 12); \\
\int L_4^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{12\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^4\tau^4 - 16\gamma^3\tau^3 + 84\gamma^2\tau^2 - \\
& - 144\gamma\tau + 72); \\
\int L_5^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = \frac{1}{60\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^5\tau^5 - 25\gamma^4\tau^4 + 220\gamma^3\tau^3 - \\
& - 780\gamma^2\tau^2 + 1080\gamma\tau - 360).
\end{aligned}$$




Рис. 1.76. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8$, $\alpha = 2$

$$[1.77] \quad \int \tau L_k^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \times \\
\times (-\gamma)^s (s+1) \sum_{j=0}^{s+1} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{s+1-j}}{(s+1-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
\int \tau L_0^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{2}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma\tau + 2); \\
\int \tau L_1^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = \frac{2}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^2\tau^2 + \gamma\tau + 2); \\
\int \tau L_2^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^3\tau^3 - 2\gamma^2\tau^2 + 4\gamma\tau + 8); \\
\int \tau L_3^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = \frac{1}{3\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^4\tau^4 - 7\gamma^3\tau^3 + 18\gamma^2\tau^2 + \\
& + 12\gamma\tau + 24); \\
\int \tau L_4^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{12\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma^5\tau^5 - 14\gamma^4\tau^4 + 68 \times \\
& \times \gamma^3\tau^3 - 72\gamma^2\tau^2 + 72\gamma\tau + 144);
\end{aligned}$$




Рис. 1.77. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8, \alpha = 2$

$$[1.78] \quad \int \tau^2 L_k^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \times (-\gamma)^s (s+1)(s+2) \sum_{j=0}^{s+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+2-j}}{(s+2-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^2 L_0^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 + 4\gamma\tau + 8); \\ \int \tau^2 L_1^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{2}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 + 3\gamma^2 \tau^2 + 12\gamma\tau + 24); \\ \int \tau^2 L_2^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 + 12\gamma^2 \tau^2 + 48\gamma\tau + 96); \\ \int \tau^2 L_3^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 5\gamma^4 \tau^4 + 20\gamma^3 \tau^3 + 60\gamma^2 \tau^2 + 240\gamma\tau + 480); \\ \int \tau^2 L_4^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{12\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^6 \tau^6 - 12\gamma^5 \tau^5 + 60 \times \gamma^4 \tau^4 + 360\gamma^2 \tau^2 + 1440\gamma\tau + 2880); \\ \int \tau^2 L_5^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{960} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^7 \tau^7 - 21\gamma^6 \tau^6 + 168 \times \gamma^5 \tau^5 - 420\gamma^4 \tau^4 + 840\gamma^3 \tau^3 + 2520\gamma^2 \tau^2 + 10080\gamma\tau + 20160). \end{aligned}$$




Рис. 1.78. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8, \alpha = 2$

$$[1.79] \quad \int \tau^3 L_k^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \times (-\gamma)^s (s+1)(s+2)(s+3) \sum_{j=0}^{s+3} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+3-j}}{(s+3-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^3 L_0^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 + 6\gamma^2 \tau^2 + 24\gamma\tau + 48); \\ \int \tau^3 L_1^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{2}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 + 5\gamma^3 \tau^3 + 30\gamma^2 \tau^2 + 120\gamma\tau + 240); \\ \int \tau^3 L_2^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 + 2\gamma^4 \tau^4 + 28\gamma^3 \tau^3 + 168\gamma^2 \tau^2 + 672\gamma\tau + 1344); \\ \int \tau^3 L_3^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{3\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^6 \tau^6 - 3\gamma^5 \tau^5 + 30\gamma^4 \tau^4 + 180\gamma^3 \tau^3 + 1080\gamma^2 \tau^2 + 4320\gamma\tau + 8640); \\ \int \tau^3 L_4^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{12\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^7 \tau^7 - 10\gamma^6 \tau^6 + 60 \times \gamma^5 \tau^5 + 120\gamma^4 \tau^4 + 1320\gamma^3 \tau^3 + 7920\gamma^2 \tau^2 + 31680\gamma\tau + 63360); \\ \int \tau^3 L_5^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= \frac{1}{60\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^8 \tau^8 - 19\gamma^7 \tau^7 + 154 \times \gamma^6 \tau^6 - 252\gamma^5 \tau^5 + 1680\gamma^4 \tau^4 + 10920\gamma^3 \tau^3 + 65520\gamma^2 \tau^2 + 262080\gamma\tau + 524160). \end{aligned}$$




Рис. 1.79. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 8, \alpha = 2$

$$[1.80] \quad \int \tau^n L_k^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \times (-\gamma)^s \frac{(s+n)!}{s!} \sum_{j=0}^{s+n} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+n-j}}{(s+n-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^n L_0^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2n!}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!}; \\ \int \tau^n L_1^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!}\right) - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -3\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!}; \\
 & \int \tau^n L_2^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
 & -4\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + 3\gamma^2(n+2)! \times \\
 & \times \sum_{j=0}^{2+n} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} \left. \right); \\
 & \int \tau^n L_3^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
 & -5\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + 5\gamma^2(n+2)! \times \\
 & \times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \frac{5}{3}\gamma^3(n+3)! \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} \left. \right); \\
 & \int \tau^n L_4^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
 & -6\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + \frac{15}{2}\gamma^2(n+2)! \times \\
 & \times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \frac{10}{3}\gamma^3(n+3)! \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \times \\
 & \times \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} + \frac{5}{8}\gamma^4(n+4)! \sum_{j=0}^{n+4} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{4+n-j}}{(4+n-j)!} \left. \right); \\
 & \int \tau^n L_5^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\
 & -7\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{1+n} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + \frac{21}{2}\gamma^2(n+2)! \times \\
 & \times \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \frac{35}{6}\gamma^3(n+3)! \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \times \\
 & \times \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} + \frac{35}{24}\gamma^4(n+4)! \sum_{j=0}^{n+4} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{4+n-j}}{(4+n-j)!} - \\
 & -\frac{7}{40}\gamma^5(n+5)! \sum_{j=0}^{n+5} \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{5+n-j}}{(5+n-j)!} \left. \right).
 \end{aligned}$$




Рис. 1.80. Вид неопределенного интеграла n-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка; $n = 0..5, \gamma = 8, \alpha = 2$

$$[1.81] \quad \int L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \times \\
 \times (-\gamma)^s \sum_{j=0}^s \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{s-j}}{(s-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
 & \int L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right); \\
 & \int L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma\tau - \alpha + 1); \\
 & \int L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2\tau^2 - 2\alpha\gamma\tau + \alpha^2 - \alpha + 2); \\
 & \int L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{3\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3\tau^3 - 3(\alpha+1)\gamma^2\tau^2 + 3 \times \\
 & \times (\alpha^2 + \alpha + 2)\gamma\tau - \alpha^3 - 5\alpha + 6); \\
 & \int L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{12\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4\tau^4 - 4(\alpha+2)\gamma^3\tau^3 + 6 \times \\
 & \times (\alpha^2 + 3\alpha + 4)\gamma^2\tau^2 - 4(\alpha^3 + 3\alpha^2 + 8\alpha)\gamma\tau + \alpha^4 + 2\alpha^3 + 11\alpha^2 - \\
 & -14\alpha + 24); \\
 & \int L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{60\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5\tau^5 - 5(\alpha+3)\gamma^4\tau^4 + 10 \times \\
 & \times (\alpha^2 + 5\alpha + 8)\gamma^3\tau^3 - 10(\alpha^3 + 6\alpha^2 + 17\alpha + 12)\gamma^2\tau^2 + 5(\alpha^4 + 6\alpha^3 + \\
 & + 23\alpha^2 + 18\alpha + 24)\gamma\tau - \alpha^5 - 5\alpha^4 - 25\alpha^3 + 5\alpha^2 - 94\alpha + 120).
 \end{aligned}$$





Рис. 1.81. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 8$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [5; 10]$, $\alpha = 1$

$$[1.82] \quad \int \tau L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \times \\ \times (-\gamma)^s (s+1) \sum_{j=0}^{s+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+1-j}}{(s+1-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma\tau + 2);$$

$$\int \tau L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2\tau^2 - (\alpha - 3)\gamma\tau - 2\alpha + 6);$$

$$\int \tau L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3\tau^3 - 2(\alpha - 1)\gamma^2\tau^2 +$$

$$+ (\alpha^2 - 5\alpha + 10)\gamma\tau + 2\alpha^2 - 10\alpha + 20); \\ \int \tau L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{3\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4\tau^4 - (3\alpha + 1)\gamma^3\tau^3 + \\ + 3(\alpha^2 - \alpha + 4)\gamma^2\tau^2 - (\alpha^3 - 6\alpha^2 + 23\alpha - 42)\gamma\tau - 2(\alpha^3 + 6\alpha^2 - \\ - 23\alpha + 42)); \\ \int \tau L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{12\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5\tau^5 - 2(2\alpha + 3)\gamma^4\tau^4 + \\ + 2(3\alpha^2 + 5\alpha + 12)\gamma^3\tau^3 - 4(\alpha^3 + 11\alpha - 12)\gamma^2\tau^2 + (\alpha^4 + 6\alpha^3 + \\ + 35\alpha^2 - 126\alpha + 216)\gamma\tau + 2(\alpha^4 - 6\alpha^3 + 35\alpha^2 - 126\alpha + 216)); \\ \int \tau L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{60\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^6\tau^6 - (5\alpha + 13)\gamma^5\tau^5 + \\ + 10(\alpha^2 + 4\alpha + 7)\gamma^4\tau^4 - 10(\alpha^3 + 4\alpha^2 + 15\alpha + 4)\gamma^3\tau^3 + 5(\alpha^4 + 2\alpha^3 + \\ + 23\alpha^2 - 26\alpha + 72)\gamma^2\tau^2 - (\alpha^5 - 5\alpha^4 + 45\alpha^3 - 235\alpha^2 + 794\alpha - \\ - 1320)\gamma\tau - 2(\alpha^5 - 5\alpha^4 + 45\alpha^3 - 235\alpha^2 + 794\alpha - 1320)).$$






Рис. 1.82. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 8$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [5; 10]$, $\alpha = 1$

$$[1.83] \quad \int \tau^2 L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \times \\ \times (-\gamma)^s (s+1)(s+2) \sum_{j=0}^{s+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+2-j}}{(s+2-j)!}.$$


Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^2 L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2 \tau^2 + 4\gamma\tau + 8); \\ \int \tau^2 L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 - (\alpha - 5)\gamma^2 \tau^2 - 4 \times \\ \times (\alpha - 5)\gamma\tau - 8(\alpha - 5)); \\ \int \tau^2 L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - 2(\alpha - 2)\gamma^3 \tau^3 +$$



a)

$$+ (\alpha^2 - 9\alpha + 26)\gamma^2 \tau^2 + 4(\alpha^2 - 9\alpha + 26)\gamma\tau + 8(\alpha^2 - 9\alpha + 26)); \\ \int \tau^2 L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{3\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - (3\alpha - 1)\gamma^4 \tau^4 + \\ + (3\alpha^2 - 9\alpha + 26)\gamma^3 \tau^3 - (\alpha^3 - 12\alpha^2 + 65\alpha - 150)\gamma^2 \tau^2 - 4 \times \\ \times (\alpha^3 - 12\alpha^2 + 65\alpha - 150)\gamma\tau - 8(\alpha^3 + 12\alpha^2 - 65\alpha + 150)); \\ \int \tau^2 L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{12\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^6 \tau^6 - 4(\alpha + 1)\gamma^5 \tau^5 + \\ + 2(3\alpha^2 + \alpha + 16)\gamma^4 \tau^4 - 4(\alpha^3 - 3\alpha^2 + 22\alpha - 40)\gamma^3 \tau^3 + \\ + (\alpha^4 - 14\alpha^3 + 107\alpha^2 - 478\alpha + 984)\gamma^2 \tau^2 + 4(\alpha^4 - 14\alpha^3 + 107\alpha^2 - 478\alpha + 984)); \\ \int \tau^2 L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{60\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^7 \tau^7 - (5\alpha + 11)\gamma^6 \tau^6 + \\ + 2(5\alpha^2 + 15\alpha + 34)\gamma^5 \tau^5 - 10(\alpha^3 + 2\alpha^2 + 17\alpha - 8)\gamma^4 \tau^4 + 5 \times \\ \times (\alpha^4 - 2\alpha^3 + 39\alpha^2 - 118\alpha + 248)\gamma^3 \tau^3 - (\alpha^5 - 15\alpha^4 + 145\alpha^3 - 945 \times \\ \times \alpha^2 + 3814\alpha - 7320)\gamma^2 \tau^2 - 4(\alpha^5 - 15\alpha^4 + 145\alpha^3 - 945\alpha^2 + 3814 \times \\ \times \alpha - 7320)\gamma\tau - 8(\alpha^5 - 15\alpha^4 + 145\alpha^3 - 945\alpha^2 + 3814\alpha - 7320)).$$



б)

Рис. 1.83. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 8$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [5; 10]$, $\alpha = 1$

$$[1.84] \quad \int \tau^3 L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \times \\ \times (-\gamma)^s (s+1)(s+2)(s+3) \sum_{j=0}^{s+3} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+3-j}}{(s+3-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^3 L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3 \tau^3 + 6\gamma^2 \tau^2 + 24\gamma\tau + \\ + 48); \\ \int \tau^3 L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^4 \tau^4 - (\alpha - 7)\gamma^3 \tau^3 - 6 \times \\ \times (\alpha - 7)\gamma^2 \tau^2 - 24(\alpha - 7)\gamma\tau - 48(\alpha - 7)); \\ \int \tau^3 L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^5 \tau^5 - 2(\alpha - 3)\gamma^4 \tau^4 + \\ + (\alpha^2 - 13\alpha + 50)\gamma^3 \tau^3 + 6(\alpha^2 - 13\alpha + 50)\gamma^2 \tau^2 + 24(\alpha^2 - 13\alpha +$$

$$+ 50)\gamma\tau + 48(\alpha^2 - 13\alpha + 50)); \\ \int \tau^3 L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{3\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^6 \tau^6 - 3(\alpha - 1)\gamma^5 \tau^5 + 3 \times \\ \times (\alpha^2 - 5\alpha + 16)\gamma^4 \tau^4 - (\alpha^3 - 18\alpha^2 + 131\alpha - 378)\gamma^3 \tau^3 - 6(\alpha^3 - \\ - 18\alpha^2 + 131\alpha - 378)\gamma^2 \tau^2 - 24(\alpha^3 - 18\alpha^2 + 131\alpha - 378)\gamma\tau - \\ - 48(\alpha^3 - 18\alpha^2 + 131\alpha - 378)); \\ \int \tau^3 L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{12\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^7 \tau^7 - 2(2\alpha + 1) \times \\ \times \gamma^6 \tau^6 + 6(\alpha^2 - \alpha + 8)\gamma^5 \tau^5 - 4(\alpha^3 - 6\alpha^2 + 41\alpha - 96)\gamma^4 \tau^4 + \\ + 4(\alpha^4 - 22\alpha^3 + 227\alpha^2 - 1262\alpha + 3096)\gamma^3 \tau^3 + 6(\alpha^4 - 22\alpha^3 + 227\alpha^2 + \\ \times \alpha^2 - 1262\alpha + 3096)\gamma^2 \tau^2 + 24(\alpha^4 - 22\alpha^3 + 227\alpha^2 - 1262\alpha + 3096)\gamma\tau + \\ + 48(\alpha^4 - 22\alpha^3 + 227\alpha^2 - 1262\alpha + 3096)); \\ \int \tau^3 L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{1}{60\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^8 \tau^8 - (5\alpha + 9)\gamma^7 \tau^7 + \\ + 2(5\alpha^2 + 10\alpha + 37)\gamma^6 \tau^6 - 2(5\alpha^3 - 115\alpha + 144)\gamma^5 \tau^5 + 5(\alpha^4 - \\ - 6\alpha^3 + 71\alpha^2 - 306\alpha + 696)\gamma^4 \tau^4 - (\alpha^5 - 25\alpha^4 + 325\alpha^3 - 2615\alpha^2 + \\ + 12514\alpha - 27720)\gamma^3 \tau^3 - 6(\alpha^5 - 25\alpha^4 + 325\alpha^3 - 2615\alpha^2 + \\ + 12514\alpha - 27720)\gamma^2 \tau^2 - 24(\alpha^5 - 25\alpha^4 + 325\alpha^3 - 2615\alpha^2 + \\ + 12514\alpha - 27720)\gamma\tau - 48(\alpha^5 - 25\alpha^4 + 325\alpha^3 - 2615\alpha^2 + 12514 \times \\ \times \alpha - 27720)).$$




Рис. 1.84. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 8$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [5; 10]$, $\alpha = 1$

$$[1.85] \quad \int \tau^n L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \times \\ \times (-\gamma)^s \frac{(s+n)!}{s!} \sum_{j=0}^{s+n} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{s+n-j}}{(s+n-j)!}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^n L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2n!}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!}; \\ \int \tau^n L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\ &\quad \left. - (\alpha+1)\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} \right); \\ \int \tau^n L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\ &\quad \left. - (\alpha+2)\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + \right. \\ &\quad \left. + (\alpha+1)(\alpha+2)\gamma^2(n+2)! \frac{1}{4} \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} \right); \\ \int \tau^n L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\ &\quad \left. - (\alpha+3)\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + \right. \\ &\quad \left. + (\alpha+2)(\alpha+3)\gamma^2(n+2)! \frac{1}{4} \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\quad \left. - (\alpha+1)(\alpha+2)(\alpha+3)\gamma^3(n+3)! \frac{1}{36} \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} \right); \\ \int \tau^n L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\ &\quad \left. - (\alpha+4)\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + \right. \\ &\quad \left. + (\alpha+3)(\alpha+4)\gamma^2(n+2)! \frac{1}{4} \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \right. \\ &\quad \left. - (\alpha+2)(\alpha+3)(\alpha+4)\gamma^3(n+3)! \frac{1}{36} \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} + \right. \\ &\quad \left. + (\alpha+4)!\gamma^4(n+4)! \frac{1}{24\alpha!} \sum_{j=0}^{n+4} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{4+n-j}}{(4+n-j)!} \right); \\ \int \tau^n L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \left(n! \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!} - \right. \\ &\quad \left. - (\alpha+5)\gamma(n+1)! \sum_{j=0}^{n+1} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{1+n-j}}{(1+n-j)!} + \right. \\ &\quad \left. + (\alpha+4)(\alpha+5)\gamma^2(n+2)! \frac{1}{4} \sum_{j=0}^{n+2} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{2+n-j}}{(2+n-j)!} - \right. \\ &\quad \left. - (\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)\gamma^3(n+3)! \frac{1}{36} \sum_{j=0}^{n+3} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{3+n-j}}{(3+n-j)!} + \right. \\ &\quad \left. + (\alpha+4)!\gamma^4(n+4)! \frac{1}{576(\alpha+1)!} \sum_{j=0}^{n+4} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{4+n-j}}{(4+n-j)!} - \right. \\ &\quad \left. - (\alpha+5)!\gamma^5(n+5)! \frac{1}{14400\alpha!} \sum_{j=0}^{n+5} \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{5+n-j}}{(5+n-j)!} \right). \end{aligned}$$




Рис. 1.85. Вид неопределенного интеграла n-ого рода от ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $n = 0.5$, $\gamma = 8$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $n = 0.5$, $\gamma \in [5; 10]$, $\alpha = 1$

$$[1.86] \quad \int P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} \times \frac{2(-1)^s}{\gamma(4s+1)} \exp\left(-\frac{(4s+1)}{2}\gamma\tau\right).$$




Рис. 1.86. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\int P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right);$$

$$\int P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{5\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(5 - 3 \exp(-2\gamma\tau));$$

$$\int P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{36\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(27 - 54 \exp(-2\gamma\tau) + 35 \exp(-4\gamma\tau));$$

$$\int P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{104\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(65 - 273 \times \exp(-2\gamma\tau) + 455 \exp(-4\gamma\tau) - 231 \exp(-6\gamma\tau));$$

$$\int P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{1088\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(595 - 4284 \times \exp(-2\gamma\tau) + 13090 \exp(-4\gamma\tau) - 15708 \exp(-6\gamma\tau) + 6435 \exp(-8\gamma\tau));$$

$$\int P_5^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{2688\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(1323 - 14553 \times \exp(-2\gamma\tau) + 70070 \exp(-4\gamma\tau) - 145530 \exp(-6\gamma\tau) + 135135 \exp(-8\gamma\tau) - 46189 \exp(-10\gamma\tau)).$$

$$[1.87] \quad \int \tau P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} \times (-1)^s \exp\left(-\frac{(4s+1)}{2}\gamma\tau\right) \left(\frac{2\tau}{\gamma(4s+1)} + \frac{4}{\gamma^2(4s+1)^2} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(\gamma\tau + 2);$$

$$\int \tau P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{25\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(50 - 6 \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(25 - 15 \exp(-2\gamma\tau)));$$

$$\int \tau P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{1620\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(2430 - 972 \times$$

$$\times \exp(-2\gamma\tau) + 350 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(1215 - 2430 \exp(-2\gamma\tau) + 1575 \exp(-4\gamma\tau)));$$

$$\int \tau P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{60840\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right)(76059 -$$

$$- 63882 \exp(-2\gamma\tau) + 59150 \exp(-4\gamma\tau) - 20790 \exp(-6\gamma\tau) +$$

$$\begin{aligned}
& + \gamma\tau(38025 - 159705 \exp(-2\gamma\tau) + 266175 \exp(-4\gamma\tau) - \\
& - 135135 \exp(-6\gamma\tau))); \\
& \int \tau P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{10820160\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (11834550 - \\
& - 17041752 \exp(-2\gamma\tau) + 28928900 \exp(-4\gamma\tau) - 24033240 \times \\
& \times \exp(-6\gamma\tau) + 7528950 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(5917275 - \\
& - 42604380 \exp(-2\gamma\tau) + 130180050 \exp(-4\gamma\tau) - 156216060 \times \\
& \times \exp(-6\gamma\tau) + 63996075 \exp(-8\gamma\tau))); \\
& \int \tau P_5^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{187125120\gamma^2} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times \\
& \times (184201290 - 405242838 \exp(-2\gamma\tau) + 1083982900 \times \\
& \times \exp(-4\gamma\tau) - 1558626300 \exp(-6\gamma\tau) + 1106755650 \times \\
& \times \exp(-8\gamma\tau) - 306233070 \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau(92100645 - \\
& - 1013107095 \exp(-2\gamma\tau) + 4877923050 \exp(-4\gamma\tau) - \\
& - 10131070950 \exp(-6\gamma\tau) + 9407423025 \exp(-8\gamma\tau) - \\
& - 3215447235 \exp(-10\gamma\tau))).
\end{aligned}$$




Рис. 1.87. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned}
[1.88] \quad & \int \tau^2 P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\
& = -\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \exp\left(-\frac{(4s+1)}{2}\gamma\tau\right) \times \\
& \times \left(\frac{2\tau^2}{\gamma(4s+1)} + \frac{8\tau}{\gamma^2(4s+1)^2} + \frac{16}{\gamma^3(4s+1)^3} \right).
\end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
& \int \tau^2 P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^2\tau^2 + 4\gamma\tau + 8); \\
& \int \tau^2 P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{125\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (1000 - 24 \times \\
& \times \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(500 - 60 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(125 - 75 \times \\
& \times \exp(-2\gamma\tau))); \\
& \int \tau^2 P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{72900\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (437400 - \\
& - 34992 \exp(-2\gamma\tau) + 7000 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(218700 - 87480 \times \\
& \times \exp(-2\gamma\tau) + 31500 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(54675 - 109350 \times \\
& \times \exp(-2\gamma\tau) + 70875 \exp(-4\gamma\tau))); \\
& \int \tau^2 P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{35591400\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times \\
& \times (177957000 - 29896776 \exp(-2\gamma\tau) + 15379000 \exp(-4\gamma\tau) - \\
& - 3742200 \exp(-6\gamma\tau) + \gamma\tau(88978500 - 74741940 \exp(-2\gamma\tau) + \\
& + 69205500 \exp(-4\gamma\tau) - 24324300 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 \times \\
& \times (22244625 - 93427425 \exp(-2\gamma\tau) + 155712375 \exp(-4\gamma\tau) -
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - 79053975 \exp(-6\gamma\tau))); \\
& \int \tau^2 P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{107606491200\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times \\
& \times (470778399000 - 135584178912 \exp(-2\gamma\tau) + 127865738000 \times \\
& \times \exp(-4\gamma\tau) - 73541714400 \exp(-6\gamma\tau) + 17617743000 \times \\
& \times \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(235389199500 - 338960447280 \exp(-2\gamma\tau) + \\
& + 575395821000 \exp(-4\gamma\tau) - 478021143600 \exp(-6\gamma\tau) + \\
& + 149750815500 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(58847299875 - \\
& - 423700559100 \exp(-2\gamma\tau) + 1294640597250 \exp(-4\gamma\tau) - \\
& - 1553568716700 \exp(-6\gamma\tau) + 636440965875 \exp(-8\gamma\tau)); \\
& \int \tau^2 P_5^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{13026715228800\gamma^3} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times \\
& \times (51292691213400 - 22568784133896 \exp(-2\gamma\tau) + \\
& + 33538430926000 \exp(-4\gamma\tau) - 33385775346000 \exp(-6\gamma\tau) + \\
& + 18128657547000 \exp(-8\gamma\tau) - 4060650508200 \exp(-10\gamma\tau) + \\
& + \gamma\tau(25646345606700 - 56421960334740 \exp(-2\gamma\tau) + \\
& + 150922939167000 \exp(-4\gamma\tau) - 217007539749000 \times \\
& \times \exp(-6\gamma\tau) + 154093589149500 \exp(-8\gamma\tau) - \\
& - 42636830336100 \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(6411586401675 - \\
& - 70527450418425 \exp(-2\gamma\tau) + 339576613125750 \exp(-4\gamma\tau) - \\
& - 705274504184250 \exp(-6\gamma\tau) + 654897753885375 \times \\
& \times \exp(-8\gamma\tau) - 223843359264525 \exp(-10\gamma\tau)).
\end{aligned}$$




Рис. 1.88. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned}
[1.89] \quad & \int \tau^3 P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\
& = -\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \exp\left(-\frac{(4s+1)}{2}\gamma\tau\right) \times \\
& \times \left(\frac{2\tau^3}{\gamma(4s+1)} + \frac{12\tau^2}{\gamma^2(4s+1)^2} + \right. \\
& \left. + \frac{48\tau}{\gamma^3(4s+1)^3} + \frac{96}{\gamma^4(4s+1)^4} \right).
\end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
& \int \tau^3 P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (\gamma^3\tau^3 + 6\gamma^2\tau^2 + \\
& + 24\gamma\tau + 48); \\
& \int \tau^3 P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{625\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (30000 - \\
& - 144 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(15000 - 360 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(3750 - \\
& - 450 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(625 - 375 \exp(-2\gamma\tau))); \\
& \int \tau^3 P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{1093500\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (39366000 - \\
& - 629856 \exp(-2\gamma\tau) + 70000 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(19683000 -
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -1574640 \exp(-2\gamma\tau) + 315000 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma^2 \tau^2 (4920750 - \\
 & -1968300 \exp(-2\gamma\tau) + 708750 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 (820125 - \\
 & -1640250 \exp(-2\gamma\tau) + 1063125 \exp(-4\gamma\tau)); \\
 & \int \tau^3 P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{6940323000\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times \\
 & \times (208209690000 - 6995845584 \exp(-2\gamma\tau) + 1999270000 \times \\
 & \times \exp(-4\gamma\tau) - 336798000 \exp(-6\gamma\tau) + \gamma\tau(104104845000 - \\
 & -17489613960 \exp(-2\gamma\tau) + 8996715000 \exp(-4\gamma\tau) - \\
 & -2189187000 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 (26026211250 - 21862017450 \times \\
 & \times \exp(-2\gamma\tau) + 20242608750 \exp(-4\gamma\tau) - 7114857750 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 (4337701875 - 18218347875 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 30363913125 \exp(-4\gamma\tau) - 15415525125 \exp(-6\gamma\tau)); \\
 & \int \tau^3 P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{356715518328000\gamma^4} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times \\
 & \times (9363782356110000 - 539353863711936 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 282583280980000 \exp(-4\gamma\tau) - 112518823032000 \exp(-6\gamma\tau) + \\
 & + 20612759310000 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(4681891178055000 - \\
 & -1348384659279840 \exp(-2\gamma\tau) + 1271624764410000 \times \\
 & \times \exp(-4\gamma\tau) - 731372349708000 \exp(-6\gamma\tau) + 175208454135000 \times \\
 & \times \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 (1170472794513750 - 1685480824099800 \times \\
 & \times \exp(-2\gamma\tau) + 2861155719922500 \exp(-4\gamma\tau) - \\
 & -2376960136551000 \exp(-6\gamma\tau) + 744635930073750 \times \\
 & \times \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 (195078799085625 - 1404567353416500 \times \\
 & \times \exp(-2\gamma\tau) + 4291733579883750 \exp(-4\gamma\tau) - \\
 & -5150080295860500 \exp(-6\gamma\tau) + 2109801801875625 \times \\
 & \times \exp(-8\gamma\tau)); \\
 & \int \tau^3 P_5^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{302284926884304000\gamma^4} \times \\
 & \times \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) (7141481397641682000 - 628450362992468016 \times \\
 & \times \exp(-2\gamma\tau) + 518839526425220000 \exp(-4\gamma\tau) - \\
 & -357561653955660000 \exp(-6\gamma\tau) + 148473705309930000 \times \\
 & \times \exp(-8\gamma\tau) - 26922112869366000 \exp(-10\gamma\tau) + \\
 & + \gamma\tau(3570740698820841000 - 1571125907481170040 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 2334777868913490000 \exp(-4\gamma\tau) - 2324150750711790000 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau) + 1262026495134405000 \exp(-8\gamma\tau) - \\
 & -282682185128343000 \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 \times \\
 & \times (892685174705210250 - 1963907384351462550 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 5253250205053532500 \exp(-4\gamma\tau) - 7553489939813317500 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau) + 5363612604321221250 \exp(-8\gamma\tau) - \\
 & -1484081471923800750 \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 \times \\
 & \times (148780862450868375 - 1636589486959552125 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 7879875307583028750 \exp(-4\gamma\tau) - 16365894869595521250 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau) + 15196902378910126875 \exp(-8\gamma\tau) - \\
 & -5194285151733302625 \exp(-10\gamma\tau))).
 \end{aligned}$$




Рис. 1.89. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned}
 [1.90] \quad & \int \tau^n P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\
 & = -\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \exp\left(-\frac{(4s+1)}{2}\gamma\tau\right) \times \\
 & \times \sum_{j=0}^n \frac{n! \tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{\gamma(4s+1)}{2}\right)^{j+1}}.
 \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^n P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2n!}{\gamma} \exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!};$$

$$\int \tau^n P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times$$

$$\times \left(\frac{n!}{2} \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right.$$

$$\left. - \frac{3n!}{2} \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{5\gamma}{2}\right)^{j+1}} \right);$$

$$\int \tau^n P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times$$

$$\times \left(\frac{3n!}{8} \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right.$$

$$\left. - \frac{15n!}{4} \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{5\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \right.$$

$$\left. + \frac{35n!}{8} \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{9\gamma}{2}\right)^{j+1}} \right);$$

$$\int \tau^n P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times$$

$$\times \left(\frac{5n!}{16} \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right.$$

$$\left. - \frac{105n!}{16} \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{5\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \right.$$

$$\left. + \frac{315n!}{16} \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{9\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right.$$

$$\left. - \frac{231n!}{16} \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{13\gamma}{2}\right)^{j+1}} \right);$$

$$\int \tau^n P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times$$

$$\times \left(\frac{35n!}{128} \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right.$$

$$\begin{aligned}
& - \frac{315n!}{32} \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{5\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \\
& + \frac{3465n!}{64} \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{9\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \\
& - \frac{3003n!}{32} \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{13\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \\
& + \frac{6435n!}{128} \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{17\gamma}{2}\right)^{j+1}} \Big); \\
\int \tau^n P_5^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\exp\left(-\frac{\gamma\tau}{2}\right) \times \\
& \times \left(\frac{63n!}{256} \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right. \\
& - \frac{3465n!}{256} \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{5\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \\
& + \frac{15015n!}{128} \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{9\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \\
& - \frac{45045n!}{128} \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{13\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \\
& + \frac{109395n!}{256} \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{17\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \\
& \left. - \frac{46189n!}{256} \exp(-10\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{21\gamma}{2}\right)^{j+1}} \right).
\end{aligned}$$




Рис. 1.90. Вид неопределенного интеграла n-ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$[1.91] \quad \int Leg_k(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} \times \\
\times \frac{(-1)^s}{\gamma(2s+1)} \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
\int Leg_0(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{\gamma} \exp(-\gamma\tau); \\
\int Leg_1(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{3\gamma} \exp(-\gamma\tau)(3 - 2 \exp(-2\gamma\tau)); \\
\int Leg_2(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{5\gamma} \exp(-\gamma\tau)(5 - 10 \exp(-2\gamma\tau) + 6 \times \\
\times \exp(-4\gamma\tau)); \\
\int Leg_3(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{7\gamma} \exp(-\gamma\tau)(7 - 28 \exp(-2\gamma\tau) + 42 \times \\
\times \exp(-4\gamma\tau) - 20 \exp(-6\gamma\tau)); \\
\int Leg_4(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{9\gamma} \exp(-\gamma\tau)(9 - 60 \exp(-2\gamma\tau) + 162 \times \\
\times \exp(-4\gamma\tau) - 180 \exp(-6\gamma\tau) + 70 \exp(-8\gamma\tau)); \\
\int Leg_5(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{11\gamma} \exp(-\gamma\tau)(11 - 110 \exp(-2\gamma\tau) + 462 \times \\
\times \exp(-4\gamma\tau) - 880 \exp(-6\gamma\tau) + 770 \exp(-8\gamma\tau) - 252 \times \\
\times \exp(-10\gamma\tau)).
\end{aligned}$$




Рис. 1.91. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$

$$[1.92] \quad \int \tau Leg_k(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \times \\
\times \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau}{\gamma(2s+1)} + \frac{1}{\gamma^2(2s+1)^2} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
\int \tau Leg_0(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(\gamma\tau + 1); \\
\int \tau Leg_1(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{9\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(9 - 2 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(9 - \\
- 6 \exp(-2\gamma\tau))); \\
\int \tau Leg_2(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{75\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(75 - 50 \exp(-2\gamma\tau) + \\
+ 18 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(75 - 150 \exp(-2\gamma\tau) + 90 \exp(-4\gamma\tau))); \\
\int \tau Leg_3(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{735\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(735 - 980 \exp(-2\gamma\tau) + \\
+ 882 \exp(-4\gamma\tau) - 300 \exp(-6\gamma\tau) + \gamma\tau(735 - 2940 \exp(-2\gamma\tau) + \\
+ 4410 \exp(-4\gamma\tau) - 2100 \exp(-6\gamma\tau)));
\end{aligned}$$

$$\int \tau Leg_4(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{2835\gamma^2} \exp(-\gamma\tau) (12835 - 6300 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 10206 \exp(-4\gamma\tau) - 8100 \exp(-6\gamma\tau) + 2450 \times \\ \times \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(2835 - 18900 \exp(-2\gamma\tau) + 51030 \exp(-4\gamma\tau) - \\ - 56700 \exp(-6\gamma\tau) + 22050 \exp(-8\gamma\tau)));$$

$$\int \tau Leg_5(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{38115\gamma^2} \exp(-\gamma\tau) (38115 - \\ - 127050 \exp(-2\gamma\tau) + 320166 \exp(-4\gamma\tau) - 435600 \exp(-6\gamma\tau) + \\ + 296450 \exp(-8\gamma\tau) - 79380 \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau(38115 - \\ - 381150 \exp(-2\gamma\tau) + 1600830 \exp(-4\gamma\tau) - 3049200 \times \\ \times \exp(-6\gamma\tau) + 2668050 \exp(-8\gamma\tau) - 873180 \exp(-10\gamma\tau))).$$




Рис. 1.92. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$

$$+ 16074450 \exp(-4\gamma\tau) - 17860500 \exp(-6\gamma\tau) + 6945750 \times \\ \times \exp(-8\gamma\tau));$$

$$\int \tau^2 Leg_5(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{132068475\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (264136950 - \\ - 293485500 \exp(-2\gamma\tau) + 443750076 \exp(-4\gamma\tau) - 431244000 \times \\ \times \exp(-6\gamma\tau) + 228266500 \exp(-8\gamma\tau) - 50009400 \exp(-10\gamma\tau) + \\ + \gamma\tau(264136950 - 880456500 \exp(-2\gamma\tau) + 2218750380 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) - 3018708000 \exp(-6\gamma\tau) + 2054398500 \times \\ \times \exp(-8\gamma\tau) - 550103400 \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(132068475 - \\ - 1320684750 \exp(-2\gamma\tau) + 5546875950 \exp(-4\gamma\tau) - \\ - 10565478000 \exp(-6\gamma\tau) + 9244793250 \exp(-8\gamma\tau) - \\ - 3025568700 \exp(-10\gamma\tau))).$$




Рис. 1.93. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$

$$[1.93] \quad \int \tau^2 Leg_k(\tau, \gamma) d\tau = -\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \times \\ \times \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau^2}{\gamma(2s+1)} + \right. \\ \left. + \frac{2\tau}{\gamma^2(2s+1)^2} + \frac{2}{\gamma^3(2s+1)^3} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^2 Leg_0(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (\gamma^2\tau^2 + 2\gamma\tau + 2);$$

$$\int \tau^2 Leg_1(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{27\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (54 - 4 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + \gamma\tau(54 - 12 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma^2\tau^2(27 - 18 \exp(-2\gamma\tau)));$$

$$\int \tau^2 Leg_2(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{1125\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (2250 - 500 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 108 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(2250 - 1500 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 540 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(1125 - 2250 \exp(-2\gamma\tau) + 1350 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau));$$

$$\int \tau^2 Leg_3(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{77175\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (154350 - \\ - 68600 \exp(-2\gamma\tau) + 37044 \exp(-4\gamma\tau) - 9000 \exp(-6\gamma\tau) + \\ + \gamma\tau(154350 - 205800 \exp(-2\gamma\tau) + 185220 \exp(-4\gamma\tau) - \\ - 63000 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(77175 - 308700 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 463050 \exp(-4\gamma\tau) - 220500 \exp(-6\gamma\tau));$$

$$\int \tau^2 Leg_4(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{893025\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (1786050 - \\ - 1323000 \exp(-2\gamma\tau) + 1285956 \exp(-4\gamma\tau) - 729000 \times \\ \times \exp(-6\gamma\tau) + 171500 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(1786050 - 3969000 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 6429780 \exp(-4\gamma\tau) - 5103000 \exp(-6\gamma\tau) + \\ + 1543500 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(893025 - 5953500 \exp(-2\gamma\tau) +$$

$$[1.94] \quad \int \tau^3 Leg_k(\tau, \gamma) d\tau = -\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \times \\ \times \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau^3}{\gamma(2s+1)} + \frac{3\tau^2}{\gamma^2(2s+1)^2} + \right. \\ \left. + \frac{6\tau}{\gamma^3(2s+1)^3} + \frac{6}{\gamma^4(2s+1)^4} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^3 Leg_0(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (\gamma^3\tau^3 + 3\gamma^2\tau^2 + 6\gamma\tau + 6);$$

$$\int \tau^3 Leg_1(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{27\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (162 - 4 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + \gamma\tau(162 - 12 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma^2\tau^2(81 - 18 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3 \times \\ \times (27 - 18 \exp(-2\gamma\tau)));$$

$$\int \tau^3 Leg_2(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{5625\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (33750 - 2500 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 324 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(33750 - 7500 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 1620 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(16875 - 11250 \exp(-2\gamma\tau) + 4050 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(5625 - 11250 \exp(-2\gamma\tau) + 6750 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau));$$

$$\int \tau^3 Leg_3(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{2701125\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (16206750 - \\ - 2401000 \exp(-2\gamma\tau) + 777924 \exp(-4\gamma\tau) - 135000 \exp(-6\gamma\tau) + \\ + \gamma\tau(16206750 - 7203000 \exp(-2\gamma\tau) + 3889620 \exp(-4\gamma\tau) - \\ - 945000 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(8103375 - 10804500 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 9724050 \exp(-4\gamma\tau) - 3307500 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(2701125 - \\ - 10804500 \exp(-2\gamma\tau) + 16206750 \exp(-4\gamma\tau) - 7717500 \times \\ \times \exp(-6\gamma\tau));$$

$$\int \tau^3 Leg_4(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{93767625\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (562605750 -$$

$$\begin{aligned}
& -138915000 \exp(-2\gamma\tau) + 81015228 \exp(-4\gamma\tau) - 32805000 \times \\
& \times \exp(-6\gamma\tau) + 6002500 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(562605750 - \\
& - 416745000 \exp(-2\gamma\tau) + 405076140 \exp(-4\gamma\tau) - 229635000 \times \\
& \times \exp(-6\gamma\tau) + 54022500 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(281302875 - \\
& - 625117500 \exp(-2\gamma\tau) + 1012690350 \exp(-4\gamma\tau) - 803722500 \times \\
& \times \exp(-6\gamma\tau) + 243101250 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(93767625 - \\
& - 625117500 \exp(-2\gamma\tau) + 1687817250 \exp(-4\gamma\tau) - \\
& - 1875352500 \exp(-6\gamma\tau) + 729303750 \exp(-8\gamma\tau)); \\
& \int \tau^3 Leg_5(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{152539088625\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) \times \\
& \times (915234531750 - 338975752500 \exp(-2\gamma\tau) + \\
& + 307518802668 \exp(-4\gamma\tau) - 213465780000 \exp(-6\gamma\tau) + \\
& + 87882602500 \exp(-8\gamma\tau) - 15752961000 \exp(-10\gamma\tau) + \\
& + \gamma\tau(915234531750 - 1016927257500 \exp(-2\gamma\tau) + \\
& + 1537594013340 \exp(-4\gamma\tau) - 1494260460000 \exp(-6\gamma\tau) + \\
& + 790943422500 \exp(-8\gamma\tau) - 173282571000 \exp(-10\gamma\tau)) + \\
& + \gamma^2\tau^2(457617265875 - 1525390886250 \exp(-2\gamma\tau) + \\
& + 3843985033350 \exp(-4\gamma\tau) - 5229911610000 \exp(-6\gamma\tau) + \\
& + 3559245401250 \exp(-8\gamma\tau) - 953054140500 \exp(-10\gamma\tau)) + \\
& + \gamma^3\tau^3(152539088625 - 1525390886250 \exp(-2\gamma\tau) + \\
& + 6406641722250 \exp(-4\gamma\tau) - 12203127090000 \exp(-6\gamma\tau) + \\
& + 10677736203750 \exp(-8\gamma\tau) - 3494531848500 \exp(-10\gamma\tau))). \\
& \int \tau^3 Leg_k(\tau, \gamma) d\tau
\end{aligned}$$




Рис. 1.94. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$

$$\begin{aligned}
[1.95] \quad & \int \tau^n Leg_k(\tau, \gamma) d\tau = -\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \times \\
& \times \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{n! \tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma(2s+1))^{j+1}}.
\end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^n Leg_0(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2n!}{\gamma} \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!};$$

$$\int \tau^n Leg_1(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times$$

$$\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right.$$

$$\left. - n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} \right);$$

$$\int \tau^n Leg_2(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times$$

$$\begin{aligned}
& \times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
& - 6n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} + \\
& + 6n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} \Big); \\
& \int \tau^n Leg_3(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
& \times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
& - 12n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} + \\
& + 30n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} - \\
& - 20n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} \Big); \\
& \int \tau^n Leg_4(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
& \times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
& - 20n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} + \\
& + 90n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} - \\
& - 140n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} + \\
& + 70n! \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (9\gamma)^{j+1}} \Big); \\
& \int \tau^n Leg_5(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
& \times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
& - 30n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} + \\
& + 210n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} - \\
& - 560n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} + \\
& + 630n! \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (9\gamma)^{j+1}} - \\
& \left. - 252n! \exp(-10\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (11\gamma)^{j+1}} \right).
\end{aligned}$$

1.3 Аналитические соотношения для неопределенных интегралов от ортогональных функций

57




Рис. 1.95. Вид неопределенного интеграла n -ого рода от ортогональных функций Лежандра 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 2$, $c = 2$




Рис. 1.96. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$[1.96] \quad \int P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} \times \frac{2(-1)^s}{\gamma(4s+3)} \exp\left(-\frac{(4s+3)}{2}\gamma\tau\right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{3\gamma} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right); \\ \int P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{7\gamma} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(7 - 5 \exp(-2\gamma\tau)); \\ \int P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{44\gamma} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(55 - 110 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 63 \exp(-4\gamma\tau)); \\ \int P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{120\gamma} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(175 - 675 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 945 \exp(-4\gamma\tau) - 429 \exp(-6\gamma\tau)); \\ \int P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{1216\gamma} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(1995 - 12540 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 31122 \exp(-4\gamma\tau) - 32604 \exp(-6\gamma\tau) + 12155 \times \\ &\times \exp(-8\gamma\tau)); \\ \int P_5^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{2944\gamma} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(5313 - 49335 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 188370 \exp(-4\gamma\tau) - 335478 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 279565 \exp(-8\gamma\tau) - 88179 \exp(-10\gamma\tau)). \end{aligned}$$

$$[1.97] \quad \int \tau P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} \times \\ \times (-1)^s \exp\left(-\frac{(4s+3)}{2}\gamma\tau\right) \left(\frac{2\tau}{\gamma(4s+3)} + \frac{4}{\gamma^2(4s+3)^2} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{9\gamma^2} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(3\gamma\tau + 2); \\ \int \tau P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{147\gamma^2} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(98 - 30 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(147 - 105 \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{10164\gamma^2} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(8470 - 7260 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 2646 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(12705 - 25410 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 14553 \exp(-4\gamma\tau))); \\ \int \tau P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{138600\gamma^2} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(134750 - \\ &- 222750 \exp(-2\gamma\tau) + 198450 \exp(-4\gamma\tau) - 66066 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ \gamma\tau(202125 - 779625 \exp(-2\gamma\tau) + 1091475 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 495495 \exp(-6\gamma\tau))); \\ \int \tau P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{8895040\gamma^2} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(9728950 - \\ &- 26208600 \exp(-2\gamma\tau) + 41392260 \exp(-4\gamma\tau) - 31799768 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau) + 9359350 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(14593425 - 91730100 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 227657430 \exp(-4\gamma\tau) - 238498260 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 88913825 \exp(-8\gamma\tau))); \\ \int \tau P_5^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{495313280\gamma^2} \times \\ &\times \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right)(595923790 - 2371533450 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 5762238300 \exp(-4\gamma\tau) - 7525666148 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 4951096150 \exp(-8\gamma\tau) - 1290058770 \exp(-10\gamma\tau) + \\ &+ \gamma\tau(893885685 - 8300367075 \exp(-2\gamma\tau) + 31692310650 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 56442496110 \exp(-6\gamma\tau) + 47035413425 \times \\ &\times \exp(-8\gamma\tau) - 14835675855 \exp(-10\gamma\tau))). \end{aligned}$$




Рис. 1.97. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned} [1.98] \int \tau^2 P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \exp\left(-\frac{(4s+3)}{2}\gamma\tau\right) \times \\ \times \left(\frac{2\tau^2}{\gamma(4s+3)} + \frac{8\tau}{\gamma^2(4s+3)^2} + \frac{16}{\gamma^3(4s+3)^3} \right). \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^2 P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{27\gamma^3} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (9\gamma^2\tau^2 + 12\gamma\tau + \\ + 8); \\ \int \tau^2 P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{3087\gamma^3} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (2744 - 360 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(4116 - 1260 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma^2\tau^2(3087 - 2205 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{2347884\gamma^3} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (2608760 - \\ - 958320 \exp(-2\gamma\tau) + 222264 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(3913140 - \\ - 3354120 \exp(-2\gamma\tau) + 1222452 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(2934855 - \\ - 5869710 \exp(-2\gamma\tau) + 3361743 \exp(-4\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{160083000\gamma^3} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times \\ \times (207515000 - 147015000 \exp(-2\gamma\tau) + 83349000 \exp(-4\gamma\tau) - \\ - 20348328 \exp(-6\gamma\tau) + \gamma\tau(311272500 - 514552500 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 4458419500 \exp(-4\gamma\tau) - 152612460 \times \\ \times \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(233454375 - 900466875 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 1260653625 \exp(-4\gamma\tau) - 572296725 \times \\ \times \exp(-6\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{195201652800\gamma^3} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times \\ \times (284669077000 - 328655844000 \exp(-2\gamma\tau) + 330310234800 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) - 186092242336 \exp(-6\gamma\tau) + 43240197000 \times \\ \times \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(427003615500 - 1150295454000 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 1816706291400 \exp(-4\gamma\tau) - 1395691817520 \exp(-6\gamma\tau) + \\ + 410781871500 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(320252711625 - \\ - 2013017044500 \exp(-2\gamma\tau) + 4995942301350 \exp(-4\gamma\tau) - \\ - 5233844315700 \exp(-6\gamma\tau) + 1951213889625 \exp(-8\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_5^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{250001948380800\gamma^3} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times \\ \times (401044792194200 - 683997677649000 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 1057601217582000 \exp(-4\gamma\tau) - 1012924560856208 \times \\ \times \exp(-6\gamma\tau) + 526103476899000 \exp(-8\gamma\tau) - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & - 113241358830600 \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau(601567188291300 - \\ & - 2393991871771500 \exp(-2\gamma\tau) + 5816806696701000 \times \\ & \times \exp(-4\gamma\tau) - 7596934206421560 \exp(-6\gamma\tau) + \\ & + 4997983030540500 \exp(-8\gamma\tau) - 1302275626551900 \times \\ & \times \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(451175391218475 - 4189485775600125 \times \\ & \times \exp(-2\gamma\tau) + 15996218415927750 \exp(-4\gamma\tau) - \\ & - 28488503274080850 \exp(-6\gamma\tau) + 4997983030540500 \times \\ & \times \exp(-8\gamma\tau) - 1302275626551900 \exp(-10\gamma\tau)). \end{aligned}$$




Рис. 1.98. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned} [1.99] \int \tau^3 P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \exp\left(-\frac{(4s+3)}{2}\gamma\tau\right) \times \\ \times \left(\frac{2\tau^3}{\gamma(4s+3)} + \frac{12\tau^2}{\gamma^2(4s+31)^2} + \right. \\ \left. + \frac{48\tau}{\gamma^3(4s+3)^3} + \frac{96}{\gamma^4(4s+3)^4} \right). \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^3 P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{27\gamma^4} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (9\gamma^3\tau^3 + 18\gamma^2\tau^2 + \\ + 24\gamma\tau + 16); \\ \int \tau^3 P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{21609\gamma^4} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (38416 - \\ - 2160 \times \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(57624 - 7560 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 \times \\ \times (43218 - 13230 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(21609 - 15435 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{180787068\gamma^4} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times \\ \times (401749040 - 63249120 \exp(-2\gamma\tau) + 9335088 \exp(-4\gamma\tau) + \\ + \gamma\tau(602623560 - 221371920 \exp(-2\gamma\tau) + 51342984 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(451967670 - 387400860 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 141193206 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(225983835 - 451967670 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 258854211 \exp(-4\gamma\tau)); \\ \int \tau^3 P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{61631955000\gamma^4} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times \\ \times (159786550000 - 48514950000 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 17503290000 \exp(-4\gamma\tau) - 3133642512 \exp(-6\gamma\tau) + \\ + \gamma\tau(239679825000 - 169802325000 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 96268095000 \exp(-4\gamma\tau) - 23502318840 \exp(-6\gamma\tau) + \\ + \gamma^2\tau^2(179759868750 - 297154068750 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 264737261250 \exp(-4\gamma\tau) - 88133695650 \exp(-6\gamma\tau) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \gamma^3 \tau^3 (89879934375 - 346679746875 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 485351645625 \exp(-4\gamma\tau) - 220334239125 \exp(-6\gamma\tau)); \\
 & \int \tau^3 P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{1427900090232000\gamma^4} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times \\
 & \times (4164708596510000 - 2060672141880000 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 1317937836852000 \exp(-4\gamma\tau) - 544505901075136 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau) + 99884855070000 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau \times \\
 & \times (6247062894765000 - 7212352496580000 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 7248658102686000 \exp(-4\gamma\tau) - 4083794258063520 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau) + 948096123165000 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 \times \\
 & \times (4685297171073750 - 12621616869015000 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 19933809782386500 \exp(-4\gamma\tau) - 15314228467738200 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau) + 4507304085033750 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 \times \\
 & \times (2342648585536875 - 14725219680517500 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 36545317934375250 \exp(-4\gamma\tau) - 38285571169345500 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau) + 14273129602606875 \exp(-8\gamma\tau)); \\
 & \int \tau^3 P_5^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{42061577805327696000\gamma^4} \times \\
 & \times \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) (134947562125426358000 - \\
 & - 98639305093762290000 \exp(-2\gamma\tau) + 97056063737500140000 \times \\
 & \times \exp(-4\gamma\tau) - 68167797096501085984 \exp(-6\gamma\tau) + \\
 & + 27951877727643870000 \exp(-8\gamma\tau) - 4970163239075034000 \times \\
 & \times \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau (202421343188139537000 - \\
 & - 345237567828168015000 \exp(-2\gamma\tau) + 533808350556250770000 \times \\
 & \times \exp(-4\gamma\tau) - 511258478223758144880 \exp(-6\gamma\tau) + \\
 & + 265542838412616765000 \exp(-8\gamma\tau) - 57156877249362891000 \times \\
 & \times \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 (151816007391104652750 - \\
 & - 604165743699294026250 \exp(-2\gamma\tau) + 1467972964029689617500 \times \\
 & \times \exp(-4\gamma\tau) - 1917219293339093043300 \exp(-6\gamma\tau) + \\
 & + 1261328482459929633750 \exp(-8\gamma\tau) - 328652044183836623250 \times \\
 & \times \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 (75908003695552326375 - \\
 & - 704860034315843030625 \exp(-2\gamma\tau) + 2691283767387764298750 \times \\
 & \times \exp(-4\gamma\tau) - 4793048233347732608250 \exp(-6\gamma\tau) + \\
 & + 3994206861123110506875 \exp(-8\gamma\tau) - \\
 & - 1259832836038040389125 \exp(-10\gamma\tau)).
 \end{aligned}$$




Рис. 1.99. Вид неопределенного интеграла 3-го рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned}
 [1.100] \quad & \int \tau^n P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\
 & = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \exp\left(-\frac{(4s+3)}{2}\gamma\tau\right) \times \\
 & \times \sum_{j=0}^n \frac{n! \tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{\gamma(4s+3)}{2}\right)^{j+1}}.
 \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^n P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2n!}{3\gamma} \exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{3\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!};$$

$$\int \tau^n P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times$$

$$\times \left(\frac{3n!}{2} \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{3\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right.$$

$$\left. - \frac{5n!}{2} \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{7\gamma}{2}\right)^{j+1}} \right);$$

$$\int \tau^n P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times$$

$$\times \left(\frac{15n!}{8} \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{3\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right.$$

$$\left. - \frac{35n!}{4} \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{7\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \right.$$

$$+ \frac{63n!}{8} \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{11\gamma}{2}\right)^{j+1}} \Bigg);$$

$$\int \tau^n P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times$$

$$\times \left(\frac{35n!}{16} \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{3\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right.$$

$$- \frac{315n!}{16} \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{7\gamma}{2}\right)^{j+1}} +$$

$$+ \frac{693n!}{16} \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{11\gamma}{2}\right)^{j+1}} -$$

$$- \frac{429n!}{16} \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{15\gamma}{2}\right)^{j+1}} \Bigg);$$

$$\int \tau^n P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times$$

$$\times \left(\frac{315n!}{128} \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{3\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right.$$

$$\begin{aligned}
& - \frac{1155n!}{32} \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{7\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \\
& + \frac{9009n!}{64} \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{11\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \\
& - \frac{6435n!}{32} \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{15\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \\
& + \frac{12155n!}{128} \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{19\gamma}{2}\right)^{j+1}} \Bigg); \\
\int \tau^n P_5^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\exp\left(-\frac{3\gamma\tau}{2}\right) \times \\
& \times \left(\frac{693n!}{256} \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{3\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \right. \\
& - \frac{15015n!}{256} \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{7\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \\
& + \frac{45045n!}{128} \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{11\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \\
& - \frac{109395n!}{128} \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{15\gamma}{2}\right)^{j+1}} + \\
& + \frac{230945n!}{256} \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{19\gamma}{2}\right)^{j+1}} - \\
& \left. - \frac{88179n!}{256} \exp(-10\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! \left(\frac{23\gamma}{2}\right)^{j+1}} \right).
\end{aligned}$$




Рис. 1.100. Вид неопределенного интеграла n-ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned}
[1.101] \quad \int P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} \times \\
& \times \frac{(-1)^s}{\gamma(s+1)} \exp(-(s+1)\gamma\tau).
\end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
\int P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{\gamma} \exp(-\gamma\tau); \\
\int P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{2\gamma} \exp(-\gamma\tau)(4 - 3 \exp(-\gamma\tau)); \\
\int P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{3\gamma} \exp(-\gamma\tau)(9 - 18 \exp(-\gamma\tau) + 10 \times \\
& \times \exp(-2\gamma\tau)); \\
\int P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{4\gamma} \exp(-\gamma\tau)(16 - 60 \exp(-\gamma\tau) + 80 \times \\
& \times \exp(-2\gamma\tau) - 35 \exp(-3\gamma\tau)); \\
\int P_4^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{5\gamma} \exp(-\gamma\tau)(25 - 150 \exp(-\gamma\tau) + 350 \times \\
& \times \exp(-2\gamma\tau) - 350 \exp(-3\gamma\tau) + 126 \exp(-4\gamma\tau)); \\
\int P_5^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{6\gamma} \exp(-\gamma\tau)(36 - 315 \exp(-\gamma\tau) + 1120 \times \\
& \times \exp(-2\gamma\tau) - 1890 \exp(-3\gamma\tau) + 1512 \exp(-4\gamma\tau) - 462 \times \\
& \times \exp(-5\gamma\tau)).
\end{aligned}$$




Рис. 1.101. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned}
[1.102] \quad \int \tau P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} \times \\
& \times (-1)^s \exp(-(s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau}{\gamma(s+1)} + \frac{1}{\gamma^2(s+1)^2} \right).
\end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
\int \tau P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(\gamma\tau + 1); \\
\int \tau P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{4\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(8 - 3 \exp(-\gamma\tau) + \gamma\tau(8 - \\
& - 6 \exp(-\gamma\tau))); \\
\int \tau P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{9\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(27 - 27 \exp(-\gamma\tau) + 10 \times \\
& \times \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(27 - 54 \exp(-\gamma\tau) + 30 \exp(-2\gamma\tau))); \\
\int \tau P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau & = -\frac{1}{48\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(192 - 360 \exp(-\gamma\tau) + \\
& + 320 \exp(-2\gamma\tau) - 105 \exp(-3\gamma\tau) + \gamma\tau(192 - 720 \exp(-\gamma\tau) + \\
& + 960 \exp(-2\gamma\tau) - 420 \exp(-3\gamma\tau)));
\end{aligned}$$

1.3 Аналитические соотношения для неопределенных интегралов от ортогональных функций

61




Рис. 1.102. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[1.103] \quad \int \tau^2 P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} \times (-1)^s \exp(-(s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau^2}{\gamma(s+1)} + \frac{2\tau}{\gamma^2(s+1)^2} + \frac{2}{\gamma^3(s+1)^3} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^2 P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (\gamma^2\tau^2 + 2\gamma\tau + 2); \\ \int \tau^2 P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{4\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (16 - 3 \exp(-\gamma\tau) + \gamma\tau (16 - 6 \exp(-\gamma\tau) + \gamma^2\tau^2 (8 - 6 \exp(-\gamma\tau)))); \\ \int \tau^2 P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{27\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (162 - 81 \exp(-\gamma\tau) + 20 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau (162 - 162 \exp(-\gamma\tau) + 60 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 (81 - 162 \exp(-\gamma\tau) + 90 \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{288\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (2304 - 2160 \times \exp(-\gamma\tau) + 1280 \exp(-2\gamma\tau) - 315 \exp(-3\gamma\tau) + \gamma\tau (2304 - 4320 \exp(-\gamma\tau) + 3840 \exp(-2\gamma\tau) - 1260 \exp(-3\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 (1152 - 4320 \exp(-\gamma\tau) + 5760 \exp(-2\gamma\tau) - 2520 \times \exp(-3\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_4^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{4500\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (45000 - 67500 \times \exp(-\gamma\tau) + 70000 \exp(-2\gamma\tau) - 39375 \exp(-3\gamma\tau) + 9072 \times \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau (45000 - 135000 \exp(-\gamma\tau) + 210000 \times \exp(-2\gamma\tau) - 157500 \exp(-3\gamma\tau) + 45360 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 \times (22500 - 135000 \exp(-\gamma\tau) + 315000 \exp(-2\gamma\tau) - 315000 \times \exp(-3\gamma\tau))); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\times \exp(-3\gamma\tau) + 113400 \exp(-4\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_5^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{5400\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (64800 - 141750 \times \exp(-\gamma\tau) + 224000 \exp(-2\gamma\tau) - 212625 \exp(-3\gamma\tau) + 108864 \times \exp(-4\gamma\tau) - 23100 \exp(-5\gamma\tau) + \gamma\tau (64800 - 283500 \times \exp(-\gamma\tau) + 672000 \exp(-2\gamma\tau) - 850500 \exp(-3\gamma\tau) + 544320 \exp(-4\gamma\tau) - 138600 \exp(-5\gamma\tau) + \gamma^2\tau^2 (32400 - 283500 \exp(-\gamma\tau) + 1008000 \exp(-2\gamma\tau) - 1701000 \exp(-3\gamma\tau) + 1360800 \exp(-4\gamma\tau) - 415800 \exp(-5\gamma\tau))). \end{aligned}$$




Рис. 1.103. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[1.104] \quad \int \tau^3 P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} \times \begin{aligned} &\times (-1)^s \exp(-(s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau^3}{\gamma(s+1)} + \frac{3\tau^2}{\gamma^2(s+1)^2} + \right. \\ &\left. + \frac{6\tau}{\gamma^3(s+1)^3} + \frac{6}{\gamma^4(s+1)^4} \right). \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^3 P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (\gamma^3\tau^3 + 3\gamma^2\tau^2 + 6\gamma\tau + 6); \\ \int \tau^3 P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{8\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (96 - 9 \exp(-\gamma\tau) + \gamma\tau (96 - 18 \exp(-\gamma\tau) + \gamma^2\tau^2 (48 - 18 \exp(-\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3 (16 - 12 \exp(-\gamma\tau)))); \\ \int \tau^3 P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{54\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (972 - 243 \exp(-\gamma\tau) + 40 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau (972 - 486 \exp(-\gamma\tau) + 120 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 (486 - 486 \exp(-\gamma\tau) + 180 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3 (162 - 324 \exp(-\gamma\tau) + 180 \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{1152\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (27648 - 12960 \times \exp(-\gamma\tau) + 5120 \exp(-2\gamma\tau) - 945 \exp(-3\gamma\tau) + \gamma\tau (27648 - 25920 \exp(-\gamma\tau) + 15360 \exp(-2\gamma\tau) - 3780 \exp(-3\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 (13824 - 25920 \exp(-\gamma\tau) + 23040 \exp(-2\gamma\tau) - 7560 \times \exp(-3\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3 (4608 - 17280 \exp(-\gamma\tau) + 23040 \times \exp(-2\gamma\tau) - 10080 \exp(-3\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_4^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{90000\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (2700000 - 2025000 \exp(-\gamma\tau) + 1400000 \exp(-2\gamma\tau) - 590625 \times \exp(-3\gamma\tau) + 108864 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau (2700000 - 4050000 \times \exp(-\gamma\tau) + 4200000 \exp(-2\gamma\tau) - 2362500 \exp(-3\gamma\tau) + 544320 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 (1350000 - 4050000 \exp(-\gamma\tau) + 2700000 \times \exp(-2\gamma\tau) - 108864 \exp(-3\gamma\tau))). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + 6300000 \exp(-2\gamma\tau) - 4725000 \exp(-3\gamma\tau) + 1360800 \times \\
& \times \exp(-4\gamma\tau) + \gamma^3 \tau^3 (450000 - 2700000 \exp(-\gamma\tau) + \\
& + 6300000 \exp(-2\gamma\tau) - 6300000 \exp(-3\gamma\tau) + 2268000 \times \\
& \times \exp(-4\gamma\tau)); \\
& \int \tau^3 P_5^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{108000\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (3888000 - \\
& - 4252500 \exp(-\gamma\tau) + 4480000 \exp(-2\gamma\tau) - 3189375 \times \\
& \times \exp(-3\gamma\tau) + 1306368 \exp(-4\gamma\tau) - 231000 \exp(-5\gamma\tau) + \\
& + \gamma\tau (3888000 - 8505000 \exp(-\gamma\tau) + 13440000 \exp(-2\gamma\tau) - \\
& - 12757500 \exp(-3\gamma\tau) + 6531840 \exp(-4\gamma\tau) - 1386000 \times \\
& \times \exp(-5\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 (1944000 - 8505000 \exp(-\gamma\tau) + \\
& + 2016000 \exp(-2\gamma\tau) - 25515000 \exp(-3\gamma\tau) + 16329600 \times \\
& \times \exp(-4\gamma\tau) - 4158000 \exp(-5\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 (648000 - \\
& - 5670000 \exp(-\gamma\tau) + 2016000 \exp(-2\gamma\tau) - 34020000 \times \\
& \times \exp(-3\gamma\tau) + 27216000 \exp(-4\gamma\tau) - 8316000 \exp(-5\gamma\tau)).
\end{aligned}$$




Рис. 1.104. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[1.105] \quad \int \tau^n P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} \times \\
\times (-1)^s \exp(-(s+1)\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{n! \tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma(s+1))^{j+1}}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
& \int \tau^n P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2n!}{\gamma} \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!}; \\
& \int \tau^n P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
& \times \left(2n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
& \left. - n! \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (2\gamma)^{j+1}} \right); \\
& \int \tau^n P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
& \times \left(3n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
& \left. - 12n! \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (2\gamma)^{j+1}} + \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + 10n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} \Big); \\
& \int \tau^n P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
& \times \left(4n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
& - 30n! \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (2\gamma)^{j+1}} + \\
& + 60n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} - \\
& - 35n! \exp(-3\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (4\gamma)^{j+1}} \Big); \\
& \int \tau^n P_4^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
& \times \left(5n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
& - 60n! \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (2\gamma)^{j+1}} + \\
& + 210n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} - \\
& - 280n! \exp(-3\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (4\gamma)^{j+1}} + \\
& + 126n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} \Big); \\
& \int \tau^n P_5^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
& \times \left(6n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
& - 105n! \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (2\gamma)^{j+1}} + \\
& + 560n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} - \\
& - 1260n! \exp(-3\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (4\gamma)^{j+1}} + \\
& + 1260n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} - \\
& - 462n! \exp(-5\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (6\gamma)^{j+1}} \Big).
\end{aligned}$$

1.3 Аналитические соотношения для неопределенных интегралов от ортогональных функций

63




Рис. 1.105. Вид неопределенного интеграла n -ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 2$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[1.106] \quad \int P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} \times \frac{(-1)^s}{\gamma(2s+3)} \exp(-(2s+3)\gamma\tau).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{3\gamma} \exp(-3\gamma\tau); \\ \int P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{5\gamma} \exp(-3\gamma\tau)(5 - 4 \exp(-2\gamma\tau)); \\ \int P_2^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{7\gamma} \exp(-3\gamma\tau)(14 - 28 \exp(-2\gamma\tau) + 15 \times \exp(-4\gamma\tau)); \\ \int P_3^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{9\gamma} \exp(-3\gamma\tau)(30 - 56 \exp(-2\gamma\tau) + 108 \times \exp(-4\gamma\tau) - 135 \exp(-6\gamma\tau)); \\ \int P_4^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{11\gamma} \exp(-3\gamma\tau)(55 - 308 \exp(-2\gamma\tau) + 660 \exp(-4\gamma\tau) - 616 \exp(-6\gamma\tau) + 210 \exp(-8\gamma\tau)); \\ \int P_5^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{13\gamma} \exp(-3\gamma\tau)(91 - 728 \exp(-2\gamma\tau) + 2340 \exp(-4\gamma\tau) - 3640 \exp(-6\gamma\tau) + 2730 \exp(-8\gamma\tau) - 792 \times \exp(-10\gamma\tau)). \end{aligned}$$




Рис. 1.106. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$[1.107] \quad \int \tau P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} \times (-1)^s \exp(-(2s+3)\gamma\tau) \left(\frac{\tau}{\gamma(2s+3)} + \frac{1}{\gamma^2(2s+3)^2} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{9\gamma^2} \exp(-3\gamma\tau)(3\gamma\tau + 1); \\ \int \tau P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{75\gamma^2} \exp(-3\gamma\tau)(25 - 12 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(75 - 60 \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau P_2^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{735\gamma^2} \exp(-3\gamma\tau)(490 - 588 \times \exp(-2\gamma\tau) + 225 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(1470 - 2940 \exp(-2\gamma\tau) + 1575 \exp(-4\gamma\tau))); \\ \int \tau P_3(2,0)(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{2835\gamma^2} \exp(-3\gamma\tau)(3150 - 6804 \times \exp(-2\gamma\tau) + 6075 \exp(-4\gamma\tau) - 1960 \exp(-6\gamma\tau) + \gamma\tau(9450 - 34020 \exp(-2\gamma\tau) + 42535 \exp(-4\gamma\tau) - 17640 \exp(-6\gamma\tau))); \\ \int \tau P_4^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{38115\gamma^2} \exp(-3\gamma\tau)(63525 - 213444 \times \exp(-2\gamma\tau) + 326700 \exp(-4\gamma\tau) - 237160 \exp(-6\gamma\tau) + 66150 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(190575 - 1067220 \exp(-2\gamma\tau) + 2286900 \exp(-4\gamma\tau) - 2134440 \exp(-6\gamma\tau) + 727650 \exp(-8\gamma\tau))); \\ \int \tau P_5^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{585585\gamma^2} \exp(-3\gamma\tau)(1366365 - 6558552 \exp(-2\gamma\tau) + 15057900 \exp(-4\gamma\tau) - 18218200 \times \exp(-6\gamma\tau) + 11179350 \exp(-8\gamma\tau) - 2744280 \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau(4099095 - 32792760 \exp(-2\gamma\tau) + 105405300 \exp(-4\gamma\tau) + 163963800 \exp(-6\gamma\tau) + 122972850 \exp(-8\gamma\tau) - 35675640 \times \exp(-10\gamma\tau))). \end{aligned}$$




Рис. 1.107. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$[1.108] \quad \int \tau^2 P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} \times (-1)^s \exp(-(2s+3)\gamma\tau) \left(\frac{\tau^2}{\gamma(2s+3)} + \frac{2\tau}{\gamma^2(2s+3)^2} + \frac{2}{\gamma^3(2s+3)^3} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^2 P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{27\gamma^3} \exp(-3\gamma\tau)(9\gamma^2\tau^2 + 6\gamma\tau + 2); \\ \int \tau^2 P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{1125\gamma^3} \exp(-3\gamma\tau)(250 - 72 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(750 - 360 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma^2\tau^2(1125 - 900 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_2^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{77175\gamma^3} \exp(-3\gamma\tau)(34300 - 24696 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 6750 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(102900 - 123480 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 47250 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(154350 - 308700 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 165375 \exp(-4\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_3^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{893025\gamma^3} \exp(-3\gamma\tau)(661500 - \\ &- 857304 \exp(-2\gamma\tau) + 546750 \exp(-4\gamma\tau) - 137200 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ \gamma\tau(1984500 - 4286520 \exp(-2\gamma\tau) + 3827250 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 1234800 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(2976750 - 10716300 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 13395375 \exp(-4\gamma\tau) - 5556600 \exp(-6\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_4^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{132068475\gamma^3} \exp(-3\gamma\tau)(146742750 - \\ &- 29583384 \exp(-2\gamma\tau) + 32343300 \exp(-4\gamma\tau) - 182613200 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau) + 41674500 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(440228250 - \\ &- 1479166920 \exp(-2\gamma\tau) + 2264031000 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 1643518800 \exp(-6\gamma\tau) + 458419500 \exp(-8\gamma\tau)) + \\ &+ \gamma^2\tau^2(660342375 - 3697917300 \exp(-2\gamma\tau) + 7924108500 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 7395834600 \exp(-6\gamma\tau) + 2521307250 \times \\ &\times \exp(-8\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_5^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{26377676325\gamma^3} \exp(-3\gamma\tau) \times \\ &\times (41031940950 - 118171989936 \exp(-2\gamma\tau) + 193795173000 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 182364182000 \exp(-6\gamma\tau) + 91558876500 \times \\ &\times \exp(-8\gamma\tau) - 19017860400 \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau(123095822850 - \\ &- 590859949680 \exp(-2\gamma\tau) + 1356566211000 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 1641277638000 \exp(-6\gamma\tau) + 1007147641500 \exp(-8\gamma\tau) - \\ &- 247232185200 \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(184643734275 - \\ &- 1477149874200 \exp(-2\gamma\tau) + 4747981738500 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 7385749371000 \exp(-6\gamma\tau) + 5539312028250 \exp(-8\gamma\tau) - \\ &- 1607009203800 \exp(-10\gamma\tau))). \end{aligned}$$




Рис. 1.108. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned} [1.109] \quad \int \tau^3 P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} \times \\ &\times (-1)^s \exp(-(2s+3)\gamma\tau) \left(\frac{\tau^3}{\gamma(2s+3)} + \frac{3\tau^2}{\gamma^2(2s+3)^2} + \right. \\ &\left. + \frac{6\tau}{\gamma^3(2s+3)^3} + \frac{6}{\gamma^4(2s+3)^4} \right). \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^3 P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{27\gamma^4} \exp(-3\gamma\tau)(9\gamma^3\tau^3 + 9\gamma^2\tau^2 + 6 \times \\ &\times \gamma\tau + 2); \\ \int \tau^3 P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{5625\gamma^4} \exp(-3\gamma\tau)(1250 - 216 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(3750 - 1080 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma^2\tau^2(5625 - 2700 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(5625 - 4500 \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_2^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{2701125\gamma^4} \exp(-3\gamma\tau)(1200500 - \\ &- 518616 \exp(-2\gamma\tau) + 101250 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(3601500 - \\ &- 2593080 \exp(-2\gamma\tau) + 708750 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(5402250 - \\ &- 6482700 \exp(-2\gamma\tau) + 2480625 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(5402250 - \\ &- 10804500 \exp(-2\gamma\tau) + 5788125 \exp(-4\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_3^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{93767625\gamma^4} \exp(-3\gamma\tau)(69457500 - \\ &- 54010152 \exp(-2\gamma\tau) + 24603750 \exp(-4\gamma\tau) - 4802000 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau) + \gamma\tau(208372500 - 270050760 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 172226250 \exp(-4\gamma\tau) - 43218000 \exp(-6\gamma\tau)) + \\ &+ \gamma^2\tau^2(312558750 - 675126900 \exp(-2\gamma\tau) + 602791875 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 194481000 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(312558750 - \\ &- 1125211500 \exp(-2\gamma\tau) + 1406514375 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 583443000 \exp(-6\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_4^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{152539088625\gamma^4} \exp(-3\gamma\tau) \times \\ &\times (169487876250 - 205012535112 \exp(-2\gamma\tau) + 160099335000 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 70306082000 \exp(-6\gamma\tau) + 13127467500 \times \\ &\times \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(508463628750 - 1025062675560 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 1120695345000 \exp(-4\gamma\tau) - 632754738000 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 144402142500 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(762695443125 - \\ &- 2562656688900 \exp(-2\gamma\tau) + 3922433707500 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 2847396321000 \exp(-6\gamma\tau) + 794211783750 \exp(-8\gamma\tau)) + \\ &+ \gamma^3\tau^3(762695443125 - 4271094481500 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 9152345317500 \exp(-4\gamma\tau) - 8542188963000 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 2912109873750 \exp(-8\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_5^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{396060810019875\gamma^4} \exp(-3\gamma\tau) \times \\ &\times (616094593364250 - 1064611457333424 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 1247071938255000 \exp(-4\gamma\tau) - 912732730910000 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau) + 374933599267500 \exp(-8\gamma\tau) - \\ &- 65896886286000 \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau(1848283780092750 - \\ &- 5323057286667120 \exp(-2\gamma\tau) + 8729503567785000 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 8214594578190000 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 4124269591942500 \exp(-8\gamma\tau) - 856659521718000 \times \\ &\times \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(2772425670139125 - \\ &- 13307643216667800 \exp(-2\gamma\tau) + 30553262487247500 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 36965675601855000 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 22683482755683750 \exp(-8\gamma\tau) - 5568286891167000 \times \\ &\times \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(2772425670139125 - \\ &- 22179405361113000 \exp(-2\gamma\tau) + 71290945803577500 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 110897026805565000 \exp(-6\gamma\tau) + \end{aligned}$$




Рис. 1.109. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$[1.110] \quad \int \tau^n P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+3)\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{n! \tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma(2s+3))^{j+1}}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^n P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2n!}{\gamma} \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{3\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!};$$

$$\int \tau^n P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-3\gamma\tau) \times$$

$$\times \left(3n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} - n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} \right);$$

$$\int \tau^n P_2^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-3\gamma\tau) \times$$

$$\times \left(6n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} - 20n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} + 15n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} \right);$$

$$\int \tau^n P_3^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-3\gamma\tau) \times$$

$$\times \left(10n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} - 60n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} + 105n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} - \right)$$

$$- 56n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (9\gamma)^{j+1}}; \\ \int \tau^n P_4^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-3\gamma\tau) \times \\ \times \left(15n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} - 140n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} + 420n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} - 504n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (9\gamma)^{j+1}} + 210n! \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (11\gamma)^{j+1}} \right); \\ \int \tau^n P_5^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-3\gamma\tau) \times \\ \times \left(21n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} - 280n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} + 1260n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} - 2520n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (9\gamma)^{j+1}} + 2310n! \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (11\gamma)^{j+1}} - 792n! \exp(-10\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (13\gamma)^{j+1}} \right).$$





Рис. 1.110. Вид неопределенного интеграла n-ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$[1.111] \quad \int P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} \times \\ \times \frac{2(-1)^s}{c\gamma(2s+\alpha+1)} \exp(-(2s+\alpha+1)c\gamma\tau/2).$$


Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\int P_0^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c\gamma(\alpha+1)} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2); \\ \int P_1^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c\gamma(\alpha+3)} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) (\alpha+3- \\ - (\alpha+2) \exp(-c\gamma\tau)); \\ \int P_2^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{1}{c\gamma(\alpha+5)} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) (\alpha^2+7\alpha+ \\ + 10-2(\alpha^2+7\alpha+10) \exp(-c\gamma\tau) + (\alpha^2+7\alpha+12) \exp(-2c\gamma\tau)); \\ \int P_3^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{1}{3c\gamma(\alpha+7)} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) (\alpha^3+ \\ + 12\alpha^2+41\alpha+42-(3\alpha^3+39\alpha^2+150\alpha+168) \exp(-c\gamma\tau)+$$

$$+ (3\alpha^3+42\alpha^2+183\alpha+252) \exp(-2c\gamma\tau) - (\alpha^3+15\alpha^2+74\alpha+ \\ + 120) \exp(-3c\gamma\tau)); \\ \int P_4^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{1}{12c\gamma(\alpha+9)} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) (\alpha^4+ \\ + 18\alpha^3+107\alpha^2+258\alpha+216-(4\alpha^4+80\alpha^3+548\alpha^2+ \\ + 1528\alpha+1440) \exp(-c\gamma\tau) + (6\alpha^4+132\alpha^3+1026\alpha^2+ \\ + 3348\alpha+3888) \exp(-2c\gamma\tau) - (4\alpha^4+96\alpha^3+836\alpha^2+3144\alpha+ \\ + 4320) \exp(-3c\gamma\tau) + (\alpha^4+26\alpha^3+251\alpha^2+1066\alpha+1680) \times \\ \times \exp(-4c\gamma\tau)); \\ \int P_5^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{1}{60c\gamma(\alpha+11)} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) (\alpha^5+ \\ + 25\alpha^4+225\alpha^3+935\alpha^2+1814\alpha+1320-(5\alpha^5+140\alpha^4+1455\alpha^3+ \\ + 7060\alpha^2+15940\alpha+13200) \exp(-c\gamma\tau) + (10\alpha^5+310\alpha^4+ \\ + 3650\alpha^3+20450\alpha^2+54540\alpha+55440) \exp(-2c\gamma\tau)- \\ - (10\alpha^5+340\alpha^4+4470\alpha^3+28460\alpha^2+87920\alpha+105600) \times \\ \times \exp(-3c\gamma\tau) + (5\alpha^5+185\alpha^4+2685\alpha^3+19135\alpha^2+67030\alpha+ \\ + 92400) \exp(-4c\gamma\tau) - (\alpha^5+40\alpha^4+635\alpha^3+5000\alpha^2+19524\alpha+ \\ + 30240) \exp(-5c\gamma\tau)).$$



а)



б)

Рис. 1.111. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 2$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (1; 3, 5]$, $\alpha = 1$

$$[1.112] \quad \int \tau P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+\alpha+1)c\gamma\tau/2) \times \\ \times \left(\frac{2\tau}{c\gamma(2s+\alpha+1)} + \frac{4}{c^2\gamma^2(2s+\alpha+1)^2} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau P_0^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c^2\gamma^2(\alpha+1)^2} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times (\gamma\tau(\alpha+1)+2); \\ \int \tau P_1^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c^2\gamma^2(\alpha+1)(\alpha+3)^2} \times \\ \times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) (2(\alpha+3)^2-2(\alpha^2+3\alpha+2) \exp(-c\gamma\tau)+ \\ + \gamma\tau(\alpha^3+7\alpha^2+15\alpha+9-(\alpha^3+6\alpha^2+11\alpha+6) \exp(-c\gamma\tau)));$$

$$\int \tau P_2^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{1}{c^2\gamma^2(\alpha+1)(\alpha+3)(\alpha+5)^2} \times \\ \times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) (2\alpha^4+30\alpha^3+162\alpha^2+370\alpha+300-(4\alpha^4+ \\ + 52\alpha^3+228\alpha^2+380\alpha+200) \exp(-c\gamma\tau) + (2\alpha^4+22\alpha^3+86\alpha^2+ \\ + 138\alpha+72) \exp(-2c\gamma\tau) + \gamma\tau(\alpha^5+16\alpha^4+96\alpha^3+266\alpha^2+335\alpha+ \\ + 150-(\alpha^5+32\alpha^4+192\alpha^3+532\alpha^2+670\alpha+300) \exp(-c\gamma\tau)+ \\ + (\alpha^5+16\alpha^4+98\alpha^3+284\alpha^2+381\alpha+180) \exp(-2c\gamma\tau)); \\ \int \tau P_3(\alpha, 0)(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c^2\gamma^2(\alpha+1)^2(\alpha+3)^2(\alpha+5)^2} \times \\ \times \frac{1}{(\alpha+7)^2} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \left(\binom{\alpha+3}{\alpha} (2\alpha^6+60\alpha^5+734\alpha^4+ \\ + 4680\alpha^3+16382\alpha^2+29820\alpha+22050) - \binom{\alpha+4}{\alpha+1} (6\alpha^6+156\alpha^5+ \\ + 1578\alpha^4+7752\alpha^3+18714\alpha^2+19740\alpha+7350) \exp(-c\gamma\tau)+ \\ + \binom{\alpha+5}{\alpha+2} (6\alpha^6+132\alpha^5+1098\alpha^4+4344\alpha^3+8538\alpha^2+7812\alpha+ \\ + 2646) \exp(-2c\gamma\tau) - \binom{\alpha+6}{\alpha+3} (2\alpha^6+36\alpha^5+254\alpha^4+888\alpha^3+ \\ + 2646) \exp(-3c\gamma\tau) \right);$$

$$\begin{aligned}
 & + 1380\alpha^2 + 1380\alpha + 450) \exp(-3c\gamma\tau) \Big) + \gamma\tau \left(\binom{\alpha+3}{\alpha} (\alpha^7 + 31 \times \right. \\
 & \times \alpha^6 + 397\alpha^5 + 2707\alpha^4 + 10531\alpha^3 + 23101\alpha^2 + 25935\alpha + 22050) - \\
 & - \binom{\alpha+4}{\alpha+1} (3\alpha^7 + 87\alpha^6 + 1023\alpha^5 + 6243\alpha^4 + 20985\alpha^3 + 37941\alpha^2 + \\
 & + 33285\alpha + 11025) \exp(-c\gamma\tau) + \binom{\alpha+5}{\alpha+2} (3\alpha^7 + 81\alpha^6 + 879\alpha^5 + \\
 & + 4917\alpha^4 + 15129\alpha^3 + 25251\alpha^2 + 20853\alpha + 6615) \exp(-2c\gamma\tau) - \\
 & - \binom{\alpha+6}{\alpha+3} (\alpha^7 + 25\alpha^6 + 253\alpha^5 + 1333\alpha^4 + 3907\alpha^3 + 6283\alpha^2 + \\
 & + 5055\alpha + 1575) \exp(-3c\gamma\tau) \Big); \\
 & \int \tau P_4^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{c^2\gamma^2(\alpha+1)^2(\alpha+3)^2(\alpha+5)^2} \times \\
 & \times \frac{1}{(\alpha+7)^2(\alpha+9)^2} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \left(\binom{\alpha+4}{\alpha} (2\alpha^8 + 96\alpha^7 + \right. \\
 & + 1976\alpha^6 + 22752\alpha^5 + 160076\alpha^4 + 703776\alpha^3 + 1885752\alpha^2 + \\
 & + 2812320\alpha + 1786050) - \binom{\alpha+5}{\alpha+1} (8\alpha^8 + 352\alpha^7 + 6496\alpha^6 + \\
 & + 65056\alpha^5 + 381424\alpha^4 + 1312672\alpha^3 + 2504672\alpha^2 + 2308320\alpha + \\
 & + 793800) \exp(-c\gamma\tau) + \binom{\alpha+6}{\alpha+2} (12\alpha^8 + 480\alpha^7 + 7920\alpha^6 + \\
 & + 69600\alpha^5 + 351336\alpha^4 + 1026720\alpha^3 + 1669680\alpha^2 + 1360800\alpha + \\
 & + 428652) \exp(-2c\gamma\tau) - \binom{\alpha+7}{\alpha+3} (8\alpha^8 + 288\alpha^7 + 4256\alpha^6 + \\
 & + 33504\alpha^5 + 152624\alpha^4 + 408288\alpha^3 + 618912\alpha^2 + 479520\alpha + \\
 & + 145800) \exp(-3c\gamma\tau) + \binom{\alpha+8}{\alpha+4} (2\alpha^8 + 64\alpha^7 + 856\alpha^6 + 6208\alpha^5 + \\
 & + 26476\alpha^4 + 67264\alpha^3 + 98072\alpha^2 + 73920\alpha + 22050) \times \\
 & \times \exp(-4c\gamma\tau) \Big) + \gamma\tau \left(\binom{\alpha+4}{\alpha} (\alpha^9 + 49\alpha^8 + 1036\alpha^7 + 12364\alpha^6 + \right. \\
 & + 91414\alpha^5 + 431926\alpha^4 + 1294764\alpha^3 + 2349036\alpha^2 + 2299185\alpha + \\
 & + 893025) - \binom{\alpha+5}{\alpha+1} (4\alpha^9 + 188\alpha^8 + 3776\alpha^7 + 42272\alpha^6 + 288296 \times \\
 & \times \alpha^5 + 1228472\alpha^4 + 3221344\alpha^3 + 4911168\alpha^2 + 23859380\alpha + \\
 & + 1190700) \exp(-c\gamma\tau) + \binom{\alpha+6}{\alpha+2} (6\alpha^9 + 270\alpha^8 + 5160\alpha^7 + \\
 & + 54600\alpha^6 + 349668\alpha^5 + 1391700\alpha^4 + 3401640\alpha^3 + 4854600\alpha^2 + \\
 & + 3616326\alpha + 1071630) \exp(-2c\gamma\tau) - \binom{\alpha+7}{\alpha+3} (4\alpha^9 + 172\alpha^8 + \\
 & + 3136\alpha^7 + 31648\alpha^6 + 193576\alpha^5 + 738328\alpha^4 + 1738464\alpha^3 + \\
 & + 2405952\alpha^2 + 1751220\alpha + 510300) \exp(-3c\gamma\tau) + \binom{\alpha+8}{\alpha+4} (\alpha^9 + \\
 & + 41\alpha^8 + 716\alpha^7 + 6956\alpha^6 + 41174\alpha^5 + 152774\alpha^4 + 351724\alpha^3 + \\
 & + 478284\alpha^2 + 343665\alpha + 99225) \exp(-4c\gamma\tau) \Big); \\
 & \int \tau P_5^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{c^2\gamma^2(\alpha+1)^2(\alpha+3)^2(\alpha+5)^2} \times
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \times \frac{1}{(\alpha+7)^2(\alpha+9)^2(\alpha+11)^2} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \left(\binom{\alpha+5}{\alpha} \times \right. \\
 & \times (2\alpha^{10} + 140\alpha^9 + 4330\alpha^8 + 77840\alpha^7 + 6978440\alpha^6 + 6978440\alpha^5 + \\
 & + 36738020\alpha^4 + 129455760\alpha^3 + 291833082\alpha^2 + 379583820\alpha + \\
 & + 216112050) - \binom{\alpha+6}{\alpha+1} (10\alpha^{10} + 660\alpha^9 + 19010\alpha^8 + 313200\alpha^7 + \\
 & + 3248340\alpha^6 + 21969720\alpha^5 + 96919700\alpha^4 + 270305520\alpha^3 + \\
 & + 443302690\alpha^2 + 370962900\alpha + 120062250) \exp(-c\gamma\tau) + \\
 & + \binom{\alpha+7}{\alpha+2} (20\alpha^{10} + 1240\alpha^9 + 33220\alpha^8 + 503200\alpha^7 + \\
 & + 4734760\alpha^6 + 28629520\alpha^5 + 111281960\alpha^4 + 270544800\alpha^3 + \\
 & + 387329220\alpha^2 + 290145240\alpha + 86444820) \exp(-2c\gamma\tau) - \\
 & - \binom{\alpha+8}{\alpha+3} (20\alpha^{10} + 1160\alpha^9 + 28900\alpha^8 + 51852240\alpha^7 + \\
 & + 3511720\alpha^6 + 19550000\alpha^5 + 70171880\alpha^4 + 158746080\alpha^3 + \\
 & + 213958980\alpha^2 + 153073800\alpha + 44104500) \exp(-3c\gamma\tau) + \\
 & + \binom{\alpha+9}{\alpha+4} (10\alpha^{10} + 540\alpha^9 + 12530\alpha^8 + 163920\alpha^7 + 1333140\alpha^6 + \\
 & + 7004520\alpha^5 + 23907380\alpha^4 + 51852240\alpha^3 + 67575010\alpha^2 + \\
 & + 47147100\alpha + 13340250) \exp(-4c\gamma\tau) - \binom{\alpha+10}{\alpha+5} (2\alpha^{10} + 100 \times \\
 & \times \alpha^9 + 2170\alpha^8 + 26800\alpha^7 + 207556\alpha^6 + 1046680\alpha^5 + 3453380\alpha^4 + \\
 & + 7287600\alpha^3 + 9296442\alpha^2 + 6384420\alpha + 1786050) \times \\
 & \times \exp(-5c\gamma\tau) \Big) + \gamma\tau \left(\binom{\alpha+5}{\alpha} (\alpha^{11} + 71\alpha^{10} + 2235\alpha^9 + 488778 \times \right. \\
 & \times \alpha^8 + 488778\alpha^7 + 3939078\alpha^6 + 83096890\alpha^5 + 83096890\alpha^4 + \\
 & + 210644421\alpha^3 + 335708451\alpha^2 + 297847935\alpha + 108056025) - \\
 & - \binom{\alpha+6}{\alpha+1} (5\alpha^{11} + 345\alpha^{10} + 10495\alpha^9 + 185115\alpha^8 + 2093970\alpha^7 + \\
 & + 15857370\alpha^6 + 81414430\alpha^5 + 280532310\alpha^4 + 627109625\alpha^3 + \\
 & + 850435485\alpha^2 + 616475475\alpha + 180093375) \exp(-c\gamma\tau) + \\
 & + \binom{\alpha+7}{\alpha+2} (10\alpha^{11} + 670\alpha^{10} + 19710\alpha^9 + 334650\alpha^8 + 3625380\alpha^7 + \\
 & + 26151660\alpha^6 + 127214780\alpha^5 + 413477300\alpha^4 + 870026610\alpha^3 + \\
 & + 1113395670\alpha^2 + 768585510\alpha + 216112050) \exp(-2c\gamma\tau) - \\
 & - \binom{\alpha+8}{\alpha+3} (5\alpha^{11} + 650\alpha^{10} + 18510\alpha^9 + 303630\alpha^8 + 3173220\alpha^7 + \\
 & + 22066020\alpha^6 + 103510940\alpha^5 + 324974620\alpha^4 + 662590770\alpha^3 + \\
 & + 825393330\alpha^2 + 557810550\alpha + 154365750) \exp(-3c\gamma\tau) + \\
 & + \binom{\alpha+9}{\alpha+4} (5\alpha^{11} + 315\alpha^{10} + 8695\alpha^9 + 138345\alpha^8 + 1404210\alpha^7 + \\
 & + 9501390\alpha^6 + 43474030\alpha^5 + 133509330\alpha^4 + 267122585\alpha^3 + \\
 & + 327661095\alpha^2 + 218832075\alpha + 60031125) \exp(-4c\gamma\tau) - \\
 & - \binom{\alpha+10}{\alpha+5} (\alpha^{11} + 61\alpha^{10} + 1635\alpha^9 + 25335\alpha^8 + 251178\alpha^7 + \\
 & + 1664898\alpha^6 + 7483430\alpha^5 + 22637390\alpha^4 + 44730021\alpha^3 + \\
 & + 54322641\alpha^2 + 36007335\alpha + 9823275) \exp(-5c\gamma\tau) \Big).
 \end{aligned}$$




Рис. 1.112. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 2$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [0, 1]$, $\alpha = 1$

$$[1.113] \quad \int \tau^2 P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+\alpha+1)c\gamma\tau/2) \left(\frac{2\tau^2}{c\gamma(2s+\alpha+1)} + \frac{8\tau}{c^2\gamma^2(2s+\alpha+1)^2} + \frac{16}{c^3\gamma^3(2s+\alpha+1)^3} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^2 P_0^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{c^3\gamma^3(\alpha+1)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) (8+ \\ &+ 4c\gamma\tau(\alpha+1) + c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2); \\ \int \tau^2 P_1^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{c^3\gamma^3(\alpha+1)^2} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) (8+ \\ &+ 4c\gamma\tau(\alpha+1) + c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2) + \frac{2}{c^3\gamma^3(\alpha+3)^3} \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+3)/2)(\alpha+2)(8+4c\gamma\tau(\alpha+3)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+3)^2); \\ \int \tau^2 P_2^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{c^3\gamma^3(\alpha+1)^2} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ &\times (\alpha+2)(8+4c\gamma\tau(\alpha+1)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2) + \frac{2}{c^3\gamma^3(\alpha+3)^3} \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+3)/2)(\alpha+2)(8+4c\gamma\tau(\alpha+3)+c^2\gamma^2\tau^2 \times \\ &\times (\alpha+3)^2) - \frac{1}{c^3\gamma^3(\alpha+5)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+5)/2)(\alpha^2+7\alpha+12) \times \\ &\times (8+4c\gamma\tau(\alpha+5)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+5)^2); \\ \int \tau^2 P_3^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{c^3\gamma^3(\alpha+1)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ &\times \binom{\alpha+3}{\alpha} (8+4c\gamma\tau(\alpha+1)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2) + \frac{6}{c^3\gamma^3(\alpha+3)^3} \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+3)/2)(\alpha+4)(8+4c\gamma\tau(\alpha+3)+c^2\gamma^2\tau^2 \times \\ &\times (\alpha+3)^2) - \frac{6}{c^3\gamma^3(\alpha+5)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+5)/2)(\alpha+5) \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\times (8+4c\gamma\tau(\alpha+5)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+5)^2) + \frac{2}{c^3\gamma^3(\alpha+7)^3} \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+7)/2) \binom{\alpha+6}{\alpha+3} (8+4c\gamma\tau(\alpha+7)+c^2\gamma^2\tau^2 \times \\ &\times (\alpha+7)^2); \\ \int \tau^2 P_4^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{c^3\gamma^3(\alpha+1)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ &\times \binom{\alpha+4}{\alpha} (8+4c\gamma\tau(\alpha+1)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2) + \frac{8}{c^3\gamma^3(\alpha+3)^3} \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+3)/2) \binom{\alpha+5}{\alpha+1} (8+4c\gamma\tau(\alpha+3)+c^2\gamma^2\tau^2 \times \\ &\times (\alpha+3)^2) - \frac{12}{c^3\gamma^3(\alpha+5)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+5)/2) \binom{\alpha+6}{\alpha+2} \times \\ &\times (8+4c\gamma\tau(\alpha+5)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+5)^2) + \frac{8}{c^3\gamma^3(\alpha+7)^3} \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+7)/2) \binom{\alpha+7}{\alpha+3} (8+4c\gamma\tau(\alpha+7)+c^2\gamma^2\tau^2 \times \\ &\times (\alpha+7)^2) - \frac{2}{c^3\gamma^3(\alpha+9)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+9)/2) \binom{\alpha+8}{\alpha+4} \times \\ &\times (8+4c\gamma\tau(\alpha+9)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+9)^2); \\ \int \tau^2 P_5^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{c^3\gamma^3(\alpha+1)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ &\times \binom{\alpha+5}{\alpha} (8+4c\gamma\tau(\alpha+1)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2) + \frac{10}{c^3\gamma^3(\alpha+3)^3} \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+3)/2) \binom{\alpha+6}{\alpha+1} (8+4c\gamma\tau(\alpha+3)+c^2\gamma^2\tau^2 \times \\ &\times (\alpha+3)^2) - \frac{20}{c^3\gamma^3(\alpha+5)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+5)/2) \binom{\alpha+7}{\alpha+2} \times \\ &\times (8+4c\gamma\tau(\alpha+5)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+5)^2) + \frac{20}{c^3\gamma^3(\alpha+7)^3} \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+7)/2) \binom{\alpha+8}{\alpha+3} (8+4c\gamma\tau(\alpha+7)+c^2\gamma^2\tau^2 \times \\ &\times (\alpha+7)^2) - \frac{10}{c^3\gamma^3(\alpha+9)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+9)/2) \binom{\alpha+9}{\alpha+4} \times \\ &\times (8+4c\gamma\tau(\alpha+9)+c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+9)^2) + \frac{2}{c^3\gamma^3(\alpha+11)^3} \times \\ &\times \exp(-c\gamma\tau(\alpha+11)/2) \binom{\alpha+10}{\alpha+5} (8+4c\gamma\tau(\alpha+11)+c^2\gamma^2\tau^2 \times \\ &\times (\alpha+11)^2). \end{aligned}$$




Рис. 1.113. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 2$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (1; 3, 5]$, $\alpha = 1$

$$[1.114] \quad \int \tau^3 P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+\alpha+1)c\gamma\tau/2) \times \\ \times \left(\frac{2\tau^3}{c\gamma(2s+\alpha+1)} + \frac{12\tau^2}{c^2\gamma^2(2s+\alpha+1)^2} + \right. \\ \left. + \frac{48\tau}{c^3\gamma^3(2s+\alpha+1)^3} + \frac{96}{c^4\gamma^4(2s+\alpha+1)^4} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^3 P_0^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+1)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+1) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+1)^3); \\ \int \tau^3 P_1^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+1)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+1) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+1)^3) + \\ + \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+3)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+3)/2) (\alpha+2) (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+3) + \\ + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+3)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+3)^3); \\ \int \tau^3 P_2^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+1)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times \binom{\alpha+2}{\alpha} (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+1) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2 + c^3\gamma^3\tau^3 \times \\ \times (\alpha+1)^3) + \frac{4}{c^4\gamma^4(\alpha+3)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+3)/2) \binom{\alpha+3}{\alpha+1} \times \\ \times (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+3) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+3)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+3)^3) - \\ - \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+5)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+5)/2) \binom{\alpha+4}{\alpha+2} (48 + 24c\gamma\tau \times \\ \times (\alpha+5) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+5)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+5)^3); \\ \int \tau^3 P_3^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+1)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times \binom{\alpha+3}{\alpha} (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+1) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2 + c^3\gamma^3\tau^3 \times \\ \times (\alpha+1)^3) + \frac{6}{c^4\gamma^4(\alpha+3)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+3)/2) \binom{\alpha+4}{\alpha+1} \times \\ \times (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+3) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+3)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+3)^3) -$$

$$- \frac{6}{c^4\gamma^4(\alpha+5)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+5)/2) \binom{\alpha+5}{\alpha+2} (48 + 24c\gamma\tau \times \\ \times (\alpha+5) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+5)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+5)^3) + \\ + \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+7)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+7)/2) \binom{\alpha+6}{\alpha+3} (48 + 24c\gamma\tau \times \\ \times (\alpha+7) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+7)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+7)^3); \\ \int \tau^3 P_4^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+1)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times \binom{\alpha+4}{\alpha} (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+1) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2 + c^3\gamma^3\tau^3 \times \\ \times (\alpha+1)^3) + \frac{8}{c^4\gamma^4(\alpha+3)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+3)/2) \binom{\alpha+5}{\alpha+1} \times \\ \times (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+3) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+3)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+3)^3) - \\ - \frac{12}{c^4\gamma^4(\alpha+5)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+5)/2) \binom{\alpha+6}{\alpha+2} (48 + 24c\gamma\tau \times \\ \times (\alpha+5) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+5)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+5)^3) + \\ + \frac{8}{c^4\gamma^4(\alpha+7)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+7)/2) \binom{\alpha+7}{\alpha+3} (48 + 24c\gamma\tau \times \\ \times (\alpha+7) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+7)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+7)^3) - \\ - \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+9)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+9)/2) \binom{\alpha+8}{\alpha+4} (48 + 24c\gamma\tau \times \\ \times (\alpha+9) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+9)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+9)^3); \\ \int \tau^3 P_5^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+1)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times \binom{\alpha+5}{\alpha} (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+1) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+1)^2 + c^3\gamma^3\tau^3 \times \\ \times (\alpha+1)^3) + \frac{10}{c^4\gamma^4(\alpha+3)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+3)/2) \binom{\alpha+6}{\alpha+1} \times \\ \times (48 + 24c\gamma\tau(\alpha+3) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+3)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+3)^3) - \\ - \frac{20}{c^3\gamma^3(\alpha+5)^3} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+5)/2) \binom{\alpha+7}{\alpha+2} (48 + 24c\gamma\tau \times \\ \times (\alpha+5) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+5)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+5)^3) + \\ + \frac{20}{c^4\gamma^4(\alpha+7)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+7)/2) \binom{\alpha+8}{\alpha+3} (48 + 24c\gamma\tau \times \\ \times (\alpha+7) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+7)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+7)^3) - \\ - \frac{10}{c^4\gamma^4(\alpha+9)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+9)/2) \binom{\alpha+9}{\alpha+4} (48 + 24c\gamma\tau \times \\ \times (\alpha+9) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+9)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+9)^3) + \\ + \frac{2}{c^4\gamma^4(\alpha+11)^4} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+11)/2) \binom{\alpha+10}{\alpha+5} (48 + 24c\gamma\tau \times \\ \times (\alpha+11) + 6c^2\gamma^2\tau^2(\alpha+11)^2 + c^3\gamma^3\tau^3(\alpha+11)^3).$$




Рис. 1.114. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 2$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (1; 3, 5]$, $\alpha = 1$

$$[1.115] \quad \int \tau^n P_k^{(\alpha, 0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+\alpha+1)c\gamma\tau/2) \times \\ \times \sum_{j=0}^n \frac{n! \tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(2s+\alpha+1)/2)^{j+1}}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^n P_0^{(\alpha, 0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2n!}{\gamma} \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{c\gamma(\alpha+1)/2} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!}; \\ \int \tau^n P_1^{(\alpha, 0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times \left((\alpha+1)! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+1)/2)^{j+1}} - \right. \\ \left. - (\alpha+2)n! \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+3)/2)^{j+1}} \right); \\ \int \tau^n P_2^{(\alpha, 0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times \left((\alpha+2)! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+1)/2)^{j+1}} - \right. \\ \left. - 2(\alpha+3)n! \exp(-c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+3)/2)^{j+1}} + \right. \\ \left. + (\alpha+4)n! \exp(-2c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+5)/2)^{j+1}} \right); \\ \int \tau^n P_3^{(\alpha, 0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times$$

$$\left. \times \left((\alpha+3)n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+1)/2)^{j+1}} - \right. \right. \\ \left. - 3(\alpha+4)n! \exp(-c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+3)/2)^{j+1}} + \right. \\ \left. + 3(\alpha+5)n! \exp(-2c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+5)/2)^{j+1}} - \right. \\ \left. - (\alpha+6)n! \exp(-3c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (9c\gamma(\alpha+7)/2)^{j+1}} \right); \\ \int \tau^n P_4^{(\alpha, 0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times \left((\alpha+4)n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+1)/2)^{j+1}} - \right. \\ \left. - 4(\alpha+5)n! \exp(-c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+3)/2)^{j+1}} + \right. \\ \left. + 6(\alpha+6)n! \exp(-2c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+5)/2)^{j+1}} - \right. \\ \left. - 4(\alpha+7)n! \exp(-3c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+7)/2)^{j+1}} + \right. \\ \left. + (\alpha+8)n! \exp(-4c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+9)/2)^{j+1}} \right); \\ \int \tau^n P_5^{(\alpha, 0)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-c\gamma\tau(\alpha+1)/2) \times \\ \times \left((\alpha+5)n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+1)/2)^{j+1}} - \right. \\ \left. - 5(\alpha+6)n! \exp(-c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+3)/2)^{j+1}} + \right. \\ \left. + 10(\alpha+7)n! \exp(-2c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(\alpha+5)/2)^{j+1}} - \right.$$




Рис. 1.115. Вид неопределенного интеграла n -ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $n = 0..5, \gamma = 2, \alpha \in [0; 5]$; б) $n = 0..5, \gamma \in (1; 3, 5], \alpha = 1$

$$\begin{aligned}
 [1.116] \quad \int P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = & - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} \times \\
 & \times \frac{(-1)^s}{\gamma(2s+1)} \exp(-(2s+1)\gamma\tau).
 \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\int P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma} \exp(-\gamma\tau);$$

$$\int P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma} \exp(-\gamma\tau)(1 - \exp(-2\gamma\tau));$$

$$\int P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{3\gamma} \exp(-\gamma\tau)(3 - 8 \exp(-2\gamma\tau) + 6 \times \exp(-4\gamma\tau));$$

$$\int P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma} \exp(-\gamma\tau)(1 - 5 \exp(-2\gamma\tau) + 9 \times \exp(-4\gamma\tau) - 5 \exp(-6\gamma\tau));$$

$$\int P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{5\gamma} \exp(-\gamma\tau)(5 - 40 \exp(-2\gamma\tau) + 126 \times \exp(-4\gamma\tau) - 160 \exp(-6\gamma\tau) + 70 \exp(-8\gamma\tau));$$

$$\int P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{3\gamma} \exp(-\gamma\tau)(3 - 35 \exp(-2\gamma\tau) + 168 \times \exp(-4\gamma\tau) - 360 \exp(-6\gamma\tau) + 350 \exp(-8\gamma\tau) - 126 \times \exp(-10\gamma\tau)).$$




Рис. 1.116. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2, c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$

$$\begin{aligned}
 [1.117] \quad \int \tau P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = & - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} \times \\
 & \times (-1)^s \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau}{\gamma(2s+1)} + \frac{1}{\gamma^2(2s+1)^2} \right).
 \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(\gamma\tau + 1);$$

$$\int \tau P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{3\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(3 - \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau \times (3 - 3 \exp(-2\gamma\tau)));$$

$$\begin{aligned} \int \tau P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{45\gamma^2} \exp(-\gamma\tau) (45 - 40 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 18 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau (45 - 120 \exp(-2\gamma\tau) + 90 \exp(-4\gamma\tau))); \\ \int \tau P_3(0,1)(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{105\gamma^2} \exp(-\gamma\tau) (105 - 175 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 189 \exp(-4\gamma\tau) - 75 \exp(-6\gamma\tau) + \gamma\tau \times \\ &\times (105 - 525 \exp(-2\gamma\tau) + 945 \exp(-4\gamma\tau) - 525 \exp(-6\gamma\tau))); \\ \int \tau P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{1575\gamma^2} \exp(-\gamma\tau) (1575 - 4200 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 7938 \exp(-4\gamma\tau) - 7200 \exp(-6\gamma\tau) + 2450 \times \\ &\times \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau (1575 - 12600 \exp(-2\gamma\tau) + 39690 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 50400 \exp(-6\gamma\tau) + 22050 \exp(-8\gamma\tau))); \\ \int \tau P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{10395\gamma^2} \exp(-\gamma\tau) (10395 - 40425 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 116424 \exp(-4\gamma\tau) - 178200 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 134750 \exp(-8\gamma\tau) - 39690 \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau (10395 - 121275 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 582120 \exp(-4\gamma\tau) - 1247400 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 1212750 \exp(-8\gamma\tau) - 436590 \exp(-10\gamma\tau))). \end{aligned}$$




Рис. 1.117. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$\begin{aligned} [1.118] \quad \int \tau^2 P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} \times \\ &\times (-1)^s \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau^2}{\gamma(2s+1)} + \right. \\ &\left. + \frac{2\tau}{\gamma^2(2s+1)^2} + \frac{2}{\gamma^3(2s+1)^3} \right). \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^2 P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (\gamma^2\tau^2 + 2\gamma\tau + 2); \\ \int \tau^2 P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{9\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (18 - 2 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ \gamma\tau (18 - 6 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma^2\tau^2 (9 - 9 \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{675\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (1350 - 400 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 108 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau (1350 - 1200 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 540 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 (675 - 1800 \exp(-2\gamma\tau) + 1350 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{11025\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (22050 - 12250 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 7938 \exp(-4\gamma\tau) - 2250 \exp(-6\gamma\tau) + \gamma\tau \times \\ &\times (22050 - 36750 \exp(-2\gamma\tau) + 39690 \exp(-4\gamma\tau) - 15750 \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\times \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 (11025 - 55125 \exp(-2\gamma\tau) + 99225 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 55125 \exp(-6\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{496125\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (992250 - \\ &- 882000 \exp(-2\gamma\tau) + 1000188 \exp(-4\gamma\tau) - 648000 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau) + 171500 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau (992250 - 2646000 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 5000940 \exp(-4\gamma\tau) - 4536000 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 1543500 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 (496125 - 3969000 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 12502350 \exp(-4\gamma\tau) - 15876000 \exp(-6\gamma\tau) + 6945750 \times \\ &\times \exp(-8\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{36018675\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (72037350 - \\ &- 93381750 \exp(-2\gamma\tau) + 161363664 \exp(-4\gamma\tau) - 176418000 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau) + 103757500 \exp(-8\gamma\tau) - 25004700 \exp(-10\gamma\tau) + \\ &+ \gamma\tau (72037350 - 280145250 \exp(-2\gamma\tau) + 806818320 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 1234926000 \exp(-6\gamma\tau) + 933817500 \times \\ &\times \exp(-8\gamma\tau) - 275051700 \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 \times \\ &\times (36018675 - 420217875 \exp(-2\gamma\tau) + 2017045800 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 432241000 \exp(-6\gamma\tau) + 4202178750 \exp(-8\gamma\tau) - \\ &- 1512784350 \exp(-10\gamma\tau))). \end{aligned}$$




Рис. 1.118. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$\begin{aligned} [1.119] \quad \int \tau^3 P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} \times \\ &\times (-1)^s \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau^3}{\gamma(2s+1)} + \frac{3\tau^2}{\gamma^2(2s+1)^2} + \right. \\ &\left. + \frac{6\tau}{\gamma^3(2s+1)^3} + \frac{6}{\gamma^4(2s+1)^4} \right). \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^3 P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (\gamma^3\tau^3 + 3\gamma^2\tau^2 + 6\gamma\tau + 6); \\ \int \tau^3 P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{9\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (54 - 2 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ \gamma\tau (54 - 6 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma^2\tau^2 (27 - 9 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3 \times \\ &\times (9 - 9 \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{3375\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (20250 - 2000 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 324 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau (20250 - 6000 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 1620 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2 (10125 - 9000 \exp(-2\gamma\tau) + 4050 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3 (3375 - 9000 \exp(-2\gamma\tau) + 6750 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{385875\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (2315250 - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -428750 \exp(-2\gamma\tau) + 166698 \exp(-4\gamma\tau) - 33750 \exp(-6\gamma\tau) + \\
 & + \gamma\tau(2315250 - 1286250 \exp(-2\gamma\tau) + 833490 \exp(-4\gamma\tau) - \\
 & - 236250 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(1157625 - 1929375 \exp(-2\gamma\tau) + \\
 & + 2083725 \exp(-4\gamma\tau) - 826875 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3 \times \\
 & \times (385875 - 1929375 \exp(-2\gamma\tau) + 3472875 \exp(-4\gamma\tau) - \\
 & - 1929375 \exp(-6\gamma\tau)); \\
 & \int \tau^3 P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{52093125\gamma^4} \exp(-\gamma\tau)(312558750 - \\
 & - 92610000 \exp(-2\gamma\tau) + 63011844 \exp(-4\gamma\tau) - 29160000 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau) + 6002500 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(312558750 - \\
 & - 277830000 \exp(-2\gamma\tau) + 315059220 \exp(-4\gamma\tau) - 204120000 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau) + 54022500 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(156279375 - \\
 & - 416745000 \exp(-2\gamma\tau) + 787648050 \exp(-4\gamma\tau) - 714420000 \times \\
 & \times \exp(-6\gamma\tau) + 243101250 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(52093125 - \\
 & - 787648050 \exp(-2\gamma\tau) + 1312746750 \exp(-4\gamma\tau) - \\
 & - 1666980000 \exp(-6\gamma\tau) + 729303750 \exp(-8\gamma\tau)); \\
 & \int \tau^3 P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{41601569625\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) \times \\
 & \times (249609417750 - 107855921250 \exp(-2\gamma\tau) + 111825019152 \times \\
 & \times \exp(-4\gamma\tau) - 87326910000 \exp(-6\gamma\tau) + 39946637500 \times \\
 & \times \exp(-8\gamma\tau) - 7876480500 \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau(249609417750 - \\
 & - 323567763750 \exp(-2\gamma\tau) + 559125095760 \exp(-4\gamma\tau) - \\
 & - 611288370000 \exp(-6\gamma\tau) + 359519737500 \exp(-8\gamma\tau) - \\
 & - 86641285500 \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^2\tau^2(124804708875 - \\
 & - 485351645625 \exp(-2\gamma\tau) + 1397812739400 \exp(-4\gamma\tau) - \\
 & - 2139509295000 \exp(-6\gamma\tau) + 1617838818750 \exp(-8\gamma\tau) - \\
 & - 476527070250 \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^3\tau^3(41601569625 - \\
 & - 485351645625 \exp(-2\gamma\tau) + 2329687899000 \exp(-4\gamma\tau) - \\
 & - 4992188355000 \exp(-6\gamma\tau) + 4853516456250 \exp(-8\gamma\tau) - \\
 & - 1747265924250 \exp(-10\gamma\tau)). \\
 & \int \tau^3 P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau
 \end{aligned}$$




Рис. 1.119. Вид неопределенного интеграла 3-го рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$[1.120] \quad \int \tau^n P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} \times \\
 \times (-1)^s \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{n! \tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma(2s+1))^{j+1}}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^n P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2n!}{\gamma} \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma}\right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!};$$

$$\int \tau^n P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times$$

$$\begin{aligned}
 & \times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
 & \left. - 3n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} \right); \\
 & \int \tau^n P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
 & \times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
 & \left. - 8n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} + \right. \\
 & \left. + 10n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} \right); \\
 & \int \tau^n P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
 & \times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
 & \left. - 15n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} + \right. \\
 & \left. + 45n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} - \right. \\
 & \left. - 35n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} \right); \\
 & \int \tau^n P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
 & \times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} - \right. \\
 & \left. - 24n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} + \right. \\
 & \left. + 126n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} - \right. \\
 & \left. - 224n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (9\gamma)^{j+1}} + \right. \\
 & \left. + 126n! \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (11\gamma)^{j+1}} \right); \\
 & \int \tau^n P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = -\exp(-\gamma\tau) \times \\
 & \times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - \right. \\
 & \left. - 35n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} + \right. \\
 & \left. + 280n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} - \right. \\
 & \left. - 840n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} + \right.
 \end{aligned}$$




Рис. 1.120. Вид неопределенного интеграла n-ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$




Рис. 1.121. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$

$$[1.121] \quad \int P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} \times \\ \times \frac{(-1)^s}{\gamma(2s+1)} \exp(-(2s+1)\gamma\tau).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\int P_0^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma} \exp(-\gamma\tau);$$

$$\int P_1^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{3\gamma} \exp(-\gamma\tau)(3 - 4 \exp(-2\gamma\tau));$$

$$\int P_2^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{3\gamma} \exp(-\gamma\tau)(3 - 10 \exp(-2\gamma\tau) + 9 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau));$$

$$\int P_3^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{5\gamma} \exp(-\gamma\tau)(5 - 30 \exp(-2\gamma\tau) + 63 \times \\ \times \exp(-4\gamma\tau) - 40 \exp(-6\gamma\tau));$$

$$\int P_4^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{15\gamma} \exp(-\gamma\tau)(15 - 140 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 504 \exp(-4\gamma\tau) - 720 \exp(-6\gamma\tau) + 350 \exp(-8\gamma\tau));$$

$$\int P_5^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{21\gamma} \exp(-\gamma\tau)(21 - 280 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 1512 \exp(-4\gamma\tau) - 3600 \exp(-6\gamma\tau) + 3850 \exp(-8\gamma\tau) - \\ - 1512 \exp(-10\gamma\tau)).$$

$$[1.122] \quad \int \tau P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau}{\gamma(2s+1)} + \frac{1}{\gamma^2(2s+1)^2} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau P_0^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(\gamma\tau + 1);$$

$$\int \tau P_1^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{9\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(9 - 4 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma\tau(9 - \\ - 12 \exp(-2\gamma\tau)));$$

$$\int \tau P_2^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{45\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(45 - 50 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 27 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau(45 - 150 \exp(-2\gamma\tau) + 135 \exp(-4\gamma\tau)));$$

$$\int \tau P_3^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{175\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(175 - 350 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 441 \exp(-4\gamma\tau) - 200 \exp(-6\gamma\tau) + \gamma\tau(175 - \\ - 1050 \exp(-2\gamma\tau) + 2205 \exp(-4\gamma\tau) - 1400 \exp(-6\gamma\tau)));$$

$$\int \tau P_4^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{4725\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(4725 - 14700 \times \\ \times \exp(-2\gamma\tau) + 31752 \exp(-4\gamma\tau) - 32400 \exp(-6\gamma\tau) + \\ + 12250 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau(4725 - 44100 \exp(-2\gamma\tau) + \\ + 158760 \exp(-4\gamma\tau) - 226800 \exp(-6\gamma\tau) + 110250 \exp(-8\gamma\tau)));$$

$$\int \tau P_5^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{72765\gamma^2} \exp(-\gamma\tau)(72765 - \\ - 323400 \exp(-2\gamma\tau) + 1047816 \exp(-4\gamma\tau) - 1782000 \times \\ \times \exp(-6\gamma\tau) + 1482250 \exp(-8\gamma\tau) - 476280 \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau \times \\ \times (72765 - 970200 \exp(-2\gamma\tau) + 5239080 \exp(-4\gamma\tau) - 12474000 \times \\ \times \exp(-6\gamma\tau) + 13340250 \exp(-8\gamma\tau) - 5239080 \exp(-10\gamma\tau))).$$




Рис. 1.122. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$




Рис. 1.123. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$

$$[1.123] \quad \int \tau^2 P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau^2}{\gamma(2s+1)} + \frac{2\tau}{\gamma^2(2s+1)^2} + \frac{2}{\gamma^3(2s+1)^3} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^2 P_0^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (\gamma^2 \tau^2 + 2\gamma\tau + 2); \\ \int \tau^2 P_1^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{27\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (54 - 8 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ \gamma\tau (54 - 24 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma^2 \tau^2 (27 - 36 \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau^2 P_2^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{675\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (1350 - 500 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 162 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau (1350 - 1500 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 810 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 (675 - 2250 \exp(-2\gamma\tau) + 2025 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_3^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{18375\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (36750 - 24500 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 18522 \exp(-4\gamma\tau) - 6000 \exp(-6\gamma\tau) + \gamma\tau (36750 - \\ &- 73500 \exp(-2\gamma\tau) + 92610 \exp(-4\gamma\tau) - 42000 \exp(-6\gamma\tau)) + \\ &+ \gamma^2 \tau^2 (18375 - 110250 \exp(-2\gamma\tau) + 231525 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 147000 \exp(-6\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_4^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{1488375\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (2976750 - \\ &- 3087000 \exp(-2\gamma\tau) + 4000752 \exp(-4\gamma\tau) - 2916000 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau) + 857500 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau (2976750 - 9261000 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 20003760 \exp(-4\gamma\tau) - 20412000 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ 7717500 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 (1488375 - 13891500 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 50009400 \exp(-4\gamma\tau) - 71442000 \exp(-6\gamma\tau) + 34728750 \times \\ &\times \exp(-8\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_5^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{252130725\gamma^3} \exp(-\gamma\tau) (504261450 - \\ &- 747054000 \exp(-2\gamma\tau) + 1452272976 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 1764180000 \exp(-6\gamma\tau) + 1141332500 \exp(-8\gamma\tau) - \\ &- 300056400 \exp(-10\gamma\tau) + \gamma\tau (504261450 - 2241162000 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 7261364880 \exp(-4\gamma\tau) - 12349260000 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau) + 10271992500 \exp(-8\gamma\tau) - 3300620400 \times \\ &\times \exp(-10\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 (252130725 - 3361743000 \exp(-2\gamma\tau) + \end{aligned}$$

$$[1.124] \quad \int \tau^3 P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \left(\frac{\tau^3}{\gamma(2s+1)} + \frac{3\tau^2}{\gamma^2(2s+1)^2} + \frac{6\tau}{\gamma^3(2s+1)^3} + \frac{6}{\gamma^4(2s+1)^4} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^3 P_0^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (\gamma^3 \tau^3 + 3\gamma^2 \tau^2 + 6\gamma\tau + 6); \\ \int \tau^3 P_1^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{27\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (162 - 8 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ \gamma\tau (162 - 24 \exp(-2\gamma\tau) + \gamma^2 \tau^2 (81 - 36 \exp(-2\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 \times \\ &\times (27 - 36 \exp(-2\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_2^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{3375\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (20250 - 2500 \times \\ &\times \exp(-2\gamma\tau) + 486 \exp(-4\gamma\tau) + \gamma\tau (20250 - 7500 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 2430 \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 (10125 - 11250 \exp(-2\gamma\tau) + 6075 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 (3375 - 11250 \exp(-2\gamma\tau) + 10125 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau))); \\ \int \tau^3 P_3^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{643125\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (3858750 - \\ &- 857500 \exp(-2\gamma\tau) + 388962 \exp(-4\gamma\tau) - 90000 \exp(-6\gamma\tau) + \\ &+ \gamma\tau (3858750 - 2572500 \exp(-2\gamma\tau) + 1944810 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 630000 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 (1929375 - 3858750 \exp(-2\gamma\tau) + \\ &+ 4862025 \exp(-4\gamma\tau) - 2205000 \exp(-6\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 (643125 - \\ &- 3858750 \exp(-2\gamma\tau) + 8103375 \exp(-4\gamma\tau) - 5145000 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau)); \\ \int \tau^3 P_4^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{156279375\gamma^4} \exp(-\gamma\tau) (937676250 - \\ &- 324135000 \exp(-2\gamma\tau) + 252047376 \exp(-4\gamma\tau) - 131220000 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau) + 30012500 \exp(-8\gamma\tau) + \gamma\tau (937676250 - \\ &- 972405000 \exp(-2\gamma\tau) + 1260236880 \exp(-4\gamma\tau) - 918540000 \times \\ &\times \exp(-6\gamma\tau) + 270112500 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^2 \tau^2 (468838125 - \\ &- 1458607500 \exp(-2\gamma\tau) + 3150592200 \exp(-4\gamma\tau) - \\ &- 3214890000 \exp(-6\gamma\tau) + 1215506250 \exp(-8\gamma\tau)) + \gamma^3 \tau^3 \times \\ &\times (156279375 - 787648050 \exp(-2\gamma\tau) + 5250987000 \times \\ &\times \exp(-4\gamma\tau) - 7501410000 \exp(-6\gamma\tau) + 3646518750 \times \\ &\times \exp(-8\gamma\tau))); \end{aligned}$$




Рис. 1.124. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$

$$[1.125] \quad \int \tau^n P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+1)\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{n! \tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma(2s+1))^{j+1}}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^n P_0^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \frac{2n!}{\gamma} \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{\gamma} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!};$$

$$\int \tau^n P_1^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-\gamma\tau) \times$$

$$\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - 4n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} \right);$$

$$\int \tau^n P_2^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-\gamma\tau) \times$$

$$\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - 10n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} + \right)$$

$$+ 15n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} \Big);$$

$$\int \tau^n P_3^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-\gamma\tau) \times$$

$$\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - 18n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} + \right.$$

$$+ 63n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} -$$

$$- 56n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} \Big);$$

$$\int \tau^n P_4^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-\gamma\tau) \times$$

$$\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} - 28n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} + \right.$$

$$+ 168n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} -$$

$$- 336n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (9\gamma)^{j+1}} +$$

$$+ 210n! \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (11\gamma)^{j+1}} \Big);$$

$$\int \tau^n P_5^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau = - \exp(-\gamma\tau) \times$$

$$\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (\gamma)^{j+1}} - 40n! \exp(-2\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3\gamma)^{j+1}} + \right.$$

$$+ 360n! \exp(-4\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5\gamma)^{j+1}} -$$

$$- 1200n! \exp(-6\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7\gamma)^{j+1}} +$$

$$+ 1650n! \exp(-8\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (9\gamma)^{j+1}} -$$

$$- 792n! \exp(-10\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (11\gamma)^{j+1}} \Big).$$





Рис. 1.125. Вид неопределенного интеграла n -ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка; $n = 0..5$, $\gamma = 2$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$


$$[1.126] \quad \int P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} \times \\ \times \frac{2(-1)^s}{c\gamma(2s+1)} \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int P_0^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{c\gamma} \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2); \\ \int P_1^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{3c\gamma} \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2)(3 - (\beta + 2) \times \\ \times \exp(-c\gamma\tau)); \\ \int P_2^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{15c\gamma} \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2)(30 - 20 \times \\ \times (\beta + 3) \exp(-c\gamma\tau) + 3(\beta^2 + 7\beta + 12) \exp(-2c\gamma\tau)); \\ \int P_3^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{105c\gamma} \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2)(210 - 210 \times \\ \times (\beta + 4) \exp(-c\gamma\tau) + 63(\beta^2 + 9\beta + 20) \exp(-2c\gamma\tau) - 5 \times \\ \times (\beta^3 + 15\beta^2 + 74\beta + 120) \exp(-3c\gamma\tau)); \\ \int P_4^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{3780c\gamma} \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2) \times \\ \times (7560 - 10080(\beta + 5) \exp(-c\gamma\tau) + 4536(\beta^2 + 11\beta + 30) \times \\ \times \exp(-2c\gamma\tau) - 720(\beta^3 + 18\beta^2 + 107\beta + 210) \exp(-3c\gamma\tau) + 35 \times \\ \times (\beta^4 + 26\beta^3 + 251\beta^2 + 1656\beta + 1680) \exp(-4c\gamma\tau)); \\ \int P_5^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{41580c\gamma} \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2) \times \\ \times (83160 - 138600(\beta + 6) \exp(-c\gamma\tau) + 83160(\beta^2 + 13\beta + 42) \times \\ \times \exp(-2c\gamma\tau) - 19800(\beta^3 + 21\beta^2 + 146\beta + 336) \exp(-3c\gamma\tau) + \\ + 1925(\beta^4 + 30\beta^3 + 335\beta^2 + 1650\beta + 3024) \exp(-4c\gamma\tau) - 63 \times \\ \times (\beta^5 + 40\beta^4 + 635\beta^3 + 5000\beta^2 + 19524\beta + 30240) \exp(-5c\gamma\tau)). \end{aligned}$$



a)



б)

Рис. 1.126. Вид неопределенного интеграла от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 2$, $\beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (1; 3,5]$, $\beta = 1$


$$[1.127] \quad \int \tau P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2) \left(\frac{2\tau}{c\gamma(2s+1)} + \right. \\ \left. + \frac{4}{c^2\gamma^2(2s+1)^2} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 1-ого рода от функций 0-5 порядков:


$$\begin{aligned} \int \tau P_0^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{c^2\gamma^2} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right)(\gamma\tau + 2); \\ \int \tau P_1^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{9c^2\gamma^2} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right)(18 - 2(\beta + 2) \times \\ \times \exp(-c\gamma\tau) + \gamma\tau(9 - 3(\beta + 2) \exp(-c\gamma\tau))). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \tau P_2^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{225c^2\gamma^2} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) (450(c\gamma\tau + 2) - \\ &- 100(\beta + 3)(3c\gamma\tau + 2) \exp(-c\gamma\tau) + 9(\beta^2 + 7\beta + 12)(5c\gamma\tau + 2) \times \\ &\times \exp(-2c\gamma\tau)); \\ \int \tau P_3^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{3675c^2\gamma^2} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) (7350(c\gamma\tau + 2) - \\ &- 2450(\beta + 4)(3c\gamma\tau + 2) \exp(-c\gamma\tau) + 441(\beta^2 + 9\beta + 20) \times \\ &\times (5c\gamma\tau + 2) \exp(-2c\gamma\tau) - 25(\beta^3 + 15\beta^2 + 74\beta + 120)(7c\gamma\tau + 2) \times \\ &\times \exp(-3c\gamma\tau)); \\ \int \tau P_4^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{1190700c^2\gamma^2} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) \times \\ &\times (2381400(c\gamma\tau + 2) - 1058400(\beta + 5)(3c\gamma\tau + 2) \exp(-c\gamma\tau) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &+ 285768(\beta^2 + 11\beta + 30)(5c\gamma\tau + 2) \exp(-2c\gamma\tau) - 32400(\beta^3 + 18 \times \\ &\times \beta^2 + 107\beta + 210)(7c\gamma\tau + 2) \exp(-3c\gamma\tau) + 1225(\beta^4 + 26\beta^3 + \\ &+ 251\beta^2 + 1066\beta + 1680)(9c\gamma\tau + 2) \exp(-4c\gamma\tau)); \\ \int \tau P_5^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{28814940c^2\gamma^2} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) \times \\ &(57629880(c\gamma\tau + 2) - 32016600(\beta + 6)(3c\gamma\tau + 2) \exp(-c\gamma\tau) + \\ &+ 11525976(\beta^2 + 13\beta + 42)(5c\gamma\tau + 2) \exp(-2c\gamma\tau) - 1960200 \times \\ &\times (\beta^3 + 21\beta^2 + 146\beta + 336)(7c\gamma\tau + 2) \exp(-3c\gamma\tau) + 148225(\beta^4 + \\ &+ 30\beta^3 + 335\beta^2 + 1650\beta + 3024)(9c\gamma\tau + 2) \exp(-4c\gamma\tau) - 3969 \times \\ &\times (\beta^5 + 40\beta^4 + 635\beta^3 + 5000\beta^2 + 19524\beta + 30240)(11c\gamma\tau + 2) \times \\ &\times \exp(-5c\gamma\tau)). \end{aligned}$$



а)



б)

Рис. 1.127. Вид неопределенного интеграла 1-ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 2$, $\beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (1; 3, 5]$, $\beta = 1$

$$\begin{aligned} [1.128] \quad \int \tau^2 P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} \times \\ &\times (-1)^s \exp\left(-\frac{(2s+1)}{2} c\gamma\tau\right) \left(\frac{2\tau^2}{c\gamma(2s+1)} + \right. \\ &\left. + \frac{8\tau}{c^2\gamma^2(2s+1)^2} + \frac{16}{c^3\gamma^3(2s+1)^3} \right). \end{aligned}$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 2-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^2 P_0^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{c^3\gamma^3} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) (8 + 4c\gamma\tau + c^2\gamma^2\tau^2); \\ \int \tau^2 P_1^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2}{27c^3\gamma^3} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) (54(c^2\gamma^2\tau^2 + \\ &+ 4c\gamma\tau + 8) - 2(\beta + 2)(9c^2\gamma^2\tau^2 + 12c\gamma\tau + 8) \exp(-c\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_2^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{3375c^3\gamma^3} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) (6750(c^2\gamma^2\tau^2 + \\ &+ 4c\gamma\tau + 8) - 500(\beta + 3)(9c^2\gamma^2\tau^2 + 12c\gamma\tau + 8) \exp(-c\gamma\tau) + \\ &+ 27(\beta^2 + 7\beta + 12)(25c^2\gamma^2\tau^2 + 20c\gamma\tau + 8) \exp(-2c\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_3^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{385875c^3\gamma^3} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\times (771750(c^2\gamma^2\tau^2 + 4c\gamma\tau + 8) - 85750(\beta + 4)(9c^2\gamma^2\tau^2 + \\ &+ 12c\gamma\tau + 8) \exp(-c\gamma\tau) + 9261(\beta^2 + 9\beta + 20)(25c^2\gamma^2\tau^2 + \\ &+ 20c\gamma\tau + 8) \exp(-2c\gamma\tau) - 375(\beta^3 + 15\beta^2 + 74\beta + 120) \times \\ &\times (49c^2\gamma^2\tau^2 + 28c\gamma\tau + 8) \exp(-3c\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_4^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{375070500c^3\gamma^3} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) \times \\ &\times (750141000(c^2\gamma^2\tau^2 + 4c\gamma\tau + 8) - 111132000(\beta + 5)(9c^2\gamma^2\tau^2 + \\ &+ 12c\gamma\tau + 8) \exp(-c\gamma\tau) + 18003384(\beta^2 + 11\beta + 30)(25c^2\gamma^2\tau^2 + \\ &+ 20c\gamma\tau + 8) \exp(-2c\gamma\tau) - 1458000(\beta^3 + 18\beta^2 + 107\beta + 210) \times \\ &\times (49c^2\gamma^2\tau^2 + 28c\gamma\tau + 8) \exp(-3c\gamma\tau) + 42875(\beta^4 + 26\beta^3 + 251 \times \\ &\times \beta^2 + 1066\beta + 1680)(81c^2\gamma^2\tau^2 + 36c\gamma\tau + 8) \exp(-4c\gamma\tau)); \\ \int \tau^2 P_5^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{1}{99843767100c^3\gamma^3} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) \times \\ &\times (199687534200(c^2\gamma^2\tau^2 + 4c\gamma\tau + 8) - 36979173000(\beta + 6) \times \\ &\times (9c^2\gamma^2\tau^2 + 12c\gamma\tau + 8) \exp(-c\gamma\tau) + 7987501368(\beta^2 + 13\beta + \\ &+ 42)(25c^2\gamma^2\tau^2 + 20c\gamma\tau + 8) \exp(-2c\gamma\tau) - 970299000(\beta^3 + 21 \times \\ &\times \beta^2 + 146\beta + 336)(49c^2\gamma^2\tau^2 + 28c\gamma\tau + 8) \exp(-3c\gamma\tau) + \\ &+ 57066625(\beta^4 + 30\beta^3 + 335\beta^2 + 1650\beta + 3024)(81c^2\gamma^2\tau^2 + \\ &+ 36c\gamma\tau + 8) \exp(-4c\gamma\tau) - 12502359(\beta^5 + 40\beta^4 + 635\beta^3 + 5000 \times \\ &\times \beta^2 + 19524\beta + 30240)(121c^2\gamma^2\tau^2 + 44c\gamma\tau + 8) \exp(-5c\gamma\tau)). \end{aligned}$$




Рис. 1.128. Вид неопределенного интеграла 2-ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 2$, $\beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [1; 5]$, $\beta = 1$

$$[1.129] \quad \int \tau^3 P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2) \left(\frac{2\tau^3}{c\gamma(2s+1)} + \right. \\ \left. + \frac{12\tau^2}{c^2\gamma^2(2s+1)^2} + \frac{48\tau}{c^3\gamma^3(2s+1)^3} + \frac{96}{c^4\gamma^4(2s+1)^4} \right).$$

Частные случаи для неопределенного интеграла 3-ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\int \tau^3 P_0^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{c^4\gamma^4} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) (48 + 24c\gamma\tau + \\ + 6c^2\gamma^2\tau^2 + c^3\gamma^3\tau^3);$$

$$\int \tau^3 P_1^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{27c^4\gamma^4} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) (54(c^3\gamma^3\tau^3 + \\ + 6c^2\gamma^2\tau^2 + 24c\gamma\tau + 48) - 2(\beta+2)(9c^3\gamma^3\tau^3 + 18c^2\gamma^2\tau^2 + \\ + 24c\gamma\tau + 16) \exp(-c\gamma\tau));$$

$$\int \tau^3 P_2^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{16875c^4\gamma^4} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) \times \\ \times (33750(c^3\gamma^3\tau^3 + 6c^2\gamma^2\tau^2 + 24c\gamma\tau + 48) - 2500(\beta+3) \times \\ \times (9c^3\gamma^3\tau^3 + 18c^2\gamma^2\tau^2 + 24c\gamma\tau + 16) \exp(-c\gamma\tau) + 27(\beta^2 + \\ + 7\beta + 12)(125c^3\gamma^3\tau^3 + 150c^2\gamma^2\tau^2 + 120c\gamma\tau + 48) \exp(-2c\gamma\tau));$$

$$\int \tau^3 P_3^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{13505625c^4\gamma^4} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) \times$$

$$\times (27011250(c^3\gamma^3\tau^3 + 6c^2\gamma^2\tau^2 + 24c\gamma\tau + 48) - 3001250(\beta+4) \times \\ \times (9c^3\gamma^3\tau^3 + 18c^2\gamma^2\tau^2 + 24c\gamma\tau + 16) \exp(-c\gamma\tau) + 64827(\beta^2 + \\ + 9\beta + 20)(125c^3\gamma^3\tau^3 + 150c^2\gamma^2\tau^2 + 120c\gamma\tau + 48) \exp(-2c\gamma\tau) - \\ - 1875(\beta^3 + 15\beta^2 + 74\beta + 120)(343c^3\gamma^3\tau^3 + 294c^2\gamma^2\tau^2 + 168c\gamma\tau + \\ + 48) \exp(-3c\gamma\tau));$$

$$\int \tau^3 P_4^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{39382402500c^4\gamma^4} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) \times \\ \times (78764805000(c^3\gamma^3\tau^3 + 6c^2\gamma^2\tau^2 + 24c\gamma\tau + 48) - 11668860000 \times \\ \times (\beta+5)(9c^3\gamma^3\tau^3 + 18c^2\gamma^2\tau^2 + 24c\gamma\tau + 16) \exp(-c\gamma\tau) + \\ + 378071064(\beta^2 + 11\beta + 30)(125c^3\gamma^3\tau^3 + 150c^2\gamma^2\tau^2 + \\ + 120c\gamma\tau + 48) \exp(-2c\gamma\tau) - 21870000(\beta^3 + 18\beta^2 + 107\beta + 210) \times \\ \times (343c^3\gamma^3\tau^3 + 294c^2\gamma^2\tau^2 + 168c\gamma\tau + 48) \exp(-3c\gamma\tau) + \\ + 1500625(\beta^4 + 26\beta^3 + 251\beta^2 + 1066\beta + 1680)(243c^3\gamma^3\tau^3 + \\ + 162c^2\gamma^2\tau^2 + 72c\gamma\tau + 16) \exp(-4c\gamma\tau));$$

$$\int \tau^3 P_5^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{1}{9609962583375c^4\gamma^4} \exp\left(-\frac{c\gamma\tau}{2}\right) \times \\ \times (19219925166750(c^3\gamma^3\tau^3 + 6c^2\gamma^2\tau^2 + 24c\gamma\tau + 48) - \\ - 3559245401250(\beta+6)(9c^3\gamma^3\tau^3 + 18c^2\gamma^2\tau^2 + 24c\gamma\tau + 16) \times \\ \times \exp(-c\gamma\tau) + 307518802668(\beta^2 + 13\beta + 42)(125c^3\gamma^3\tau^3 + \\ + 150c^2\gamma^2\tau^2 + 120c\gamma\tau + 48) \exp(-2c\gamma\tau) - 80049667500(\beta^3 + 21 \times \\ \times \beta^2 + 146\beta + 336)(343c^3\gamma^3\tau^3 + 294c^2\gamma^2\tau^2 + 168c\gamma\tau + 48) \times \\ \times \exp(-3c\gamma\tau) + 43941301250(\beta^4 + 30\beta^3 + 335\beta^2 + 1650\beta + \\ + 3024)(243c^3\gamma^3\tau^3 + 162c^2\gamma^2\tau^2 + 72c\gamma\tau + 16) \exp(-4c\gamma\tau) - \\ - 1312746750(\beta^5 + 40\beta^4 + 635\beta^3 + 5000\beta^2 + 19524\beta + \\ + 30240)(1331c^3\gamma^3\tau^3 + 726c^2\gamma^2\tau^2 + 264c\gamma\tau + 48) \exp(-5c\gamma\tau)).$$




Рис. 1.129. Вид неопределенного интеграла 3-ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 2$, $\beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in (1; 3, 5]$, $\beta = 1$

$$[1.130] \quad \int \tau^n P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau = - \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} \times \\ \times (-1)^s \exp(-(2s+1)c\gamma\tau/2) \times \\ \times \sum_{j=0}^n \frac{n! \tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma(2s+1)/2)^{j+1}}.$$

Частные случаи для неопределенного интеграла n -ого рода от функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \int \tau^n P_0^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\frac{2n!}{\gamma} \exp(-c\gamma\tau/2) \times \\ &\times \sum_{j=0}^n \left(\frac{2}{c\gamma/2} \right)^j \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)!}; \\ \int \tau^n P_1^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\exp(-c\gamma\tau/2) \times \\ &\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma/2)^{j+1}} - \right. \\ &\left. - (\beta+2)n! \exp(-\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3c\gamma/2)^{j+1}} \right); \\ \int \tau^n P_2^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\exp(-c\gamma\tau/2) \times \\ &\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma/2)^{j+1}} - \right. \\ &\left. - 2(\beta+3)n! \exp(-c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3c\gamma/2)^{j+1}} + \right. \\ &\left. + \left(\frac{\beta+4}{2} \right) n! \exp(-2c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5c\gamma/2)^{j+1}} \right); \\ \int \tau^n P_3^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\exp(-c\gamma\tau/2) \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma/2)^{j+1}} - \right. \\ &- 3(\beta+4)n! \exp(-c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3c\gamma/2)^{j+1}} + \\ &+ 3 \left(\frac{\beta+5}{2} \right) n! \exp(-2c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5c\gamma/2)^{j+1}} - \\ &- \left(\frac{\beta+6}{3} \right) n! \exp(-3c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7c\gamma/2)^{j+1}} \Big); \\ \int \tau^n P_4^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\exp(-c\gamma\tau/2) \times \\ &\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma/2)^{j+1}} - \right. \\ &- 4(\beta+5)n! \exp(-c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3c\gamma/2)^{j+1}} + \\ &+ 6 \left(\frac{\beta+6}{2} \right) n! \exp(-2c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5c\gamma/2)^{j+1}} - \\ &- 4 \left(\frac{\beta+7}{3} \right) n! \exp(-3c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (7c\gamma/2)^{j+1}} + \\ &+ \left(\frac{\alpha+8}{4} \right) n! \exp(-4c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (9c\gamma/2)^{j+1}} \Big); \\ \int \tau^n P_5^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) d\tau &= -\exp(-c\gamma\tau/2) \times \\ &\times \left(n! \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (c\gamma/2)^{j+1}} - \right. \\ &- 5(\beta+6)n! \exp(-c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (3c\gamma/2)^{j+1}} + \\ &+ 10 \left(\frac{\beta+7}{2} \right) n! \exp(-2c\gamma\tau) \sum_{j=0}^n \frac{\tau^{n-j}}{(n-j)! (5c\gamma/2)^{j+1}} - \end{aligned}$$




Рис. 1.130. Вид неопределенного интеграла n -ого рода от ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $n = 0..5, \gamma = 2, \beta \in [0; 5]$; б) $n = 0..5, \gamma \in (1; 3, 5], \beta = 1$

Глава 2

Основные и расширенные свойства во временной области

Определение.

Для ортогональных функций, определенных в Главе 1, определены основные свойства [13].

Вид функций $\psi_k(\tau, \gamma)$	Норма $\ \psi_k\ ^2$	Вес $\mu^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma)$	Значение в «нуле» $\psi_k(0, \gamma)$
$P_k^{(\alpha, 0)}(\tau, \gamma)$	$\frac{1}{c\gamma(2k + \alpha + 1)}$	1	$(-1)^k$
$P_k^{(0, \beta)}(\tau, \gamma)$	$\frac{1}{c\gamma(2k + \beta + 1)}$	$(1 - \exp(-c\gamma\tau))^{\beta}$	$(-1)^k \binom{k + \beta}{k}$
$L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)$	$\frac{(k + \alpha)!}{k!\gamma^{\alpha+1}}$	τ^{α}	$\binom{k + \alpha}{k}$

и выявлено расширенное свойство [5]

$$\int_0^\infty \frac{\partial \psi_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau = -\psi_k(0, \gamma).$$

Таблица 2.1. Основные и расширенные свойства во временной области

Вид многочлена $\psi_k(\tau, \gamma)$	Весовая функция $\mu^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}$	Значение в "нуле" $\psi_k(0, \gamma)$	Интегральная характеристика $\int_0^\infty \frac{\partial \psi_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau$
$L_k(\tau, \gamma)$	1	1	-1
$L_k^{(1)}(\tau, \gamma)$	τ	$\frac{k+1}{2}$	$-\frac{(k+1)(k+2)}{2}$
$L_k^{(2)}(\tau, \gamma)$	τ^2	$\binom{k+1}{2}$	$-\binom{k+\alpha}{\alpha}$
$L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)$	τ^α	$(-1)^k$	$(-1)^{k+1}$
$P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)$	1	$(-1)^k$	$(-1)^{k+1}$
$Leg_k(\tau, \gamma)$	1	$(-1)^k$	$(-1)^{k+1}$
$P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)$	1	$(-1)^k$	$(-1)^{k+1}$
$P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)$	1	$(-1)^k$	$(-1)^{k+1}$
$P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)$	1	$(-1)^k$	$(-1)^{k+1}$
$P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)$	1	$(-1)^k$	$(-1)^{k+1}$
$P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)$	$1 - \exp(-c\gamma\tau)$	$(-1)^k(k+1)$	$(-1)^{k+1}(k+1)$
$P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)$	$(1 - \exp(-c\gamma\tau))^2$	$(-1)^k \frac{(k+1)(k+2)}{2}$	$(-1)^{k+1} \frac{(k+1)(k+2)}{2}$
$P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)$	$(1 - \exp(-c\gamma\tau))^\beta$	$(-1)^k \binom{k+\beta}{\beta}$	$(-1)^{k+1} \binom{k+\beta}{\beta}$

Глава 3

Основные и расширенные соотношения ортогональности во временной области

Определение.

Основное соотношение ортогональности имеет значения только по главной диагонали

$$\int_0^\infty \psi_k(\tau, \gamma) \psi_\nu(\tau, \gamma) \mu^{\{\psi_\nu(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = g_{k,\nu}(\gamma),$$

$$G(\gamma) = \text{diag} \{g_{0,0}(\gamma), g_{1,1}(\gamma), \dots, g_{K,K}(\gamma)\}.$$

Значения диагональных элементов матрицы $g_{k,\nu}(\gamma)$ приведены в Главе 1.

В отличие от основного соотношения в расширенном соотношении ортогональности [5]

$$\int_0^\infty \vartheta_k(\tau, \gamma) \psi_\nu(\tau, \gamma) \mu^{\{\psi_\nu(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = h_{k,\nu}(\gamma) \quad (k = 0..K, \nu = 0..K)$$

элементы располагаются по нескольким смежным диагоналям, например,

$$H(\gamma) = \begin{pmatrix} h_{0,0}(\gamma) & h_{1,0}(\gamma) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ h_{0,1}(\gamma) & h_{1,1}(\gamma) & h_{2,1}(\gamma) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & h_{1,2}(\gamma) & h_{2,2}(\gamma) & h_{3,2}(\gamma) & \dots & 0 \\ 0 & 0 & h_{2,3}(\gamma) & h_{3,3}(\gamma) & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & h_{K-1,K}(\gamma) \\ 0 & 0 & 0 & \dots & h_{K,K-1}(\gamma) & h_{K,K}(\gamma) \end{pmatrix}.$$

3.1 Основные соотношения ортогональности

$$[3.1] \quad \int_0^\infty L_s(\tau, \gamma) L_k(\tau, \gamma) d\tau = \begin{cases} \frac{1}{\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.1]} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.1. Графическое представление соотношения [3.1] при $k = 0..5; s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.2] \quad \int_0^{\infty} L_s^{(1)}(\tau, \gamma) L_k^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_s^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{k+1}{\gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.2]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.2. Графическое представление соотношения [3.2] при $k = 0..5; s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.3] \quad \int_0^{\infty} L_s^{(2)}(\tau, \gamma) L_k^{(2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_s^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{(k+1)(k+2)}{\gamma^3}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.3]} = \frac{1}{\gamma^3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 42 \end{pmatrix}.$$





Рис. 3.3. Графическое представление соотношения [3.3] при $k = 0..5; s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.4] \quad \int_0^{\infty} L_s^{(\alpha)}(\tau, \gamma) L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_s^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{(k+\alpha)!}{k! \gamma^{\alpha+1}}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.4]} = \frac{1}{\gamma^{\alpha+1}} \times \\ \times \begin{pmatrix} \alpha! & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (\alpha+1)! & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\alpha+2)! & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\alpha+3)! & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & (\alpha+4)! & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & (\alpha+5)! \end{pmatrix}.$$


Рис. 3.2. Графическое представление соотношения [3.2] при $k = 0..5; s = 0..5; \gamma = 1$

Рис. 3.4. Графическое представление соотношения [3.4] при $k = 0..5$ и $k = s$: а) $\gamma = 1$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [1; 6]$, $\alpha = 1$

$$[3.5] \quad \int_0^\infty P_s^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{1}{\gamma(4k+1)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:


$$\mathcal{M}_{[3.5]} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/13 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/21 \end{pmatrix}.$$

Рис. 3.5. Графическое представление соотношения [3.5] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[3.6] \quad \int_0^\infty Leg_s(\tau, \gamma) Leg_k(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{1}{2\gamma(2k+1)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.6]} = \frac{1}{2\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/11 \end{pmatrix}.$$

Рис. 3.6. Графическое представление соотношения [3.6] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[3.7] \quad \int_0^{\infty} P_s^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{1}{\gamma(4k+3)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.7]} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/11 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/15 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/19 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/23 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.7. Графическое представление соотношения [3.7] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.8] \quad \int_0^{\infty} P_s^{(1,0)}(\tau, \gamma) P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{1}{2\gamma(k+1)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.8]} = \frac{1}{2\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/6 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.8. Графическое представление соотношения [3.8] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.9] \quad \int_0^{\infty} P_s^{(2,0)}(\tau, \gamma) P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{1}{2\gamma(2k+3)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.9]} = \frac{1}{2\gamma} \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/13 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.9. Графическое представление соотношения [3.9] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.10] \quad \int_0^{\infty} P_s^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{1}{c\gamma(2k+\alpha+1)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.10]} = \frac{1}{c\gamma} \times \\ \times \begin{pmatrix} \frac{1}{(\alpha+1)} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{(\alpha+3)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{(\alpha+5)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{(\alpha+7)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{(\alpha+9)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{(\alpha+11)} \end{pmatrix}.$$

Поверхности в 3D-координатах (s , k , τ).

Рис. 3.10. Графическое представление соотношения [3.10] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$




Рис. 3.10. Графическое представление соотношения [3.10] при $k = 0..5$ и $k = s$: а) $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [0, 5; 5, 5]$, $c = 2$, $\alpha = 1$

$$[3.11] \quad \int_0^\infty P_s^{(0,1)}(\tau, \gamma) P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{P_s^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{1}{4\gamma(k+1)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.11]} = \frac{1}{4\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/6 \end{pmatrix}, \quad k$$




Рис. 3.11. Графическое представление соотношения [3.11] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[3.12] \quad \int_0^\infty P_s^{(0,2)}(\tau, \gamma) P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{P_s^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{1}{2\gamma(2k+3)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.12]} = \frac{1}{2\gamma} \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/13 \end{pmatrix}, \quad k$$





Рис. 3.12. Графическое представление соотношения [3.12] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$


$$[3.13] \quad \int_0^\infty P_s^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) \mu^{\{P_s^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{1}{c\gamma(2k + \beta + 1)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$



a)

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.13]} = \frac{1}{c\gamma} \times \\ \times \begin{pmatrix} \frac{1}{(\beta+1)} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{(\beta+3)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{(\beta+5)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{(\beta+7)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{(\beta+9)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{(\beta+11)} \end{pmatrix}.$$



б)

Рис. 3.13. Графическое представление соотношения [3.13] при $k = 0..5$ и $k = s$: а) $\gamma = 1, c = 2, \alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [0, 5; 5, 5], c = 2, \alpha = 1$

3.2 Расширенные соотношения ортогональности

$$[3.14] \quad \int_0^\infty L_s^{(1)}(\tau, \gamma) L_k(\tau, \gamma) \mu^{\{L_s^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{k+1}{\gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{k}{\gamma^2}, & \text{если } k = s + 1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.14]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.14. Графическое представление соотношения [3.14] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.15] \quad \int_0^\infty \tau L_s(\tau, \gamma) L_k(\tau, \gamma) d\tau =$$

$$= \begin{cases} -\frac{k+1}{\gamma^2}, & \text{если } k = s-1; \\ \frac{2k+1}{\gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{k}{\gamma^2}, & \text{если } k = s+1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.15]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 7 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 9 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 11 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.15. Графическое представление соотношения [3.15] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.16] \quad \int_0^\infty L_s^{(2)}(\tau, \gamma) L_k^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_s^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau =$$

$$= \begin{cases} \frac{(k+1)(k+2)}{\gamma^3}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{k(k+1)}{\gamma^3}, & \text{если } k = s+1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.16]} = \frac{1}{\gamma^3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & -12 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 & -20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 30 & -30 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 42 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.16. Графическое представление соотношения [3.16] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.17] \quad \int_0^\infty \tau L_s^{(1)}(\tau, \gamma) L_k(\tau, \gamma) \mu^{\{L_s^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau =$$

$$= \begin{cases} -\frac{(k+1)(k+2)}{\gamma^3}, & \text{если } k = s-1; \\ \frac{(3k+2)(k+1)}{\gamma^3}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{(3k+1)k}{\gamma^3}, & \text{если } k = s+1; \\ \frac{k(k-1)}{\gamma^3}, & \text{если } k = s+2; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.17]} = \frac{1}{\gamma^3} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 10 & -14 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 24 & -30 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & 44 & -52 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -20 & 70 & -80 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -30 & 102 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.17. Графическое представление соотношения [3.17] при $k = 0..5; s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.18] \quad \int_0^{\infty} L_s(\tau, \gamma) \frac{\partial L_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau = \begin{cases} -1, & \text{если } k > s; \\ -\frac{1}{2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.18]} = \begin{pmatrix} -1/2 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1/2 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1/2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.18. Графическое представление соотношения [3.18] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.19] \quad \int_0^{\infty} L_s(\tau, \gamma) \left(\int L_k(\tau, \gamma) d\tau \right) d\tau =$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{\gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ \frac{4(-1)^{k+s}}{\gamma^2}, & \text{если } k < s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.19]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & -4 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & -4 & 4 & -4 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & -4 & 4 & -4 & 2 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.19. Графическое представление соотношения [3.19] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.20] \quad \int_0^{\infty} L_s(\tau, \gamma) \left(\int \tau L_k(\tau, \gamma) d\tau \right) d\tau =$$

$$= \begin{cases} -\frac{2k}{\gamma^3}, & \text{если } k = s + 1; \\ \frac{2(4k+1)}{\gamma^3}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{2(7k+3)}{\gamma^3}, & \text{если } k = s - 1; \\ \frac{2(8k+4)(-1)^{k+s}}{\gamma^3}, & k < s - 1 \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.20]} = \frac{1}{\gamma^3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 10 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & -20 & 18 & -6 & 0 & 0 \\ -8 & 24 & -34 & 26 & -8 & 0 \\ 8 & -24 & 40 & -48 & 34 & -10 \\ -8 & 24 & -40 & 56 & -62 & 42 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.20. Графическое представление соотношения [3.20] при $k = 0.5, s = 0.5; \gamma = 1$

$$[3.21] \quad \int_0^{\infty} L_s(\tau, \gamma) L_k^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau = \begin{cases} \frac{1}{\gamma}, & \text{если } k \geq s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.21]} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.21. Графическое представление соотношения [3.21] при $k = 0.5, s = 0.5; \gamma = 1$

$$[3.22] \quad \int_0^{\infty} \tau L_s(\tau, \gamma) L_k^{(1)}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{k+1}{\gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{k+1}{\gamma^2}, & \text{если } k = s-1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.22]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 6 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.22. Графическое представление соотношения [3.22] при $k = 0.5, s = 0.5; \gamma = 1$

$$[3.23] \quad \int_0^{\infty} L_s(\tau, \gamma) \frac{\partial L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau = \\ = \begin{cases} -\frac{2(k-s)+1}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{1}{2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.23]} = \begin{pmatrix} -1/2 & -3/2 & -5/2 & -7/2 & -9/2 & -11/2 \\ 0 & -1/2 & -3/2 & -5/2 & -7/2 & -9/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & -3/2 & -5/2 & -7/2 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & -3/2 & -5/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & -5/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.23. Графическое представление соотношения [3.23] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$




Рис. 3.24. Графическое представление соотношения [3.24] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.24] \quad \int_0^{\infty} L_s(\tau, \gamma) L_k^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau =$$

$$= \begin{cases} \frac{k-s+1}{\gamma}, & \text{если } k > s; \\ \frac{1}{\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[3.25] \quad \int_0^{\infty} \tau L_s(\tau, \gamma) L_k^{(2)}(\tau, \gamma) d\tau =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\gamma^2}, & \text{если } k \geq s; \\ -\frac{k+1}{\gamma^2}, & \text{если } k = s-1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.24]} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.25]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.25. Графическое представление соотношения [3.25] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$\mathcal{M}_{[3.26]} = \begin{pmatrix} -1/2 & -2 & -9/2 & -8 & -25/2 & -18 \\ 0 & -1/2 & -2 & -9/2 & -8 & -25/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & -2 & -9/2 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & -2 & -9/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.26. Графическое представление соотношения [3.26] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.26] \quad \int_0^\infty L_s(\tau, \gamma) \frac{\partial L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau = \\ = \begin{cases} -\frac{(k-s+1)^2}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{1}{2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[3.27] \quad \int_0^\infty L_s^{(1)}(\tau, \gamma) \frac{\partial L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \mu^{\{L_s^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} -\frac{s+1}{\gamma}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{k+1}{\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.27]} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} -1/2 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -3/2 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5/2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.27. Графическое представление соотношения [3.27] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$\mathcal{M}_{[3.28]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -4 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & -5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 15 & -6 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.28. Графическое представление соотношения [3.28] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$\begin{aligned} [3.28] \quad & \int_0^\infty \tau L_s^{(1)}(\tau, \gamma) \frac{\partial L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \mu^{\{L_s^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \begin{cases} -\frac{(s+1)(s+2)}{2\gamma^2}, & \text{если } k = s+1; \\ -\frac{k+1}{\gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{s(s+1)}{2\gamma^2}, & \text{если } k = s-1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [3.29] \quad & \int_0^\infty L_s^{(2)}(\tau, \gamma) \frac{\partial L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \mu^{\{L_s^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \begin{cases} -\frac{(s+1)(s+2)}{2\gamma^2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{(k+1)(k+2)}{2\gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \end{aligned}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.29]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & -6 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & -6 & -12 & -12 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & -10 & -20 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -15 & -30 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -21 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.29. Графическое представление соотношения [3.29] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$\mathcal{M}_{[3.30]} = \frac{1}{\gamma^3} \begin{pmatrix} -3 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -9 & -12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & -18 & -30 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 30 & -30 & -60 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 60 & -45 & -105 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 105 & -63 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.30. Графическое представление соотношения [3.30] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$\begin{aligned} [3.30] \quad & \int_0^\infty \tau L_s^{(2)}(\tau, \gamma) \frac{\partial L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \mu^{\{L_s^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \begin{cases} -\frac{(s+1)(s+2)(s+3)}{2\gamma^3}, & \text{если } k = s+1; \\ -\frac{3(k+1)(k+2)}{2\gamma^3}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{s(s+1)(s+2)}{2\gamma^3}, & \text{если } k = s-1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [3.31] \quad & \int_0^\infty P_s^{(0,1)}(\tau, \gamma) Leg_k(\tau, \gamma) \mu^{\{P_s^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \begin{cases} \frac{1}{4(2k+1)\gamma}, & \text{если } k = s+1; \\ \frac{1}{4(2k+1)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \end{aligned}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.31]} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} 1/4 & 1/12 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/12 & 1/20 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/20 & 1/28 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/28 & 1/36 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/36 & 1/44 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/44 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.31. Графическое представление соотношения [3.31] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$\mathcal{M}_{[3.32]} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} 1/6 & 1/12 & 1/60 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/20 & 1/20 & 1/70 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/35 & 1/28 & 1/84 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5/252 & 1/36 & 1/99 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7/572 & 1/44 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2/195 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.32. Графическое представление соотношения [3.32] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.32] \quad \int_0^{\infty} P_s^{(0,2)}(\tau, \gamma) \text{Leg}_k(\tau, \gamma) \mu^{\{P_s^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{k-1}{4(2k-1)(2k+1)\gamma}, & \text{если } k = s+2; \\ \frac{1}{4(2k+1)\gamma}, & \text{если } k = s+1; \\ \frac{k+2}{4(2k+1)(2k+3)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[3.33] \quad \int_0^{\infty} P_s^{(0,2)}(\tau, \gamma) P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{P_s^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{k}{4(k+1)(2k+1)\gamma}, & \text{если } k = s+1; \\ \frac{k+2}{4(k+1)(2k+3)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.33]} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} 1/6 & 1/24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3/40 & 1/30 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/21 & 3/112 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5/144 & 1/45 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3/110 & 5/264 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7/312 \end{pmatrix}$$




Рис. 3.33. Графическое представление соотношения [3.33] при $k = 0..5$; $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[3.34] \quad \int_0^\infty P_s^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) \frac{\partial P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau =$$

$$= \begin{cases} -(-1)^{k+s}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{1}{2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$

$$\mathcal{M}_{[3.34]} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$$




Рис. 3.34. Графическое представление соотношения [3.34] при $k = 0..5$; $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[3.35] \quad \int_0^\infty Leg_s(\tau, \gamma) \frac{\partial Leg_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau =$$

$$= \begin{cases} -(-1)^{k+s}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{1}{2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$

$$\mathcal{M}_{[3.35]} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$$




Рис. 3.35. Графическое представление соотношения [3.35] при $k = 0..5$; $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[3.36] \quad \int_0^\infty P_s^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) \frac{\partial P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau =$$

$$= \begin{cases} -(-1)^{k+s}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{1}{2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$

$$\mathcal{M}_{[3.36]} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$$




Рис. 3.36. Графическое представление соотношения [3.36] при $k = 0..5; s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.37] \quad \int_0^\infty P_s^{(1,0)}(\tau, \gamma) \frac{\partial P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau =$$

$$= \begin{cases} -(-1)^{k+s}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{1}{2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$

$$\mathcal{M}_{[3.37]} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$$




Рис. 3.37. Графическое представление соотношения [3.37] при $k = 0..5; s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.38] \quad \int_0^\infty P_s^{(2,0)}(\tau, \gamma) \frac{\partial P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau =$$

$$= \begin{cases} -(-1)^{k+s}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{1}{2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$

$$\mathcal{M}_{[3.38]} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$$




Рис. 3.38. Графическое представление соотношения [3.38] при $k = 0..5; s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.39] \quad \int_0^\infty P_s^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) \frac{\partial P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau =$$



$$= \begin{cases} -(-1)^{k+s}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{1}{2}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[3.40] \quad \int_0^\infty P_s^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) \left(\int P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right) d\tau =$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{(4k+1)^2 \gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ \frac{(4s+1)(4k+1)\gamma^2}{\gamma^2}, & \text{если } k < s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.40]} = \frac{1}{\gamma^2} \times$$

Рис. 3.39. Графическое представление соотношения [3.40] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$ Рис. 3.40. Графическое представление соотношения [3.41] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.41] \quad \int_0^\infty Leg_s(\tau, \gamma) \left(\int Leg_k(\tau, \gamma) d\tau \right) d\tau =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2(2k+1)^2 \gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ \frac{1}{(2s+1)(2k+1)\gamma^2}, & \text{если } k < s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.41]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/18 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/5 & 1/15 & 1/50 & 0 & 0 & 0 \\ 1/7 & 1/21 & 1/35 & 1/98 & 0 & 0 \\ 1/9 & 1/27 & 1/45 & 1/63 & 1/162 & 0 \\ 1/11 & 1/33 & 1/55 & 1/77 & 1/99 & 1/242 \end{pmatrix}.$$

$$[3.42] \quad \int_0^\infty P_s^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) \left(\int P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right) d\tau =$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{(4k+3)^2 \gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ \frac{4}{(4s+3)(4k+3)\gamma^2}, & \text{если } k < s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.42]} = \frac{1}{\gamma^2} \times$$

$$\times \begin{pmatrix} 2/9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4/21 & 2/49 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4/33 & 4/77 & 2/121 & 0 & 0 & 0 \\ 4/45 & 4/105 & 4/165 & 2/225 & 0 & 0 \\ 4/57 & 4/133 & 4/209 & 4/285 & 2/361 & 0 \\ 4/69 & 4/161 & 4/253 & 4/345 & 4/437 & 2/529 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.41. Графическое представление соотношения [3.42] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$\mathcal{M}_{[3.43]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/6 & 1/18 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/8 & 1/12 & 1/32 & 0 & 0 \\ 1/5 & 1/10 & 1/15 & 1/20 & 1/50 & 0 \\ 1/6 & 1/12 & 1/18 & 1/24 & 1/30 & 1/72 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.42. Графическое представление соотношения [3.43] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.43] \quad \int_0^\infty P_s^{(1,0)}(\tau, \gamma) \left(\int P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right) d\tau =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2(k+1)^2 \gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ \frac{1}{(s+1)(k+1)\gamma^2}, & \text{если } k < s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[3.44] \quad \int_0^\infty P_s^{(2,0)}(\tau, \gamma) \left(\int P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right) d\tau =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2(2k+3)^2 \gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ \frac{1}{(2s+3)(2k+3)\gamma^2}, & \text{если } k < s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.44]} = \frac{1}{\gamma^2} \begin{pmatrix} 1/18 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/15 & 1/50 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/21 & 1/35 & 1/98 & 0 & 0 & 0 \\ 1/27 & 1/45 & 1/63 & 1/162 & 0 & 0 \\ 1/33 & 1/55 & 1/77 & 1/99 & 1/242 & 0 \\ 1/39 & 1/65 & 1/91 & 1/117 & 1/143 & 1/338 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.43. Графическое представление соотношения [3.44] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$




Рис. 3.44. Графическое представление соотношения [3.46] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[3.45] \quad \int_0^\infty P_s^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) \left(\int P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{2}{(2k + \alpha + 1)^2 c^2 \gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ \frac{4}{(2s + 3)(2k + 3)c^2 \gamma^2}, & \text{если } k < s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[3.46] \quad \int_0^\infty Leg_s(\tau, \gamma) P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) d\tau = \\ = \begin{cases} \frac{(-1)^{k+s}}{2\gamma(k+1)}, & \text{если } k > s; \\ \frac{1}{2\gamma(k+1)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.46]} = \frac{1}{\gamma} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/4 & 1/6 & -1/8 & 1/10 & -1/12 \\ 0 & 1/4 & -1/6 & 1/8 & -1/10 & 1/12 \\ 0 & 0 & 1/6 & 1/8 & -1/10 & 1/12 \\ 0 & 0 & 0 & 1/8 & -1/10 & 1/12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/10 & 1/12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/12 \end{pmatrix}.$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.47]} = \\ = \begin{pmatrix} -1/2 & 7/4 & -17/6 & 31/8 & -49/10 & 71/12 \\ 0 & -3/4 & 13/6 & -27/8 & 9/2 & -67/12 \\ 0 & 0 & -5/6 & 19/8 & -37/10 & 59/12 \\ 0 & 0 & 0 & -7/8 & 5/2 & -47/12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9/10 & 31/12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -11/12 \end{pmatrix}.$$




Рис. 3.45. Графическое представление соотношения [3.47] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.48] \int_0^\infty Leg_s(\tau, \gamma) P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) d\tau =$$

$$= \begin{cases} (-1)^{k+s} \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2\gamma(k+1)(k+2)} - \frac{s(s+1)}{2\gamma(k+1)(k+2)} \right), & \text{если } k > s; \\ \frac{1}{\gamma(k+2)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.48]} = \frac{1}{\gamma} \times$$

$$\times \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/3 & -5/12 & 9/20 & -7/15 & 10/21 \\ 0 & 0 & 1/4 & -7/20 & 2/5 & -3/7 \\ 0 & 0 & 0 & 1/5 & -3/10 & 5/14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/6 & -11/42 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/7 \end{pmatrix}$$




Рис. 3.46. Графическое представление соотношения [3.48] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[3.49] \int_0^\infty Leg_s(\tau, \gamma) \frac{\partial P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} d\tau =$$

$$= \begin{cases} -(-1)^{k+s} \left(\frac{(k(k+3)+1)}{2} - \frac{(2k(k+3)+3)s(s+1)}{2(k+1)(k+2)} - \frac{s^2(s+1)^2}{2(k+1)(k+2)} \right), & \text{если } k > s; \\ -\frac{(2k+1)}{(k+2)}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[3.49]} = \begin{pmatrix} -1/2 & 5/2 & -11/2 & 19/2 & -29/2 & 41/2 \\ 0 & -1 & 15/4 & -153/20 & 63/5 & -130/7 \\ 0 & 0 & -5/4 & 91/20 & -46/5 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & -7/5 & 51/10 & -145/14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3/2 & 11/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -11/7 \end{pmatrix}$$




Рис. 3.47. Графическое представление соотношения [3.49] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

Глава 4

Фазовые представления ортогональных функций

Определение.

В общем виде определим фазовые ортогональные функции во временной области как [5]

$$\Phi_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = \psi_k(\tau, \gamma) + j \frac{\partial \psi_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$$

Фазовое представление ортогональных функций во временной области обладает следующими основными свойствами:

$$\begin{cases} \operatorname{Re}\Phi_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(0) = \psi_k(0, \gamma); \\ \int_0^\infty \operatorname{Im}\Phi_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\tau) d\tau = -\psi_k(0, \gamma). \end{cases}$$

[4.1] $\Phi_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = L_k(\tau, \gamma) + j \frac{\partial L_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$




Рис. 4.1. Вид фазового представления ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 2$

[4.2] $\Phi_k^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = L_k^{(1)}(\tau, \gamma) + j \frac{\partial L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$




Рис. 4.2. Вид фазового представления ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 2, \alpha = 1$






Рис. 4.3. Вид фазового представления ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 2$, $\alpha = 2$

$$[4.3] \quad \Phi_k^{\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = L_k^{(2)}(\tau, \gamma) + j \frac{\partial L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$$

$$[4.4] \quad \Phi_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) + j \frac{\partial L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$$



а)



б)

Рис. 4.4. Вид фазового представления ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 2$, $\alpha \in [0;5]$; б) $\gamma \in [1;4]$, $\alpha = 1$

$$[4.5] \quad \Phi_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) + j \frac{\partial P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$$




Рис. 4.5. Вид фазового представления ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0,5$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$[4.6] \quad \Phi_k^{\{Leg_k(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = Leg_k(\tau, \gamma) + j \frac{\partial Leg_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$$




Рис. 4.6. Вид фазового представления ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$

$$[4.7] \quad \Phi_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) + j \frac{\partial P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$$




Рис. 4.7. Вид фазового представления ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0,5$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$[4.8] \quad \Phi_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) + j \frac{\partial P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$$




Рис. 4.8. Вид фазового представления ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[4.9] \quad \Phi_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) + j \frac{\partial P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$$




Рис. 4.9. Вид фазового представления ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0,5$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$[4.10] \quad \Phi_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\tau) = P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) + j \frac{\partial P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}.$$




Рис. 4.10. Вид фазового представления ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 0, 5$, $c = 2$, $\alpha \in [0; 5]$, $\beta = 0$; б) $\gamma \in [0, 5; 2, 5]$, $c = 2$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[4.11] \Phi_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\tau) = P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma) + j \frac{\partial P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau}.$$




Рис. 4.11. Вид фазового представления ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 5$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$[4.12] \Phi_k^{\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\tau) = P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma) + j \frac{\partial P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau}.$$




Рис. 4.12. Вид фазового представления ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 5$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$

$$[4.13] \Phi_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\tau) = P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma) + j \frac{\partial P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau}.$$




Рис. 4.13. Вид фазового представления ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 0, 5$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [0, 5; 2]$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

Глава 5

Интегральные представления ортогональных функций

Определение.

Данное определение ортогональных функций введено как обратное преобразование Фурье

$$\psi_k(\tau, \gamma) = \int_0^\infty W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \exp(j\omega\tau) d\omega.$$

$$[5.1] \quad L_k(\tau, \gamma) = \frac{2(-1)^k}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos((2k+1)\phi)}{\cos \phi} \cos\left(\frac{\tau\gamma}{2} \tan \phi\right) d\phi.$$

$$[5.2] \quad L_k^{(1)}(\tau, \gamma) = \frac{4(-1)^k(k+1)}{\pi\tau\gamma} \int_0^{\pi/2} \cos((2k+2)\phi) \cos\left(\frac{\tau\gamma}{2} \tan \phi\right) d\phi.$$

$$[5.3] \quad L_k^{(2)}(\tau, \gamma) = \frac{8(-1)^k(k+1)(k+2)}{\pi(\tau\gamma)^2} \times \\ \times \int_0^{\pi/2} \cos((2k+3)\phi) \cos \phi \cos\left(\frac{\tau\gamma}{2} \tan \phi\right) d\phi.$$

$$[5.4] \quad L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) = \frac{2^{\alpha+1}(-1)^k(k+\alpha)!}{\pi(\tau\gamma)^\alpha k!} \times \\ \times \int_0^{\pi/2} \cos((2k+\alpha+1)\phi) (\cos \phi)^{\alpha-1} \cos\left(\frac{\tau\gamma}{2} \tan \phi\right) d\phi.$$

$$[5.5] \quad P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) = \frac{2}{\pi} \times \\ \times \begin{cases} \int_0^{\pi/2} \cos((4k+1)\gamma\tau/2 \tan \phi) d\phi, & \text{если } k = 0; \\ \int_0^{\pi/2} \cos\left(\phi + \sum_{s=0}^{k-1} \arctan\left(\frac{4s+1}{4s+3} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \frac{\cos((4k+1)\gamma\tau/2 \tan \phi)}{\cos \phi} d\phi, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[5.6] \quad Leg_k(\tau, \gamma) = \frac{2}{\pi} \times \\ \times \begin{cases} \int_0^{\pi/2} \cos((2k+1)\gamma\tau \tan \phi) d\phi, & \text{если } k = 0; \\ \int_0^{\pi/2} \cos\left(\phi + \sum_{s=0}^{k-1} \arctan\left(\frac{2s+1}{2s+3} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \frac{\cos((2k+1)\gamma\tau \tan \phi)}{\cos \phi} d\phi, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[5.7] \quad P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) = \frac{2}{\pi} \times$$

$$\times \begin{cases} \int_0^{\pi/2} \cos((4k+3)\gamma\tau/2 \tan \phi) d\phi, & \text{если } k=0; \\ \int_0^{\pi/2} \cos\left(\phi + \right. \\ \left. + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \arctan\left(\frac{4k+3}{4s+3} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \frac{\cos((4k+3)\gamma\tau/2 \tan \phi)}{\cos \phi} d\phi, & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[5.8] \quad P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) = \frac{2}{\pi} \times$$

$$\times \begin{cases} \int_0^{\pi/2} \cos((k+1)\gamma\tau \tan \phi) d\phi, & \text{если } k=0; \\ \int_0^{\pi/2} \cos\left(\phi + \right. \\ \left. + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \arctan\left(\frac{k+1}{s+1} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \frac{\cos((k+1)\gamma\tau \tan \phi)}{\cos \phi} d\phi, & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[5.9] \quad P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) = \frac{2}{\pi} \times$$

$$\times \begin{cases} \int_0^{\pi/2} \cos((2k+3)\gamma\tau \tan \phi) d\phi, & \text{если } k=0; \\ \int_0^{\pi/2} \cos\left(\phi + \right. \\ \left. + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \arctan\left(\frac{2k+3}{2s+3} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \frac{\cos((2k+3)\gamma\tau \tan \phi)}{\cos \phi} d\phi, & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[5.10] \quad P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) = \frac{2}{\pi} \times$$

$$\times \begin{cases} \int_0^{\pi/2} \cos((2k+\alpha+1)c\gamma\tau/2 \tan \phi) d\phi, & \text{если } k=0; \\ \int_0^{\pi/2} \cos\left(\phi + 2 \times \right. \\ \left. \times \sum_{s=0}^{k-1} \arctan\left(\frac{2k+\alpha+1}{2s+\alpha+1} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \frac{\cos((2k+\alpha+1)c\gamma\tau/2 \tan \phi)}{\cos \phi} d\phi, & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[5.11] \quad P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) = \frac{4(k+1)}{\pi(2k+3)(1-\exp(-2\gamma\tau))} \times$$

$$\times \begin{cases} \int_0^{\pi/2} \cos\left(\arctan\left(\frac{2k+1}{2k+3} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \cos\left(\phi + \arctan\left(\frac{2k+1}{2k+3} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \frac{\cos((2k+1)\gamma\tau \tan \phi)}{\cos \phi} d\phi, & \text{если } k=0; \\ \int_0^{\pi/2} \cos\left(\arctan\left(\frac{2k+1}{2k+3} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \cos\left(\phi + \arctan\left(\frac{2k+1}{2k+3} \tan \phi\right)\right) + \\ + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \arctan\left(\frac{2k+1}{2s+1} \tan \phi\right) \times \\ \times \frac{\cos((2k+1)\gamma\tau \tan \phi)}{\cos \phi} d\phi, & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[5.12] \quad P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) = \frac{8(k+1)(k+2)}{(2k+3)(2k+5)(1-\exp(-2\gamma\tau))^2} \times$$

$$\times \begin{cases} \int_0^{\pi/2} \cos\left(\arctan\left(\frac{2k+1}{2k+3} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \cos\left(\arctan\left(\frac{2k+1}{2k+5} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \cos\left(\phi + \arctan\left(\frac{2k+1}{2k+3} \tan \phi\right)\right) + \\ + \arctan\left(\frac{2k+1}{2k+5} \tan \phi\right) \times \\ \times \frac{\cos((2k+1)\gamma\tau \tan \phi)}{\cos \phi} d\phi, & \text{если } k=0; \\ \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos\left(\arctan\left(\frac{2k+1}{2k+3} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \cos\left(\arctan\left(\frac{2k+1}{2k+5} \tan \phi\right)\right) \times \\ \times \cos\left(\phi + \arctan\left(\frac{2k+1}{2k+3} \tan \phi\right)\right) + \\ + \arctan\left(\frac{2k+1}{2k+5} \tan \phi\right) + \\ + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \arctan\left(\frac{2k+1}{2s+1} \tan \phi\right) \times \\ \times \frac{\cos((2k+1)\gamma\tau \tan \phi)}{\cos \phi} d\phi, & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
[5.13] \quad P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) &= \\
&= \frac{2^{\beta+1}(k+\beta)!(2k+1)}{\pi k! (1 - \exp(-2c\gamma\tau/2))^{\beta} \prod_{p=0}^{\beta} (2k+2p+1)} \times \\
&\quad \left\{ \int_0^{\pi/2} \prod_{p=0}^{\beta} \cos \left(\arctan \left(\frac{2k+1}{2k+2p+1} \tan \phi \right) \right) \times \right. \\
&\quad \times \cos \left(\phi + \right. \\
&\quad \left. \left. + \sum_{p=0}^{\beta} \arctan \left(\frac{2k+1}{2k+2p+1} \tan \phi \right) \right) \times \\
&\quad \times \frac{\cos((2k+1)c\gamma\tau/2 \tan \phi)}{(\cos \phi)^2} d\phi, \quad k = 0; \\
&\quad \times \left\{ \int_0^{\pi/2} \prod_{p=0}^{\beta} \cos \left(\arctan \left(\frac{2k+1}{2k+2p+1} \tan \phi \right) \right) \times \right. \\
&\quad \times \cos \left(\phi + \right. \\
&\quad \left. \left. + \sum_{p=0}^{\beta} \arctan \left(\frac{2k+1}{2k+2p+1} \tan \phi \right) + \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \arctan \left(\frac{2k+1}{2s+1} \tan \phi \right) \right) \times \right. \\
&\quad \left. \times \frac{\cos((2k+1)c\gamma\tau/2 \tan \phi)}{(\cos \phi)^2} d\phi, \quad k > 0. \right\}
\end{aligned}$$

Глава 6

Аналитические представления в частотной области

Определение.

Для представления ортогональных функций в частотной области имеет место ряд определений в зависимости от дальнейшего приложения. Наиболее распространено следующее определение, известное как преобразование Фурье ортогональных функций[9, 1]

$$W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \int_0^\infty \psi_k(\tau, \gamma) \exp(-j\omega\tau) d\tau.$$

В отличие от вышеприведенной характеристики преобразование Фурье ортогональных фильтров является физически реализуемым [6]

$$V_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \int_0^\infty \psi_k(\tau, \gamma) \exp(-j\omega\tau) \mu^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau.$$

Значительно реже используется определение преобразования Фурье производных ортогональных функций $W_k^{\left\{ \frac{\partial \psi_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega)$.

6.1 Преобразование Фурье ортогональных функций

$$\begin{aligned} [6.1] \quad W_k^{[1]\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \frac{1}{j\omega + \gamma/2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s. \end{aligned}$$

$$[6.2] \quad W_k^{[2]\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{j\omega + \gamma/2} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^k.$$

$$\begin{aligned} [6.3] \quad W_k^{[3]\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \frac{2}{\gamma} (-1)^k \cos \varphi \times \\ &\times \exp(-j(2k+1)\varphi), \quad \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}. \end{aligned}$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} W_0^{\{L_0(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{j\omega + \gamma/2}; \\ W_1^{\{L_1(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \frac{j\omega - \gamma/2}{(j\omega + \gamma/2)^2}; \\ W_2^{\{L_2(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \frac{(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^3}; \\ W_3^{\{L_3(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \frac{(j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^4}; \end{aligned}$$

$$W_4^{\{L_4(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{(j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^5};$$

$$W_5^{\{L_5(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{(j\omega - \gamma/2)^5}{(j\omega + \gamma/2)^6}.$$




Рис. 6.1. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4$

$$[6.4] \quad W_k^{[1]\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) =$$

$$= \frac{1}{j\omega + \gamma/2} \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s.$$

$$[6.5] \quad W_k^{[2]\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{\gamma} \left(1 - \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^{k+1} \right).$$

$$[6.6] \quad W_k^{[3]\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) =$$

$$= \frac{1}{\gamma} \left(1 + (-1)^k \exp(-j(2k+2)\varphi) \right), \quad \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\{L_0^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{j\omega + \gamma/2};$$

$$W_1^{\{L_1^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{2j\omega}{(j\omega + \gamma/2)^2};$$

$$W_2^{\{L_2^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2/4 - 3\omega^2}{(j\omega + \gamma/2)^3};$$

$$W_3^{\{L_3^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2 j\omega - 4j\omega^3}{(j\omega + \gamma/2)^4};$$

$$W_4^{\{L_4^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^4/16 - 5\gamma^2\omega^2/2 + 5\omega^4}{(j\omega + \gamma/2)^5};$$

$$W_5^{\{L_5^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{3\gamma^4 j\omega/8 - 5\gamma^2 j\omega^3 + 6j\omega^4}{(j\omega + \gamma/2)^6}.$$




Рис. 6.2. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4, \alpha = 1$

$$[6.7] \quad W_k^{[1]\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) =$$

$$= \frac{1}{j\omega + \gamma/2} \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s.$$

$$[6.8] \quad W_k^{[2]\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{\gamma^2} \times$$

$$\times \left[\left(\left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^{k+1} - 1 \right) (j\omega - \gamma/2) + \gamma(k+1) \right].$$

$$[6.9] \quad W_k^{[3]\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{\gamma} \times$$

$$\times \left(\frac{\exp(-j\varphi) + (-1)^k \exp(-j(2k+3)\varphi)}{2 \cos \varphi} + k+1 \right),$$

$$\varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\{L_0^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{j\omega + \gamma/2};$$

$$W_1^{\{L_1^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma/2 + 3j\omega}{(j\omega + \gamma/2)^2};$$

$$W_2^{\{L_2^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2/2 + 2\gamma j\omega - 6\omega^2}{(j\omega + \gamma/2)^3};$$

$$W_3^{\{L_3^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^3/4 + 5\gamma^2 j\omega/2 - 5\gamma\omega^2 - 10j\omega^3}{(j\omega + \gamma/2)^4};$$

$$W_4^{\{L_4^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + \gamma/2)^5} (3\gamma^4/16 + 3\gamma^3 j\omega/2 - 15\gamma^2\omega^2/2 - 10\gamma j\omega^3 + 15\omega^4);$$

$$W_5^{\{L_5^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + \gamma/2)^6} (3\gamma^5/32 + 21\gamma^4 j\omega/16 - 21\gamma^3\omega^2/4 - 35\gamma^2 j\omega^3/2 + 35\gamma\omega^4/2 + 21j\omega^5).$$




Рис. 6.3. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4$, $\alpha = 2$

$$[6.10] \quad W_k^{[1]\{L_k^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{j\omega + \gamma/2} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s.$$




Рис. 6.4. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 4$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [1; 5]$, $\alpha = 1$

$$[6.12] \quad W_k^{[1]\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+1)\gamma/2 + j\omega}.$$

$$[6.11] \quad W_k^{[2]\{L_k^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \\ = \frac{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha-1}}{(-\gamma)^\alpha} \left[\left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^{k+\alpha} - \sum_{p=0}^{\alpha-1} \binom{k+\alpha}{p} \left(-\frac{\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^p \right], \quad \alpha \in \mathbb{Z}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\{L_0^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{j\omega + \gamma/2};$$


$$W_1^{\{L_1^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma(\alpha-1)/2 + j\omega(\alpha+1)}{(j\omega + \gamma/2)^2};$$

$$W_2^{\{L_2^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + \gamma/2)^3} (\gamma^2(\alpha^2 + \alpha - 2)/8 + \gamma j\omega(\alpha^2 - \alpha + 2)/2 - \omega^2(\alpha^2 + 3\alpha + 2)/2);$$

$$W_3^{\{L_3^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + \gamma/2)^4} (-\gamma^3 + \gamma^2(j\omega + \gamma/2)(\alpha+3) - \gamma(j\omega + \gamma/2)^2(\alpha+2)(\alpha+3)/2 - (j\omega + \gamma/2)^3(\alpha+3)/(6\alpha!));$$

$$W_4^{\{L_4^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + \gamma/2)^5} (\gamma^4 - \gamma^3(j\omega + \gamma/2)(\alpha+4) + \gamma^2(j\omega + \gamma/2)^2(\alpha+3)(\alpha+4)/2 - \gamma(j\omega + \gamma/2)^3 \times \times (\alpha+4)/(6(\alpha+1)!)) + (j\omega + \gamma/2)^4(\alpha+4)!/(24\alpha!));$$

$$W_5^{\{L_5^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + \gamma/2)^6} (-\gamma^5 + \gamma^4(j\omega + \gamma/2)(\alpha+5) - \gamma^3(j\omega + \gamma/2)^2(\alpha+4)(\alpha+5)/2 + \gamma^2(j\omega + \gamma/2)^3 \times \times (\alpha+5)/(6(\alpha+2)!)) - \gamma(j\omega + \gamma/2)^4(\alpha+5)!/(24(\alpha+1)!)) + (j\omega + \gamma/2)^5(\alpha+5)!/(120\alpha!)).$$



$$[6.13] \quad W_k^{[2]\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\gamma/2 + j\omega}, & \text{если } k = 0; \\ \frac{1}{(4k+1)\gamma/2 + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(4s+1)\gamma/2 - j\omega}{(4s+1)\gamma/2 + j\omega}, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$




Рис. 6.5. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$[6.14] \quad W_k^{[3]\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) =$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{\gamma} \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ \frac{2}{(4k+1)\gamma} \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right), & \text{если } k > 0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(4k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\{P_0^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{\gamma/2 + j\omega};$$

$$W_1^{\{P_1^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma/2 - j\omega}{(\gamma/2 + j\omega)(5\gamma/2 + j\omega)};$$

$$W_2^{\{P_2^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\gamma/2 - j\omega)(5\gamma/2 - j\omega)}{(\gamma/2 + j\omega)(5\gamma/2 + j\omega)(9\gamma/2 + j\omega)};$$

$$W_3^{\{P_3^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(13\gamma/2 + j\omega)} \frac{(\gamma/2 - j\omega)}{(\gamma/2 + j\omega)} \times$$

$$\times \frac{(5\gamma/2 - j\omega)(9\gamma/2 - j\omega)}{(5\gamma/2 + j\omega)(9\gamma/2 + j\omega)};$$

$$W_4^{\{P_4^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(17\gamma/2 + j\omega)} \frac{(\gamma/2 - j\omega)}{(\gamma/2 + j\omega)} \times$$

$$\times \frac{(5\gamma/2 - j\omega)(9\gamma/2 - j\omega)}{(5\gamma/2 + j\omega)(9\gamma/2 + j\omega)} \frac{(13\gamma/2 - j\omega)}{(13\gamma/2 + j\omega)};$$

$$W_5^{\{P_5^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(21\gamma/2 + j\omega)} \frac{(\gamma/2 - j\omega)}{(\gamma/2 + j\omega)} \times$$

$$\times \frac{(5\gamma/2 - j\omega)(9\gamma/2 - j\omega)}{(5\gamma/2 + j\omega)(9\gamma/2 + j\omega)} \frac{(13\gamma/2 - j\omega)(17\gamma/2 - j\omega)}{(13\gamma/2 + j\omega)(17\gamma/2 + j\omega)}.$$

[6.15]

$$W_k^{[1]\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)\gamma + j\omega}.$$

[6.16] $W_k^{[2]\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) =$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\gamma + j\omega}, & \text{если } k = 0; \\ \frac{1}{(2k+1)\gamma + j\omega} \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+1)\gamma - j\omega}{(2s+1)\gamma + j\omega}, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

[6.17] $W_k^{[3]\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) =$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\gamma} \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ \frac{1}{(2k+1)\gamma} \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right), & \text{если } k > 0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\{Leg_0(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{\gamma + j\omega};$$

$$W_1^{\{Leg_1(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma - j\omega}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)};$$

$$W_2^{\{Leg_2(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)};$$

$$W_3^{\{Leg_3(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)(7\gamma + j\omega)};$$

$$W_4^{\{Leg_4(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(9\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} \times$$

$$\times \frac{(5\gamma - j\omega)(7\gamma - j\omega)}{(5\gamma + j\omega)(7\gamma + j\omega)};$$

$$W_5^{\{Leg_5(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(11\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} \times \\ \times \frac{(5\gamma - j\omega)(7\gamma - j\omega)(9\gamma - j\omega)}{(5\gamma + j\omega)(7\gamma + j\omega)(9\gamma + j\omega)}.$$




Рис. 6.6. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$

$$[6.18] \quad W_k^{[1]\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+3)\gamma/2 + j\omega}.$$

$$[6.19] \quad W_k^{[2]\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ = \begin{cases} \frac{1}{3\gamma/2 + j\omega}, & \text{если } k = 0; \\ \frac{(4k+3)\gamma/2 + j\omega}{(4k+3)\gamma/2 + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(4s+3)\gamma/2 - j\omega}{(4s+3)\gamma/2 + j\omega}, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.20] \quad W_k^{[3]\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ = \begin{cases} \frac{2}{3\gamma} \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ \frac{2}{(4k+3)\gamma} \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right), & \text{если } k > 0, \end{cases} \\ \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(4k+3)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\{P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{3\gamma/2 + j\omega};$$

$$W_1^{\{P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{3\gamma/2 - j\omega}{(3\gamma/2 + j\omega)(7\gamma/2 + j\omega)};$$

$$W_2^{\{P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{(3\gamma/2 - j\omega)(7\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)};$$

$$W_3^{\{P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(15\gamma/2 + j\omega)} \frac{(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)} \times \\ \times \frac{(7\gamma/2 - j\omega)(11\gamma/2 - j\omega)}{(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)};$$

$$W_4^{\{P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(19\gamma/2 + j\omega)} \frac{(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)} \times \\ \times \frac{(7\gamma/2 - j\omega)(11\gamma/2 - j\omega)}{(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)} \frac{(15\gamma/2 - j\omega)}{(15\gamma/2 + j\omega)};$$

$$W_5^{\{P_5^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(23\gamma/2 + j\omega)} \frac{(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)} \times \\ \times \frac{(7\gamma/2 - j\omega)(11\gamma/2 - j\omega)}{(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)} \frac{(15\gamma/2 - j\omega)(19\gamma/2 - j\omega)}{(15\gamma/2 + j\omega)(19\gamma/2 + j\omega)}.$$




Рис. 6.7. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$[6.21] \quad W_k^{[1]\{P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \frac{1}{(s+1)\gamma + j\omega}.$$

$$[6.22] \quad W_k^{[2]\{P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ = \begin{cases} \frac{1}{\gamma + j\omega}, & \text{если } k = 0; \\ \frac{1}{(k+1)\gamma + j\omega} \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(s+1)\gamma - j\omega}{(s+1)\gamma + j\omega}, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.23] \quad W_k^{[3]\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\gamma} \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ \frac{1}{(k+1)\gamma} \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right), & \text{если } k > 0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\{P_0^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{\gamma + j\omega};$$

$$W_1^{\{P_1^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma - j\omega}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)};$$

$$W_2^{\{P_2^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)};$$

$$W_3^{\{P_3^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)(4\gamma + j\omega)};$$

$$W_4^{\{P_4^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(5\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} \times$$

$$\times \frac{(4\gamma - j\omega)}{(4\gamma + j\omega)};$$

$$W_5^{\{P_5^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(6\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} \times$$

$$\times \frac{(4\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(4\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)}.$$




Рис. 6.8. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[6.24] \quad W_k^{[1]\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) =$$

$$= \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \frac{1}{(2s+3)\gamma + j\omega}.$$

$$[6.25] \quad W_k^{[2]\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{3\gamma + j\omega}, & \text{если } k = 0; \\ \frac{1}{(2k+3)\gamma + j\omega} \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+3)\gamma - j\omega}{(2s+3)\gamma + j\omega}, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.26] \quad W_k^{[3]\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{3\gamma} \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ \frac{1}{(2k+3)\gamma} \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right), & \text{если } k > 0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+3)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\{P_0^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{3\gamma + j\omega};$$

$$W_1^{\{P_1^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{3\gamma - j\omega}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)};$$

$$W_2^{\{P_2^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)(7\gamma + j\omega)};$$

$$W_3^{\{P_3^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(9\gamma + j\omega)} \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \frac{(7\gamma - j\omega)}{(7\gamma + j\omega)};$$

$$W_4^{\{P_4^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(11\gamma + j\omega)} \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \times$$

$$\times \frac{(7\gamma - j\omega)(9\gamma - j\omega)}{(7\gamma + j\omega)(9\gamma + j\omega)};$$

$$W_5^{\{P_5^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(13\gamma + j\omega)} \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \times$$

$$\times \frac{(7\gamma - j\omega)(9\gamma - j\omega)(11\gamma - j\omega)}{(7\gamma + j\omega)(9\gamma + j\omega)(11\gamma + j\omega)}.$$




Рис. 6.9. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$[6.27] \quad W_k^{[1]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \frac{1}{(2s+\alpha+1)c\gamma/2 + j\omega}.$$


$$[6.28] \quad W_k^{[2]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{(\alpha+1)c\gamma/2 + j\omega}, & \text{если } k=0; \\ \frac{1}{(2k+\alpha+1)c\gamma/2 + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+\alpha+1)c\gamma/2 - j\omega}{(2s+\alpha+1)c\gamma/2 + j\omega}, & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[6.29] \quad W_k^{[3]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \begin{cases} \frac{2}{(\alpha+1)c\gamma} \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k=0; \\ \frac{2}{(2k+\alpha+1)c\gamma} \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right), & \text{если } k>0, \end{cases}$$


$\varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(2k+\alpha+1)c\gamma}.$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} W_0^{\{P_0^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{(\alpha+1)c\gamma/2 + j\omega}; \\ W_1^{\{P_1^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{(\alpha+1)c\gamma/2 - j\omega}{((\alpha+1)c\gamma/2 + j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2 + j\omega)}; \\ W_2^{\{P_2^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{((\alpha+5)c\gamma/2 + j\omega)} \frac{((\alpha+1)c\gamma/2 - j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2 + j\omega)} \times \\ &\times \frac{((\alpha+3)c\gamma/2 - j\omega)}{((\alpha+3)c\gamma/2 + j\omega)}; \\ W_3^{\{P_3^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{((\alpha+7)c\gamma/2 + j\omega)} \frac{((\alpha+1)c\gamma/2 - j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2 + j\omega)} \times \\ &\times \frac{((\alpha+3)c\gamma/2 - j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2 - j\omega)}{((\alpha+3)c\gamma/2 + j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2 + j\omega)}; \\ W_4^{\{P_4^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{((\alpha+9)c\gamma/2 + j\omega)} \frac{((\alpha+1)c\gamma/2 - j\omega)}{((\alpha+7)c\gamma/2 + j\omega)} \times \\ &\times \frac{((\alpha+3)c\gamma/2 - j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2 - j\omega)}{((\alpha+3)c\gamma/2 + j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2 + j\omega)} \frac{((\alpha+7)c\gamma/2 - j\omega)}{((\alpha+7)c\gamma/2 + j\omega)}; \\ W_5^{\{P_5^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{((\alpha+11)c\gamma/2 + j\omega)} \frac{((\alpha+1)c\gamma/2 - j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2 + j\omega)} \times \\ &\times \frac{((\alpha+3)c\gamma/2 - j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2 - j\omega)((\alpha+7)c\gamma/2 - j\omega)}{((\alpha+3)c\gamma/2 + j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2 + j\omega)((\alpha+7)c\gamma/2 + j\omega)} \frac{((\alpha+9)c\gamma/2 - j\omega)}{((\alpha+9)c\gamma/2 + j\omega)}. \end{aligned}$$



a)



б)

Рис. 6.10. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 1, c = 2, \alpha \in [0; 5], \beta = 0$; б) $\gamma \in [1; 3, 5], c = 2, \alpha = 1, \beta = 0$

$$[6.30] \quad W_k^{[1]\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)\gamma + j\omega}.$$

$$[6.31] \quad W_k^{[2]\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} \times \\ \times (-1)^s \frac{\cos \varphi_s \exp(-j\varphi_s)}{(2s+1)\gamma}, \quad \varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\{P_0^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{\gamma + j\omega};$$

$$\begin{aligned}
W_1^{\{P_1^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega} - \frac{3}{3\gamma + j\omega}; \\
W_2^{\{P_2^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega} - \frac{8}{3\gamma + j\omega} + \frac{10}{5\gamma + j\omega}; \\
W_3^{\{P_3^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega} - \frac{15}{3\gamma + j\omega} + \frac{45}{5\gamma + j\omega} - \frac{35}{7\gamma + j\omega}; \\
W_4^{\{P_4^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega} - \frac{24}{3\gamma + j\omega} + \frac{126}{5\gamma + j\omega} - \\
&- \frac{224}{7\gamma + j\omega} + \frac{126}{9\gamma + j\omega}; \\
W_5^{\{P_5^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega} - \frac{35}{3\gamma + j\omega} + \frac{280}{5\gamma + j\omega} - \\
&- \frac{840}{7\gamma + j\omega} + \frac{1050}{9\gamma + j\omega} - \frac{462}{11\gamma + j\omega}.
\end{aligned}$$




Рис. 6.11. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$\begin{aligned}
[6.32] \quad W_k^{[1]\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\
&= \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)\gamma + j\omega}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[6.33] \quad W_k^{[2]\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} \times \\
&\times (-1)^s \frac{\cos \varphi_s \exp(-j\varphi_s)}{(2s+1)\gamma}, \quad \varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}.
\end{aligned}$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
W_0^{\{P_0^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega}; \\
W_1^{\{P_1^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega} - \frac{4}{3\gamma + j\omega}; \\
W_2^{\{P_2^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega} - \frac{10}{3\gamma + j\omega} + \frac{15}{5\gamma + j\omega}; \\
W_3^{\{P_3^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega} - \frac{18}{3\gamma + j\omega} + \frac{63}{5\gamma + j\omega} - \frac{56}{7\gamma + j\omega};
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
W_4^{\{P_4^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega} - \frac{28}{3\gamma + j\omega} + \frac{168}{5\gamma + j\omega} - \\
&- \frac{336}{7\gamma + j\omega} + \frac{210}{9\gamma + j\omega}; \\
W_5^{\{P_5^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{\gamma + j\omega} - \frac{40}{3\gamma + j\omega} + \frac{360}{5\gamma + j\omega} - \\
&- \frac{1200}{7\gamma + j\omega} + \frac{1650}{9\gamma + j\omega} - \frac{792}{11\gamma + j\omega}.
\end{aligned}$$

Рис. 6.12. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$

$$\begin{aligned}
[6.34] \quad W_k^{[1]\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\
&= \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)c\gamma/2 + j\omega}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[6.35] \quad W_k^{[2]\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} \times \\
&\times (-1)^s \frac{\cos \varphi_s \exp(-j\varphi_s)}{(2s+1)c\gamma/2}, \quad \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(2k+1)c\gamma}.
\end{aligned}$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:


$$\begin{aligned}
W_0^{\{P_0^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{c\gamma/2 + j\omega}; \\
W_1^{\{P_1^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{c\gamma/2 + j\omega} - \frac{\beta+2}{3c\gamma/2 + j\omega}; \\
W_2^{\{P_2^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{c\gamma/2 + j\omega} - \frac{2(\beta+3)}{3c\gamma/2 + j\omega} + \\
&+ \frac{(\beta+3)(\beta+4)/2}{5c\gamma/2 + j\omega}; \\
W_3^{\{P_3^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{c\gamma/2 + j\omega} - \frac{3(\beta+4)}{3c\gamma/2 + j\omega} + \\
&+ \frac{3(\beta+4)(\beta+5)/2}{5c\gamma/2 + j\omega} - \frac{(\beta+4)(\beta+5)(\beta+6)/6}{7c\gamma/2 + j\omega}; \\
W_4^{\{P_4^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1}{c\gamma/2 + j\omega} - \frac{4(\beta+5)}{3c\gamma/2 + j\omega} + \\
&+ \frac{3(\beta+5)(\beta+6)}{5c\gamma/2 + j\omega} - \frac{2(\beta+5)(\beta+6)(\beta+7)/3}{7c\gamma/2 + j\omega} +
\end{aligned}$$

$$+ \frac{(\beta+8)!}{24(\beta+4)!(9c\gamma/2+j\omega)};$$


$$W_5^{\{P_5^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{c\gamma/2+j\omega} - \frac{5(\beta+6)}{3c\gamma/2+j\omega} +$$

$$+ \frac{5(\beta+6)(\beta+7)}{5c\gamma/2+j\omega} - \frac{5(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)/3}{7c\gamma/2+j\omega} +$$

$$+ \frac{5(\beta+9)!}{24(\beta+5)!(9c\gamma/2+j\omega)} - \frac{(\beta+10)!}{120(\beta+5)!(11c\gamma/2+j\omega)}.$$



a)



б)

Рис. 6.13. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 1, c = 2, \alpha = 0, \beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [1; 3, 5], c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$

6.2 Преобразование Фурье ортогональных фильтров

$$[6.36] \quad V_k^{[1]\{L_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma}{j\omega + \gamma/2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s.$$

$$[6.37] \quad V_k^{[2]\{L_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma}{j\omega + \gamma/2} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^k.$$

$$[6.38] \quad V_k^{[3]\{L_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = 2(-1)^k \cos \varphi \times \\ \times \exp(-j(2k+1)\varphi), \quad \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{L_0(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma}{j\omega + \gamma/2};$$

$$V_1^{\{L_1(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^2};$$

$$V_2^{\{L_2(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^3};$$

$$V_3^{\{L_3(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma(j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^4};$$

$$V_4^{\{L_4(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma(j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^5};$$

$$V_5^{\{L_5(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma(j\omega - \gamma/2)^5}{(j\omega + \gamma/2)^6}.$$




Рис. 6.14. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4$

$$[6.39] \quad V_k^{[1]\{L_k^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2}{(j\omega + \gamma/2)^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s.$$

$$[6.40] \quad V_k^{[2]\{L_k^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2}{(j\omega + \gamma/2)^2} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^k.$$

$$[6.41] \quad V_k^{[3]\{L_k^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = 4(-1)^k (\cos \varphi)^2 \times \\ \times \exp(-j(2k+2)\varphi), \quad \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{L_0^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2}{(j\omega + \gamma/2)^2};$$

$$V_1^{\{L_1^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^3};$$

$$V_2^{\{L_2^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^4};$$

$$V_3^{\{L_3^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2(j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^5};$$

$$V_4^{\{L_4^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2(j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^6};$$

$$V_5^{\{L_5^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^2(j\omega - \gamma/2)^5}{(j\omega + \gamma/2)^7}.$$




Рис. 6.15. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4$, $\alpha = 1$

$$[6.42] \quad V_k^{[1]\{L_k^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \\ = \frac{\gamma^3}{(j\omega + \gamma/2)^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s.$$

$$[6.43] \quad V_k^{[2]\{L_k^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^3}{(j\omega + \gamma/2)^3} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^k.$$

$$[6.44] \quad V_k^{[3]\{L_k^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = 8(-1)^k (\cos \varphi)^3 \times \\ \times \exp(-j(2k+3)\varphi), \quad \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{L_0^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^3}{(j\omega + \gamma/2)^3};$$

$$V_1^{\{L_1^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^3(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^4};$$

$$V_2^{\{L_2^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^3(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^5};$$

$$V_3^{\{L_3^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^3(j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^6};$$

$$V_4^{\{L_4^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^3(j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^7};$$

$$V_5^{\{L_5^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^3(j\omega - \gamma/2)^5}{(j\omega + \gamma/2)^8}.$$




Рис. 6.16. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4$, $\alpha = 2$

$$[6.45] \quad V_k^{[1]\{L_k^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \\ = \frac{\gamma^{\alpha+1}}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+1}} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s.$$

$$[6.46] \quad V_k^{[2]\{L_k^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \\ = \left(\frac{\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^{\alpha+1} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^k.$$

$$[6.47] \quad V_k^{[3]\{L_k^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = (-1)^k (2 \cos \varphi)^{\alpha+1} \times \\ \times \exp(-j(2k+\alpha+1)\varphi), \quad \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{L_0^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^{\alpha+1}}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+1}};$$

$$V_1^{\{L_1^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^{\alpha+1}(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+2}};$$

$$V_2^{\{L_2^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^{\alpha+1}(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+3}};$$

$$V_3^{\{L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^{\alpha+1} (j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+4}};$$

$$V_4^{\{L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^{\alpha+1} (j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+5}};$$

$$V_5^{\{L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma^{\alpha+1} (j\omega - \gamma/2)^5}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+6}}.$$





Рис. 6.17. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 4$, $\alpha \in [0; 4]$; б) $\gamma \in [1; 4]$, $\alpha = 1$

$$\begin{aligned} [6.48] \quad V_k^{[1]\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= (4k+1)\gamma \times \\ &\times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+1)\gamma/2+j\omega}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.49] \quad V_k^{[2]\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} \frac{\gamma}{\gamma/2+j\omega}, & \text{если } k=0; \\ \frac{(4k+1)\gamma/2+j\omega}{\prod_{s=0}^{k-1} \frac{(4s+1)\gamma/2-j\omega}{(4s+1)\gamma/2+j\omega}}, & \text{если } k>0. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.50] \quad V_k^{[3]\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} 2 \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k=0; \\ 2 \cos \varphi_k \times \\ \exp \left(-j \left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right), & \text{если } k>0, \end{cases} \\ &\varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(4k+1)\gamma}. \end{aligned}$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{\gamma}{\gamma/2+j\omega};$$

$$V_1^{\{P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{5\gamma(\gamma/2-j\omega)}{(\gamma/2+j\omega)(5\gamma/2+j\omega)};$$

$$\begin{aligned} V_2^{\{P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \frac{9\gamma(\gamma/2-j\omega)(5\gamma/2-j\omega)}{(\gamma/2+j\omega)(5\gamma/2+j\omega)(9\gamma/2+j\omega)}; \\ V_3^{\{P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \frac{13\gamma}{(13\gamma/2+j\omega)} \frac{(\gamma/2-j\omega)}{(\gamma/2+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(5\gamma/2-j\omega)(9\gamma/2-j\omega)}{(5\gamma/2+j\omega)(9\gamma/2+j\omega)}; \\ V_4^{\{P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \frac{17\gamma}{(17\gamma/2+j\omega)} \frac{(\gamma/2-j\omega)}{(\gamma/2+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(5\gamma/2-j\omega)(9\gamma/2-j\omega)}{(5\gamma/2+j\omega)(9\gamma/2+j\omega)} \frac{(13\gamma/2-j\omega)}{(13\gamma/2+j\omega)}; \\ V_5^{\{P_5^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \frac{21\gamma}{(21\gamma/2+j\omega)} \frac{(\gamma/2-j\omega)}{(\gamma/2+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(5\gamma/2-j\omega)(9\gamma/2-j\omega)}{(5\gamma/2+j\omega)(9\gamma/2+j\omega)} \frac{(13\gamma/2-j\omega)(17\gamma/2-j\omega)}{(13\gamma/2+j\omega)(17\gamma/2+j\omega)}. \end{aligned}$$




Рис. 6.18. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned} [6.51] \quad V_k^{[1]\{Leg_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= 2(2k+1)\gamma \times \\ &\times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)\gamma + j\omega}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.52] \quad V_k^{[2]\{Leg_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} \frac{2\gamma}{\gamma + j\omega}, & \text{если } k = 0; \\ \frac{2(2k+1)\gamma}{(2k+1)\gamma + j\omega} \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+1)\gamma - j\omega}{(2s+1)\gamma + j\omega}, & \text{если } k > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.53] \quad V_k^{[3]\{Leg_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} 2 \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ 2 \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right), & \text{если } k > 0, \end{cases} \\ &\quad \varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}. \end{aligned}$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{Leg_0(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{2\gamma}{\gamma + j\omega};$$

$$V_1^{\{Leg_1(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{6\gamma(\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)};$$

$$V_2^{\{Leg_2(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{10\gamma(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)};$$

$$V_3^{\{Leg_3(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{14\gamma(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)(7\gamma + j\omega)};$$

$$V_4^{\{Leg_4(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{18\gamma}{(9\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \times \\ \times \frac{(7\gamma - j\omega)}{(7\gamma + j\omega)};$$

$$V_5^{\{Leg_5(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{22\gamma}{(11\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)} \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \times$$




Рис. 6.19. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$

$$\begin{aligned} [6.54] \quad V_k^{[1]\{P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= (4k+3)\gamma \times \\ &\times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+3)\gamma/2 + j\omega}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.55] \quad V_k^{[2]\{P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} \frac{3\gamma}{3\gamma/2 + j\omega}, & \text{если } k = 0; \\ \frac{(4k+3)\gamma}{(4k+3)\gamma/2 + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(4s+3)\gamma/2 - j\omega}{(4s+3)\gamma/2 + j\omega}, & \text{если } k > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.56] \quad V_k^{[3]\{P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} 2 \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ 2 \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right), & \text{если } k > 0, \end{cases} \\ &\quad \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(4k+3)\gamma}. \end{aligned}$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{P_0^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{3\gamma}{3\gamma/2 + j\omega};$$

$$V_1^{\{P_1^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{7\gamma(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)(7\gamma/2 + j\omega)};$$

$$V_2^{\{P_2^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{11\gamma(3\gamma/2 - j\omega)(7\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)};$$

$$V_3^{\{P_3^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{15\gamma}{(15\gamma/2 + j\omega)} \frac{(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)} \times$$

$$\begin{aligned} & \times \frac{(7\gamma/2 - j\omega)(11\gamma/2 - j\omega)}{(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)}; \\ V_4^{\{P_4^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{19\gamma}{(19\gamma/2 + j\omega)} \frac{(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)} \times \\ & \times \frac{(7\gamma/2 - j\omega)(11\gamma/2 - j\omega)}{(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)} \frac{(15\gamma/2 - j\omega)}{(15\gamma/2 + j\omega)}; \\ V_5^{\{P_5^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{23\gamma}{(23\gamma/2 + j\omega)} \frac{(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)} \times \\ & \times \frac{(7\gamma/2 - j\omega)(11\gamma/2 - j\omega)}{(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)} \frac{(15\gamma/2 - j\omega)}{(15\gamma/2 + j\omega)} \frac{(19\gamma/2 - j\omega)}{(19\gamma/2 + j\omega)}. \end{aligned}$$




Рис. 6.20. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned} [6.57] \quad V_k^{[1]\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= 2(k+1)\gamma \times \\ & \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \frac{1}{(s+1)\gamma + j\omega}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.58] \quad V_k^{[2]\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} \frac{2\gamma}{\gamma + j\omega}, & \text{если } k = 0; \\ \frac{2(k+1)\gamma}{(k+1)\gamma + j\omega} \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(s+1)\gamma - j\omega}{(s+1)\gamma + j\omega}, & \text{если } k > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.59] \quad V_k^{[3]\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} 2 \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ 2 \cos \varphi_k \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right), & \text{если } k > 0, \end{cases} \\ & \varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(k+1)\gamma}. \end{aligned}$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{P_0^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{2\gamma}{\gamma + j\omega};$$

$$\begin{aligned} V_1^{\{P_1^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{4\gamma(\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)}; \\ V_2^{\{P_2^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{6\gamma(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)}; \\ V_3^{\{P_3^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{8\gamma(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)(4\gamma + j\omega)}; \\ V_4^{\{P_4^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{10\gamma}{(5\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} \times \\ & \times \frac{(4\gamma - j\omega)}{(4\gamma + j\omega)}; \\ V_5^{\{P_5^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{12\gamma}{(6\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} \times \\ & \times \frac{(4\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(4\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)}. \end{aligned}$$




Рис. 6.21. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned} [6.60] \quad V_k^{[1]\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= 2(2k+3)\gamma \times \\ & \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \frac{1}{(2s+3)\gamma + j\omega}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.61] \quad V_k^{[2]\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} \frac{6\gamma}{3\gamma + j\omega}, & \text{если } k = 0; \\ \frac{2(2k+3)\gamma}{(2k+3)\gamma + j\omega} \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+3)\gamma - j\omega}{(2s+3)\gamma + j\omega}, & \text{если } k > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.62] \quad V_k^{[3]\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} 2 \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ 2 \cos \varphi_k \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right), & \text{если } k > 0, \end{cases} \\ & \varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+3)\gamma}. \end{aligned}$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{P_0^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{6\gamma}{3\gamma + j\omega};$$

$$V_1^{\{P_1^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{10\gamma(3\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)};$$

$$V_2^{\{P_2^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{14\gamma(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)(7\gamma + j\omega)};$$

$$V_3^{\{P_3^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{18\gamma}{(9\gamma + j\omega)} \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \times \\ \times \frac{(7\gamma - j\omega)}{(7\gamma + j\omega)};$$

$$V_4^{\{P_4^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{22\gamma}{(11\gamma + j\omega)} \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \times \\ \times \frac{(7\gamma - j\omega)(9\gamma - j\omega)}{(7\gamma + j\omega)(9\gamma + j\omega)};$$

$$V_5^{\{P_5^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{26\gamma}{(13\gamma + j\omega)} \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \times \\ \times \frac{(7\gamma - j\omega)(9\gamma - j\omega)(11\gamma - j\omega)}{(7\gamma + j\omega)(9\gamma + j\omega)(11\gamma + j\omega)}.$$




Рис. 6.22. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$[6.63] \quad V_k^{[1]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = (2k + \alpha + 1)c\gamma \times \\ \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \frac{1}{(2s + \alpha + 1)c\gamma/2 + j\omega}.$$

$$[6.64] \quad V_k^{[2]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \\ = \begin{cases} \frac{(\alpha+1)c\gamma}{(\alpha+1)c\gamma/2+j\omega}, & \text{если } k=0; \\ \frac{(2k+\alpha+1)c\gamma}{(2k+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+\alpha+1)c\gamma/2-j\omega}{(2s+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega}, & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[6.65] \quad V_k^{[3]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \\ = \begin{cases} 2 \cos \varphi_0 \exp(-j\varphi_0), & \text{если } k=0; \\ 2 \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right), & \text{если } k>0, \end{cases} \\ \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(2k+\alpha+1)c\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{P_0^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\alpha+1)c\gamma}{(\alpha+1)c\gamma/2+j\omega};$$

$$V_1^{\{P_1^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\alpha+3)c\gamma((\alpha+1)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)};$$

$$V_2^{\{P_2^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\alpha+5)c\gamma}{((\alpha+5)c\gamma/2+j\omega)} \frac{((\alpha+1)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)} \times \\ \times \frac{((\alpha+3)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)};$$

$$V_3^{\{P_3^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\alpha+7)c\gamma}{((\alpha+7)c\gamma/2+j\omega)} \frac{((\alpha+1)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)} \times \\ \times \frac{((\alpha+3)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2+j\omega)};$$

$$V_4^{\{P_4^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\alpha+9)c\gamma}{((\alpha+9)c\gamma/2+j\omega)} \frac{((\alpha+1)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+7)c\gamma/2+j\omega)} \times \\ \times \frac{((\alpha+3)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2+j\omega)} \frac{((\alpha+7)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+7)c\gamma/2+j\omega)};$$

$$V_5^{\{P_5^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) = \frac{(\alpha+11)c\gamma}{((\alpha+11)c\gamma/2+j\omega)} \times \\ \times \frac{((\alpha+1)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2+j\omega)} \times \\ \times \frac{((\alpha+7)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+9)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+7)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+9)c\gamma/2+j\omega)}.$$




Рис. 6.23. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 1, c = 2, \alpha \in [0; 4], \beta = 0; 6$
 $\gamma \in [1; 3, 5], c = 2, \alpha = 1, \beta = 0$

$$[6.66] \quad V_k^{[1]\{P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{8\gamma^2(k+1)^2}{(2k+3)\gamma+j\omega} \times \\ \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)\gamma+j\omega}.$$

$$[6.67] \quad V_k^{[2]\{P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ = \begin{cases} \frac{8\gamma^2}{(\gamma+j\omega)(3\gamma+j\omega)}, & \text{если } k=0; \\ \frac{8(k+1)^2\gamma^2}{((2k+1)\gamma+j\omega)((2k+3)\gamma+j\omega)} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+1)\gamma-j\omega}{(2s+1)\gamma+j\omega}, & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[6.68] \quad V_k^{[3]\{P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ = \begin{cases} \frac{8(k+1)^2 \cos \varphi_0^{[0]} \cos \varphi_0^{[1]}}{(2k+1)\gamma} / 3 \times \\ \times \exp(-j(\varphi_0^{[0]} + \varphi_0^{[1]})), & \text{если } k=0; \\ \frac{8(k+1)^2 \cos \varphi_k^{[0]} \cos \varphi_k^{[1]}}{(2k+1)(2k+3)} \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k^{[0]} + \varphi_k^{[1]} + \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s^{[0]}\right)\right), & \text{если } k>0, \end{cases} \\ \varphi_k^{[0]} = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}; \quad \varphi_k^{[1]} = \arctan \frac{\omega}{(2k+3)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$V_0^{\{P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{8\gamma^2}{(\gamma+j\omega)(3\gamma+j\omega)};$$

$$V_1^{\{P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{32\gamma^2}{(3\gamma+j\omega)(5\gamma+j\omega)} \frac{(\gamma-j\omega)}{(\gamma+j\omega)};$$

$$V_2^{\{P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{72\gamma^2}{(5\gamma+j\omega)(7\gamma+j\omega)} \frac{(\gamma-j\omega)}{(\gamma+j\omega)} \frac{(3\gamma-j\omega)}{(3\gamma+j\omega)}; \\ V_3^{\{P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{128\gamma^2}{(7\gamma+j\omega)(9\gamma+j\omega)} \frac{(\gamma-j\omega)}{(\gamma+j\omega)} \times \\ \times \frac{(3\gamma-j\omega)(5\gamma-j\omega)}{(3\gamma+j\omega)(5\gamma+j\omega)}; \\ V_4^{\{P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{200\gamma^2}{(9\gamma+j\omega)(11\gamma+j\omega)} \frac{(\gamma-j\omega)}{(\gamma+j\omega)} \times \\ \times \frac{(3\gamma-j\omega)(5\gamma-j\omega)(7\gamma-j\omega)}{(3\gamma+j\omega)(5\gamma+j\omega)(7\gamma+j\omega)}; \\ V_5^{\{P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{288\gamma^2}{(11\gamma+j\omega)(13\gamma+j\omega)} \frac{(\gamma-j\omega)}{(\gamma+j\omega)} \times \\ \times \frac{(3\gamma-j\omega)(5\gamma-j\omega)(7\gamma-j\omega)(9\gamma-j\omega)}{(3\gamma+j\omega)(5\gamma+j\omega)(7\gamma+j\omega)(9\gamma+j\omega)}.$$




Рис. 6.24. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1, c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$

$$\begin{aligned} [6.69] \quad V_k^{[1]\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \frac{8(2k+3)(k+1)(k+2)\gamma^3}{((2k+3)\gamma+j\omega)((2k+5)\gamma+j\omega)} \times \\ &\quad \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)\gamma+j\omega}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.70] \quad V_k^{[2]\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} \frac{48\gamma^3}{(\gamma+j\omega)(3\gamma+j\omega)(5\gamma+j\omega)}, & \text{если } k=0; \\ \frac{8(2k+3)\gamma^3}{((2k+1)\gamma+j\omega)((2k+3)\gamma+j\omega)} \times \\ \quad \times \frac{(k+1)(k+2)}{((2k+5)\gamma+j\omega)} \times \\ \quad \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+1)\gamma-j\omega}{(2s+1)\gamma+j\omega}, & \text{если } k>0. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.71] \quad V_k^{[3]\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} 16 \cos \varphi_0^{[0]} \cos \varphi_0^{[1]} \cos \varphi_0^{[2]} / 5 \times \\ \quad \times \exp(-j(\varphi_0^{[0]} + \varphi_0^{[1]} + \varphi_0^{[2]})), & \text{если } k=0; \\ \frac{8(k+1)(k+2) \cos \varphi_k^{[0]} \cos \varphi_k^{[1]}}{(2k+1)(2k+5)} \times \\ \quad \times \cos \varphi_k^{[2]} \exp \left(-j \left(\varphi_k^{[0]} + \varphi_k^{[1]} + \right. \right. \\ \quad \left. \left. + \varphi_k^{[2]} + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s^{[0]} \right) \right), & \text{если } k>0, \end{cases} \\ &\varphi_k^{[0]} = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}; \quad \varphi_k^{[1]} = \arctan \frac{\omega}{(2k+3)\gamma}; \\ &\varphi_k^{[2]} = \arctan \frac{\omega}{(2k+5)\gamma}. \end{aligned}$$

Частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} V_0^{\{P_0^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{48\gamma^3}{(\gamma+j\omega)(3\gamma+j\omega)(5\gamma+j\omega)}; \\ V_1^{\{P_1^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{240\gamma^3}{(3\gamma+j\omega)(5\gamma+j\omega)(7\gamma+j\omega)} \frac{(\gamma-j\omega)}{(\gamma+j\omega)}; \\ V_2^{\{P_2^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{672\gamma^3}{(5\gamma+j\omega)(7\gamma+j\omega)(9\gamma+j\omega)} \frac{(\gamma-j\omega)}{(\gamma+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(3\gamma-j\omega)}{(3\gamma+j\omega)}; \\ V_3^{\{P_3^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{1440\gamma^3}{(7\gamma+j\omega)(9\gamma+j\omega)(11\gamma+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(\gamma-j\omega)(3\gamma-j\omega)(5\gamma-j\omega)}{(\gamma+j\omega)(3\gamma+j\omega)(5\gamma+j\omega)}; \\ V_4^{\{P_4^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{2640\gamma^3}{(9\gamma+j\omega)(11\gamma+j\omega)(13\gamma+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(\gamma-j\omega)(3\gamma-j\omega)(5\gamma-j\omega)(7\gamma-j\omega)}{(\gamma+j\omega)(3\gamma+j\omega)(5\gamma+j\omega)(7\gamma+j\omega)}; \\ V_5^{\{P_5^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{4368\gamma^3}{(11\gamma+j\omega)(13\gamma+j\omega)(15\gamma+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(\gamma-j\omega)(3\gamma-j\omega)(5\gamma-j\omega)(7\gamma-j\omega)(9\gamma-j\omega)}{(\gamma+j\omega)(3\gamma+j\omega)(5\gamma+j\omega)(7\gamma+j\omega)(9\gamma+j\omega)}. \end{aligned}$$




Рис. 6.25. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$

$$\begin{aligned} [6.72] \quad V_k^{[1]\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \frac{(c\gamma)^{\beta+1}(2k+\beta+1)(k+\beta)!}{k! \prod_{p=1}^{\beta} ((2k+2p+1)c\gamma/2+j\omega)} \times \\ &\quad \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)c\gamma/2+j\omega}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.73] \quad V_k^{[2]\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} \frac{(c\gamma)^{\beta+1}(\beta+1)!}{\prod_{p=0}^{\beta} ((2p+1)c\gamma/2+j\omega)}, & \text{если } k=0; \\ \frac{(c\gamma)^{\beta+1}(2k+\beta+1)(k+\beta)!}{k! \prod_{p=0}^{\beta} ((2k+2p+1)c\gamma/2+j\omega)} \times \\ \quad \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+1)c\gamma/2-j\omega}{(2s+1)c\gamma/2+j\omega}, & \text{если } k>0. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.74] \quad V_k^{[3]\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \\ &= \begin{cases} 2^{\beta+1}(\beta+1)! \prod_{p=0}^{\beta} \frac{\cos \varphi_0^{[p]}}{2p+1} \times \\ \quad \times \exp \left(-j \sum_{p=0}^{\beta} \varphi_0^{[p]} \right), & \text{если } k=0; \\ 2^{\beta+1}(2k+\beta+1)(k+\beta)!/k! \times \\ \quad \times \prod_{p=0}^{\beta} \frac{\cos \varphi_k^{[p]}}{2k+2p+1} \times \\ \quad \times \exp \left(-j \left(\sum_{p=0}^{\beta} \varphi_k^{[p]} + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s^{[0]} \right) \right), & \text{если } k>0, \end{cases} \\ &\varphi_k^{[p]} = \arctan \frac{2\omega}{(2k+2p+1)c\gamma}; \quad \beta \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

частные случаи для преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} V_0^{\{P_0^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{(c\gamma)^{\beta+1}(\beta+1)!}{\prod_{p=0}^{\beta}((2p+1)c\gamma/2+j\omega)}; \\ V_1^{\{P_1^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{(c\gamma)^{\beta+1}(\beta+3)(\beta+1)!}{\prod_{p=0}^{\beta}((2p+3)c\gamma/2+j\omega)} \frac{(c\gamma/2-j\omega)}{(c\gamma/2+j\omega)}; \\ V_2^{\{P_2^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{(c\gamma)^{\beta+1}(\beta+5)(\beta+2)!}{2 \prod_{p=0}^{\beta}((2p+5)c\gamma/2+j\omega)} \frac{(c\gamma/2-j\omega)}{(c\gamma/2+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(3c\gamma/2-j\omega)}{(3c\gamma/2+j\omega)}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3^{\{P_3^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{(c\gamma)^{\beta+1}(\beta+7)(\beta+3)!}{6 \prod_{p=0}^{\beta}((2p+7)c\gamma/2+j\omega)} \frac{(c\gamma/2-j\omega)}{(c\gamma/2+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(3c\gamma/2-j\omega)(5c\gamma/2-j\omega)}{(3c\gamma/2+j\omega)(5c\gamma/2+j\omega)}; \\ V_4^{\{P_4^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{(c\gamma)^{\beta+1}(\beta+9)(\beta+4)!}{24 \prod_{p=0}^{\beta}((2p+9)c\gamma/2+j\omega)} \frac{(c\gamma/2-j\omega)}{(c\gamma/2+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(3c\gamma/2-j\omega)(5c\gamma/2-j\omega)(7c\gamma/2-j\omega)}{(3c\gamma/2+j\omega)(5c\gamma/2+j\omega)(7c\gamma/2+j\omega)}; \\ V_5^{\{P_5^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) &= \frac{(c\gamma)^{\beta+1}(\beta+11)(\beta+5)!}{120 \prod_{p=0}^{\beta}((2p+11)c\gamma/2+j\omega)} \frac{(c\gamma/2-j\omega)}{(c\gamma/2+j\omega)} \times \\ &\times \frac{(3c\gamma/2-j\omega)(5c\gamma/2-j\omega)(7c\gamma/2-j\omega)(9c\gamma/2-j\omega)}{(3c\gamma/2+j\omega)(5c\gamma/2+j\omega)(7c\gamma/2+j\omega)(9c\gamma/2+j\omega)}. \end{aligned}$$




Рис. 6.26. Вид преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [1; 3; 5]$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

6.3 Преобразование Фурье производных ортогональных функций

$$\begin{aligned} [6.75] \quad W_k^{[1]\left\{\frac{\partial L_k(\tau,\gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) &= \\ &= \frac{j\omega}{j\omega + \gamma/2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2}\right)^s - 1. \end{aligned}$$

$$[6.76] \quad W_k^{[2]\left\{\frac{\partial L_k(\tau,\gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \gamma/2} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2}\right)^k - 1.$$

$$\begin{aligned} [6.77] \quad W_k^{[3]\left\{\frac{\partial L_k(\tau,\gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) &= (-1)^k j \sin \varphi \times \\ &\times \exp(-j(2k+1)\varphi) - 1, \quad \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}. \end{aligned}$$

частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\left\{\frac{\partial L_0(\tau,\gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = -\frac{\gamma/2}{j\omega + \gamma/2};$$

$$W_1^{\left\{\frac{\partial L_1(\tau,\gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^2} - 1;$$

$$W_2^{\left\{\frac{\partial L_2(\tau,\gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^3} - 1;$$

$$W_3^{\left\{\frac{\partial L_3(\tau,\gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega(j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^4} - 1;$$

$$W_4^{\left\{\frac{\partial L_4(\tau,\gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega(j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^5} - 1;$$

$$W_5^{\left\{\frac{\partial L_5(\tau,\gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega(j\omega - \gamma/2)^5}{(j\omega + \gamma/2)^6} - 1.$$




Рис. 6.27. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1$




Рис. 6.28. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1, \alpha = 1$

$$[6.78] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \gamma/2} \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s - (k+1).$$

$$[6.79] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma} \left(1 - \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^{k+1} \right) - (k+1).$$

$$[6.80] \quad W_k^{[3]} \left\{ \frac{\partial L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j \tan(\varphi)}{2} \times \\ \times \left(1 + (-1)^k \exp(-j(2k+2)\varphi) \right) - (k+1), \quad \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0 \left\{ \frac{\partial L_0^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = -\frac{\gamma/2}{j\omega + \gamma/2};$$

$$W_1 \left\{ \frac{\partial L_1^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = -\frac{2\omega^2}{(j\omega + \gamma/2)^2} - 2;$$

$$W_2 \left\{ \frac{\partial L_2^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma^2/4 - 3\omega^2)}{(j\omega + \gamma/2)^3} - 3;$$

$$W_3 \left\{ \frac{\partial L_3^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma^2 j\omega - 4j\omega^3)}{(j\omega + \gamma/2)^4} - 4;$$

$$W_4 \left\{ \frac{\partial L_4^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma^4/16 - 5\gamma^2\omega^2/2 + 5\omega^4)}{(j\omega + \gamma/2)^5} - 5;$$

$$W_5 \left\{ \frac{\partial L_5^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(3\gamma^4 j\omega/8 - 5\gamma^2 j\omega^3 + 6j\omega^4)}{(j\omega + \gamma/2)^6} - 6.$$

$$[6.81] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \gamma/2} \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s - \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

$$[6.82] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma^2} \times \\ \times \left[\left(\left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^{k+1} - 1 \right) (j\omega - \gamma/2) + \gamma(k+1) \right] - \\ - \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

$$[6.83] \quad W_k^{[3]} \left\{ \frac{\partial L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j \tan(\varphi)}{2} \times \\ \times \left(\frac{(-1)^k \exp(-j(2k+3)\varphi) - \exp(-j\varphi)}{2 \cos \varphi} + k+1 \right) - \\ - \frac{(k+1)(k+2)}{2}, \quad \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0 \left\{ \frac{\partial L_0^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = -\frac{\gamma/2}{j\omega + \gamma/2};$$

$$W_1 \left\{ \frac{\partial L_1^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma/2 + 3j\omega)}{(j\omega + \gamma/2)^2} - 3;$$

$$W_2 \left\{ \frac{\partial L_2^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma^2/2 + 2\gamma j\omega - 6\omega^2)}{(j\omega + \gamma/2)^3} - 6;$$

$$W_3 \left\{ \frac{\partial L_3^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma^3/4 + 5\gamma^2 j\omega/2 - 5\gamma\omega^2 - 10j\omega^3)}{(j\omega + \gamma/2)^4} - \\ - 10;$$

$$W_4 \left\{ \frac{\partial L_4^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega + \gamma/2)^5} (3\gamma^4/16 + 3\gamma^3 j\omega/2 - 15\gamma^2 \omega^2/2 - 10\gamma j\omega^3 + 15\omega^4) - 15;$$

$$W_5 \left\{ \frac{\partial L_5^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega + \gamma/2)^6} (3\gamma^5/32 + 21\gamma^4 j\omega/16 - 21\gamma^3 \omega^2/4 - 35\gamma^2 j\omega^3/2 + 35\gamma j\omega^4/2 + 21j\omega^5) - 21.$$




Рис. 6.29. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 1, \alpha = 2$

$$[6.84] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \gamma/2} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s - \binom{k+\alpha}{k}.$$




Рис. 6.30. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 1, \alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [1; 5], \alpha = 1$

$$[6.85] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega \left(j\omega - \gamma/2 \right)^{\alpha-1}}{(-\gamma)^\alpha} \left[\left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^{k+\alpha} - \sum_{p=0}^{\alpha-1} \binom{k+\alpha}{p} \left(-\frac{\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^p \right] - \binom{k+\alpha}{k}, \quad \alpha \in \mathbb{Z}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0 \left\{ \frac{\partial L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = -\frac{\gamma/2}{j\omega + \gamma/2};$$


$$W_1 \left\{ \frac{\partial L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega (\gamma(\alpha-1)/2 + j\omega(\alpha+1))}{(j\omega + \gamma/2)^2} - \alpha - 1;$$

$$W_2 \left\{ \frac{\partial L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega + \gamma/2)^3} (\gamma^2(\alpha^2 + \alpha - 2)/8 + \gamma j\omega(\alpha^2 - \alpha + 2)/2 - \omega^2(\alpha^2 + 3\alpha + 2)/2) - (\alpha + 1)(\alpha + 2)/2;$$

$$W_3 \left\{ \frac{\partial L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega + \gamma/2)^4} (-\gamma^3 + \gamma^2(j\omega + \gamma/2)(\alpha + 3) - \gamma(j\omega + \gamma/2)^2(\alpha + 2)(\alpha + 3)/2 - (j\omega + \gamma/2)^3(\alpha + 3)/(6\alpha!)) - (\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha + 3)/6;$$

$$W_4 \left\{ \frac{\partial L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega + \gamma/2)^5} (\gamma^4 - \gamma^3(j\omega + \gamma/2)(\alpha + 4) + \gamma^2(j\omega + \gamma/2)^2(\alpha + 3)(\alpha + 4)/2 - \gamma(j\omega + \gamma/2)^3(\alpha + 4)!/(6(\alpha + 1)! + (j\omega + \gamma/2)^4(\alpha + 4)!/(24\alpha!)) - (\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha + 3) \times (\alpha + 4)/24;$$

$$W_5 \left\{ \frac{\partial L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega + \gamma/2)^6} (-\gamma^5 + \gamma^4(j\omega + \gamma/2)(\alpha + 5) - \gamma^3(j\omega + \gamma/2)^2(\alpha + 4)(\alpha + 5)/2 + \gamma^2(j\omega + \gamma/2)^3(\alpha + 5)!/(6(\alpha + 2)! - \gamma(j\omega + \gamma/2)^4(\alpha + 5)!/(24(\alpha + 1)! + (j\omega + \gamma/2)^5 \times (\alpha + 5)!/(120\alpha!)) - (\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha + 3)(\alpha + 4)(\alpha + 5)/120).$$



$$[6.86] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = j\omega \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \\ \times \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+1)\gamma/2 + j\omega} - (-1)^k.$$

$$[6.87] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \\ = \begin{cases} \frac{j\omega}{\gamma/2 + j\omega} - 1, & \text{если } k = 0; \\ \frac{j\omega}{(4k+1)\gamma/2 + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(4s+1)\gamma/2 - j\omega}{(4s+1)\gamma/2 + j\omega} - (-1)^k, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.88] \quad W_k^{[3]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \\ = \begin{cases} j \sin \varphi_0 \exp(-j\varphi_0) - 1, & \text{если } k = 0; \\ j \sin \varphi_k \exp \left(-j \left(\varphi_k + \right. \right. \\ \left. \left. + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) - (-1)^k, & \text{если } k > 0, \end{cases} \\ \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(4k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0 \left\{ \frac{\partial P_0^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = -\frac{\gamma/2}{\gamma/2 + j\omega};$$

$$W_1 \left\{ \frac{\partial P_1^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma/2 - j\omega)}{(\gamma/2 + j\omega)(5\gamma/2 + j\omega)} + 1;$$

$$W_2 \left\{ \frac{\partial P_2^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma/2 - j\omega)(5\gamma/2 - j\omega)}{(\gamma/2 + j\omega)(5\gamma/2 + j\omega)(9\gamma/2 + j\omega)} - 1;$$

$$W_3 \left\{ \frac{\partial P_3^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(13\gamma/2 + j\omega)} \frac{(\gamma/2 - j\omega)}{(\gamma/2 + j\omega)} \times \\ \times \frac{(5\gamma/2 - j\omega)(9\gamma/2 - j\omega)}{(5\gamma/2 + j\omega)(9\gamma/2 + j\omega)} + 1;$$

$$W_4 \left\{ \frac{\partial P_4^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(17\gamma/2 + j\omega)} \frac{(\gamma/2 - j\omega)}{(\gamma/2 + j\omega)} \times \\ \times \frac{(5\gamma/2 - j\omega)(9\gamma/2 - j\omega)}{(5\gamma/2 + j\omega)(9\gamma/2 + j\omega)} \frac{(13\gamma/2 - j\omega)}{(13\gamma/2 + j\omega)} - 1;$$

$$W_5 \left\{ \frac{\partial P_5^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(21\gamma/2 + j\omega)} \frac{(\gamma/2 - j\omega)}{(\gamma/2 + j\omega)} \times \\ \times \frac{(5\gamma/2 - j\omega)(9\gamma/2 - j\omega)}{(5\gamma/2 + j\omega)(9\gamma/2 + j\omega)} \frac{(13\gamma/2 - j\omega)(17\gamma/2 - j\omega)}{(13\gamma/2 + j\omega)(17\gamma/2 + j\omega)} + 1.$$




Рис. 6.31. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0,25$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$[6.89] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial \text{Leg}_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \\ = j\omega \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)\gamma + j\omega} - (-1)^k.$$

$$[6.90] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial \text{Leg}_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \\ = \begin{cases} \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - 1, & \text{если } k = 0; \\ \frac{j\omega}{(2k+1)\gamma + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+1)\gamma - j\omega}{(2s+1)\gamma + j\omega} - (-1)^k, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.91] \quad W_k^{[3]} \left\{ \frac{\partial \text{Leg}_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \\ = \begin{cases} j \sin \varphi_0 \exp(-j\varphi_0) - 1, & \text{если } k = 0; \\ j \sin \varphi_k \exp \left(-j \left(\varphi_k + \right. \right. \\ \left. \left. + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) - (-1)^k, & \text{если } k > 0, \end{cases} \\ \varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0 \left\{ \frac{\partial \text{Leg}_0(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = -\frac{\gamma}{\gamma + j\omega};$$

$$W_1 \left\{ \frac{\partial \text{Leg}_1(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} + 1;$$

$$W_2 \left\{ \frac{\partial \text{Leg}_2(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} - 1;$$

$$W_3 \left\{ \frac{\partial \text{Leg}_3(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)(7\gamma + j\omega)} + 1;$$

$$W_4 \left\{ \frac{\partial \text{Leg}_4(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(9\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} \times \\ \times \frac{(5\gamma - j\omega)(7\gamma - j\omega)}{(5\gamma + j\omega)(7\gamma + j\omega)} - 1; \\ W_5 \left\{ \frac{\partial \text{Leg}_5(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(11\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} \times \\ \times \frac{(5\gamma - j\omega)(7\gamma - j\omega)(9\gamma - j\omega)}{(5\gamma + j\omega)(7\gamma + j\omega)(9\gamma + j\omega)} + 1.$$




Рис. 6.32. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$

$$[6.92] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = j\omega \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \\ \times \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+3)\gamma/2 + j\omega} - (-1)^k.$$

$$[6.93] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \\ = \begin{cases} \frac{j\omega}{3\gamma/2 + j\omega} - 1, & \text{если } k = 0; \\ \frac{j\omega}{(4k+3)\gamma/2 + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(4s+3)\gamma/2 - j\omega}{(4s+3)\gamma/2 + j\omega} - (-1)^k, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.94] \quad W_k^{[3]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \\ = \begin{cases} j \sin \varphi_0 \exp(-j\varphi_0) - 1, & \text{если } k = 0; \\ j \sin \varphi_k \exp \left(-j \left(\varphi_k + \right. \right. \\ \left. \left. + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) - (-1)^k, & \text{если } k > 0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(4k+3)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0 \left\{ \frac{\partial P_0^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = -\frac{3\gamma/2}{3\gamma/2 + j\omega}; \\ W_1 \left\{ \frac{\partial P_1^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)(7\gamma/2 + j\omega)} + 1; \\ W_2 \left\{ \frac{\partial P_2^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(3\gamma/2 - j\omega)(7\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)(7\gamma/2 + j\omega)} \times \\ \times \frac{1}{(11\gamma/2 + j\omega)} - 1; \\ W_3 \left\{ \frac{\partial P_3^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(15\gamma/2 + j\omega)} \frac{(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)} \times \\ \times \frac{(7\gamma/2 - j\omega)(11\gamma/2 - j\omega)}{(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)} + 1; \\ W_4 \left\{ \frac{\partial P_4^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(19\gamma/2 + j\omega)} \frac{(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)} \times \\ \times \frac{(7\gamma/2 - j\omega)(11\gamma/2 - j\omega)}{(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)} \frac{(15\gamma/2 - j\omega)}{(15\gamma/2 + j\omega)} - 1; \\ W_5 \left\{ \frac{\partial P_5^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(23\gamma/2 + j\omega)} \frac{(3\gamma/2 - j\omega)}{(3\gamma/2 + j\omega)} \times \\ \times \frac{(7\gamma/2 - j\omega)(11\gamma/2 - j\omega)}{(7\gamma/2 + j\omega)(11\gamma/2 + j\omega)} \frac{(15\gamma/2 - j\omega)(19\gamma/2 - j\omega)}{(15\gamma/2 + j\omega)(19\gamma/2 + j\omega)} + 1.$$




Рис. 6.33. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$[6.95] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(1, 0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \\ = j\omega \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \frac{1}{(s+1)\gamma + j\omega} - (-1)^k.$$

$$[6.96] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) =$$

$$= \begin{cases} \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - 1, & \text{если } k = 0; \\ \frac{j\omega}{(k+1)\gamma + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(s+1)\gamma - j\omega}{(s+1)\gamma + j\omega} - (-1)^k, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.97] \quad W_k^{[3]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) =$$

$$= \begin{cases} j \sin \varphi_0 \exp(-j\varphi_0) - 1, & \text{если } k = 0; \\ j \sin \varphi_k \exp \left(-j \left(\varphi_k + \right. \right. \\ \left. \left. + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) - (-1)^k, & \text{если } k > 0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0 \left\{ \frac{\partial P_0^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = -\frac{\gamma}{\gamma + j\omega};$$

$$W_1 \left\{ \frac{\partial P_1^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)} + 1;$$

$$W_2 \left\{ \frac{\partial P_2^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} - 1;$$

$$W_3 \left\{ \frac{\partial P_3^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)(4\gamma + j\omega)} +$$

$$+ 1;$$

$$W_4 \left\{ \frac{\partial P_4^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(5\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(\gamma + j\omega)(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} \times$$

$$\times \frac{(4\gamma - j\omega)}{(4\gamma + j\omega)} - 1;$$

$$W_5 \left\{ \frac{\partial P_5^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{(6\gamma + j\omega)} \frac{(\gamma - j\omega)(2\gamma - j\omega)(3\gamma - j\omega)}{(2\gamma + j\omega)(3\gamma + j\omega)} \times$$

$$\times \frac{(4\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(4\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} + 1.$$




Рис. 6.34. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0,25$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[6.98] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) =$$

$$= j\omega \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \frac{1}{(2s+3)\gamma + j\omega} - (-1)^k.$$

$$[6.99] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) =$$

$$= \begin{cases} \frac{j\omega}{3\gamma + j\omega} - 1, & \text{если } k = 0; \\ \frac{j\omega}{(2k+3)\gamma + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+3)\gamma - j\omega}{(2s+3)\gamma + j\omega} - (-1)^k, & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.100] \quad W_k^{[3]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) =$$

$$= \begin{cases} j \sin \varphi_0 \exp(-j\varphi_0) - 1, & \text{если } k = 0; \\ j \sin \varphi_k \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + \right. \right. \\ \left. \left. + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) - (-1)^k, & \text{если } k > 0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+3)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0 \left\{ \frac{\partial P_0^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = -\frac{3\gamma}{3\gamma + j\omega};$$

$$W_1 \left\{ \frac{\partial P_1^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega(3\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} + 1;$$

$$\begin{aligned}
W_2^{\left\{ \frac{\partial P_2^{(2,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) &= \frac{j\omega(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)(7\gamma + j\omega)} - 1; \\
W_3^{\left\{ \frac{\partial P_3^{(2,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) &= \frac{j\omega}{(9\gamma + j\omega)} \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \frac{(7\gamma - j\omega)}{(7\gamma + j\omega)} + \\
&+ 1; \\
W_4^{\left\{ \frac{\partial P_4^{(2,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) &= \frac{j\omega}{(11\gamma + j\omega)} \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \times \\
&\times \frac{(7\gamma - j\omega)(9\gamma - j\omega)}{(7\gamma + j\omega)(9\gamma + j\omega)} - 1; \\
W_5^{\left\{ \frac{\partial P_5^{(2,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) &= \frac{j\omega}{(13\gamma + j\omega)} \frac{(3\gamma - j\omega)(5\gamma - j\omega)}{(3\gamma + j\omega)(5\gamma + j\omega)} \times \\
&\times \frac{(7\gamma - j\omega)(9\gamma - j\omega)(11\gamma - j\omega)}{(7\gamma + j\omega)(9\gamma + j\omega)(11\gamma + j\omega)} + 1.
\end{aligned}$$




Рис. 6.35. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned}
[6.101] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}(j\omega) &= j\omega \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \\
&\times \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \frac{1}{(2s+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} - (-1)^k.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[6.102] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}(j\omega) &= \\
&= \begin{cases} \frac{j\omega}{(\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} - 1, & \text{если } k = 0; \\ \frac{j\omega}{(2k+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+\alpha+1)c\gamma/2-j\omega}{(2s+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} - (-1)^k, & \text{если } k > 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[6.103] \quad W_k^{[3]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}(j\omega) &= \\
&= \begin{cases} j \sin \varphi_0 \exp(-j\varphi_0) - 1, & \text{если } k = 0; \\ j \sin \varphi_k \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + \right. \right. \\ \left. \left. + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) - (-1)^k, & \text{если } k > 0, \end{cases} \\
&\varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(2k+\alpha+1)c\gamma}.
\end{aligned}$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
W_0^{\left\{ \frac{\partial P_0^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) &= -\frac{(\alpha+1)c\gamma/2}{(\alpha+1)c\gamma/2+j\omega}; \\
W_1^{\left\{ \frac{\partial P_1^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) &= \frac{j\omega((\alpha+1)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)} \times \\
&\times \frac{1}{((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)} + 1; \\
W_2^{\left\{ \frac{\partial P_2^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) &= \frac{j\omega}{((\alpha+5)c\gamma/2+j\omega)} \times \\
&\times \frac{((\alpha+1)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)} - 1; \\
W_3^{\left\{ \frac{\partial P_3^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) &= \frac{j\omega}{((\alpha+7)c\gamma/2+j\omega)} \times \\
&\times \frac{((\alpha+1)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2+j\omega)} + 1; \\
W_4^{\left\{ \frac{\partial P_4^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) &= \frac{j\omega}{((\alpha+9)c\gamma/2+j\omega)} \times \\
&\times \frac{((\alpha+1)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2+j\omega)} \times \\
&\times \frac{((\alpha+7)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+7)c\gamma/2+j\omega)} - 1; \\
W_5^{\left\{ \frac{\partial P_5^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) &= \frac{j\omega}{((\alpha+11)c\gamma/2+j\omega)} \times \\
&\times \frac{((\alpha+1)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+3)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+5)c\gamma/2+j\omega)} \times \\
&\times \frac{((\alpha+7)c\gamma/2-j\omega)((\alpha+9)c\gamma/2-j\omega)}{((\alpha+7)c\gamma/2+j\omega)((\alpha+9)c\gamma/2+j\omega)} + 1.
\end{aligned}$$




Рис. 6.36. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha \in [0; 5]$, $\beta = 0$; б) $\gamma \in [0, 25; 2]$, $c = 2$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[6.104] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = j\omega \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \\ \times \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)\gamma + j\omega} - (-1)^k (k+1).$$

$$[6.105] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} \times \\ \times (-1)^s j \sin \varphi_s \exp(-j\varphi_s) - (-1)^k (k+1), \\ \varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0 \left\{ \frac{\partial P_0^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = -\frac{\gamma}{\gamma + j\omega};$$

$$W_1 \left\{ \frac{\partial P_1^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - \frac{3j\omega}{3\gamma + j\omega} + 2;$$

$$W_2 \left\{ \frac{\partial P_2^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - \frac{8j\omega}{3\gamma + j\omega} + \frac{10j\omega}{5\gamma + j\omega} - 3;$$

$$W_3 \left\{ \frac{\partial P_3^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - \frac{15j\omega}{3\gamma + j\omega} + \frac{45j\omega}{5\gamma + j\omega} - \frac{35j\omega}{7\gamma + j\omega} + 4;$$

$$W_4 \left\{ \frac{\partial P_4^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - \frac{24j\omega}{3\gamma + j\omega} + \frac{126j\omega}{5\gamma + j\omega} - \frac{224j\omega}{7\gamma + j\omega} + \frac{126j\omega}{9\gamma + j\omega} - 5;$$

$$W_5 \left\{ \frac{\partial P_5^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - \frac{35j\omega}{3\gamma + j\omega} + \frac{280j\omega}{5\gamma + j\omega} - \frac{840j\omega}{7\gamma + j\omega} + \frac{1050j\omega}{9\gamma + j\omega} - \frac{462j\omega}{11\gamma + j\omega} + 6.$$




Рис. 6.37. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$[6.106] \quad W_k^{[1]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = j\omega \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \\ \times \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)\gamma + j\omega} - \\ - (-1)^k \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

$$[6.107] \quad W_k^{[2]} \left\{ \frac{\partial P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\} (j\omega) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} \times \\ \times (-1)^s j \sin \varphi_s \exp(-j\varphi_s) - (-1)^k \frac{(k+1)(k+2)}{2}, \\ \varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье производных функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\{P_0^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = -\frac{\gamma}{\gamma + j\omega};$$

$$W_1^{\{P_1^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - \frac{4j\omega}{3\gamma + j\omega} + 3;$$

$$W_2^{\{P_2^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - \frac{10j\omega}{3\gamma + j\omega} + \frac{15j\omega}{5\gamma + j\omega} - 6;$$

$$W_3^{\{P_3^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - \frac{18j\omega}{3\gamma + j\omega} + \frac{63j\omega}{5\gamma + j\omega} - \frac{56j\omega}{7\gamma + j\omega} + 10;$$

$$W_4^{\{P_4^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - \frac{28j\omega}{3\gamma + j\omega} + \frac{168j\omega}{5\gamma + j\omega} - \frac{336j\omega}{7\gamma + j\omega} + \frac{210j\omega}{9\gamma + j\omega} - 15;$$

$$W_5^{\{P_5^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{\gamma + j\omega} - \frac{40j\omega}{3\gamma + j\omega} + \frac{360j\omega}{5\gamma + j\omega} - \frac{1200j\omega}{7\gamma + j\omega} + \frac{1650j\omega}{9\gamma + j\omega} - \frac{792j\omega}{11\gamma + j\omega} + 21.$$




Рис. 6.38. Вид преобразования Фурье производных ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$

$$[6.108] \quad W_k^{[1]\left\{\frac{\partial P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = j\omega \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \\ \times \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)c\gamma/2 + j\omega} - (-1)^k \binom{k+\beta}{k}.$$

$$[6.109] \quad W_k^{[2]\left\{\frac{\partial P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} \times \\ \times (-1)^s j \sin \varphi_s \exp(-j\varphi_s) - (-1)^k \binom{k+\beta}{k}, \\ \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(2k+1)c\gamma}.$$

Частные случаи для преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$W_0^{\left\{\frac{\partial P_0^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = -\frac{c\gamma/2}{c\gamma/2 + j\omega};$$

$$W_1^{\left\{\frac{\partial P_1^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{c\gamma/2 + j\omega} - \frac{j\omega(\beta+2)}{3c\gamma/2 + j\omega} + \beta + 1;$$

$$W_2^{\left\{\frac{\partial P_2^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{c\gamma/2 + j\omega} - \frac{2j\omega(\beta+3)}{3c\gamma/2 + j\omega} + \frac{j\omega(\beta+3)(\beta+4)/2}{5c\gamma/2 + j\omega} - (\beta+1)(\beta+2)/2;$$

$$W_3^{\left\{\frac{\partial P_3^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{c\gamma/2 + j\omega} - \frac{3j\omega(\beta+4)}{3c\gamma/2 + j\omega} + \frac{3j\omega(\beta+4)(\beta+5)/2}{5c\gamma/2 + j\omega} - \frac{j\omega(\beta+4)(\beta+5)(\beta+6)/6}{7c\gamma/2 + j\omega} + (\beta+1) \times$$

$$\times (\beta+2)(\beta+3)/6;$$

$$W_4^{\left\{\frac{\partial P_4^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{c\gamma/2 + j\omega} - \frac{4j\omega(\beta+5)}{3c\gamma/2 + j\omega} + \frac{3j\omega(\beta+5)(\beta+6)}{5c\gamma/2 + j\omega} - \frac{2j\omega(\beta+5)(\beta+6)(\beta+7)/3}{7c\gamma/2 + j\omega} +$$

$$+ \frac{j\omega(\beta+8)!}{24(\beta+4)!(9c\gamma/2 + j\omega)} - (\beta+1)(\beta+2)(\beta+3)(\beta+4)/24;$$

$$W_5^{\left\{\frac{\partial P_5^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) = \frac{j\omega}{c\gamma/2 + j\omega} - \frac{5j\omega(\beta+6)}{3c\gamma/2 + j\omega} + \frac{5j\omega(\beta+6)(\beta+7)}{5c\gamma/2 + j\omega} - \frac{5j\omega(\beta+6)(\beta+7)(\beta+8)/3}{7c\gamma/2 + j\omega} +$$

$$+ \frac{5j\omega(\beta+9)!}{24(\beta+5)!(9c\gamma/2 + j\omega)} - \frac{j\omega(\beta+10)!}{120(\beta+5)!(11c\gamma/2 + j\omega)} + (\beta+1) \times$$

$$\times (\beta+2)(\beta+3)(\beta+4)(\beta+5)/120.$$




Рис. 6.39. Вид преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 0, 25$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [0, 25; 2]$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

6.4 Производные преобразований Фурье ортогональных функций

$$[6.110] \quad \frac{\partial W_k^{[1]\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(j\omega + \gamma/2)^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2}\right)^s (s+1).$$

$$[6.111] \quad \frac{\partial W_k^{[2]\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j(j\omega - \gamma(2k+1)/2)}{(j\omega + \gamma/2)^3} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2}\right)^{k-1}.$$

$$[6.112] \quad \frac{\partial W_k^{[3]\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{4j}{\gamma^2} (-1)^k (\cos \varphi)^2 \times \\ \times \exp(-j(2k+1)\varphi) ((2k+1) \cos \varphi - j \sin \varphi), \\ \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial W_0^{\{L_0(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{\omega + j\gamma/2}{(j\omega - \gamma/2)(j\omega + \gamma/2)^2};$$

$$\frac{\partial W_1^{\{L_1(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{\omega + 3j\gamma/2}{(j\omega + \gamma/2)^3};$$

$$\frac{\partial W_2^{\{L_2(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{(\omega + 5j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^4};$$

$$\frac{\partial W_3^{\{L_3(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{(\omega + 7j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^5};$$

$$\frac{\partial W_4^{\{L_4(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{(\omega + 9j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^6}; \\ \frac{\partial W_5^{\{L_5(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{(\omega + 11j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^7}.$$




Рис. 6.40. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4$

$$[6.113] \quad \frac{\partial W_k^{[1]\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{1}{(j\omega + \gamma/2)^2} \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2}\right)^s.$$

$$[6.114] \quad \frac{\partial W_k^{[2]\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j(k+1)(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^3} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2} \right)^{k-1}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_0^{\{L_0^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(j\omega + \gamma/2)^2}; \\ \frac{\partial W_1^{\{L_1^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{2j(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^3}; \\ \frac{\partial W_2^{\{L_2^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{3j(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^4}; \\ \frac{\partial W_3^{\{L_3^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{4j(j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^5}; \\ \frac{\partial W_4^{\{L_4^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{5j(j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^6}; \\ \frac{\partial W_5^{\{L_5^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{6j(j\omega - \gamma/2)^5}{(j\omega + \gamma/2)^7}. \end{aligned}$$




Рис. 6.41. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков;
 $\gamma = 4, \alpha = 1$

$$[6.115] \quad \frac{\partial W_k^{\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{1}{(j\omega + \gamma/2)^2} \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial W_0^{\{L_0^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(j\omega + \gamma/2)^2};$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_1^{\{L_1^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j(3j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^3}; \\ \frac{\partial W_2^{\{L_2^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{2j(j\omega\gamma - \gamma^2/4 + 3\omega^2)}{(j\omega + \gamma/2)^4}; \\ \frac{\partial W_3^{\{L_3^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{2j}{(j\omega + \gamma/2)^5} (\gamma^3/8 - 10j\gamma^2\omega/8 - 20\gamma\omega^2/8 + \\ &+ 5j\omega^3); \\ \frac{\partial W_4^{\{L_4^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(j\omega + \gamma/2)^6} (\gamma^4/16 - 6j\gamma^3\omega/4 - 20\gamma^2 \times \\ &\times \omega^2 + 10j\gamma\omega^3 + 240\omega^4); \\ \frac{\partial W_5^{\{L_5^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{j}{(j\omega + \gamma/2)^7} (\gamma^5/32 - 21j\gamma^4\omega/4 - 21\gamma^3 \times \\ &\times \omega^2/4 + 35j\gamma^2\omega^3/2 + 35\gamma\omega^4/2 - 672j\omega^5). \end{aligned}$$




Рис. 6.42. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Сонина-Лагерра 0-5 порядков;
 $\gamma = 4, \alpha = 2$

$$[6.116] \quad \frac{\partial W_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{1}{(j\omega + \gamma/2)^2} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2} \right)^s.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial W_0^{\{L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(j\omega + \gamma/2)^2};$$

$$\frac{\partial W_1^{\{L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j(\alpha+1)}{(j\omega + \gamma/2)^2} + \frac{2j\gamma}{(j\omega + \gamma/2)^3};$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_2^{\{L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j(\alpha+1)(\alpha+2)}{2(j\omega + \gamma/2)^2} + \frac{2j\gamma(\alpha+2)}{(j\omega + \gamma/2)^3} - \\ &- \frac{3j\gamma^2}{(j\omega + \gamma/2)^4}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_3^{\{L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j(\alpha+3)!}{6\alpha!(j\omega+\gamma/2)^2} + \frac{j\gamma(\alpha+2)(\alpha+3)}{(j\omega+\gamma/2)^3} - \\ &- \frac{3j\gamma^2(\alpha+3)}{(j\omega+\gamma/2)^4} + \frac{4j\gamma^3}{(j\omega+\gamma/2)^5}; \\ \frac{\partial W_4^{\{L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j(\alpha+4)!}{24\alpha!(j\omega+\gamma/2)^2} + \frac{j\gamma(\alpha+4)!}{3(\alpha+1)!} \times \\ &\times \frac{1}{(j\omega+\gamma/2)^3} - \frac{3j\gamma^2(\alpha+3)(\alpha+4)}{2(j\omega+\gamma/2)^4} + \frac{4j\gamma^3(\alpha+4)}{(j\omega+\gamma/2)^5} - \frac{5j\gamma^4}{(j\omega+\gamma/2)^6}; \\ \frac{\partial W_5^{\{L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j(\alpha+5)!}{120\alpha!(j\omega+\gamma/2)^2} + \frac{j\gamma(\alpha+5)!}{12(\alpha+1)!} \times \\ &\times \frac{1}{(j\omega+\gamma/2)^3} - \frac{j\gamma^2(\alpha+5)!}{2(\alpha+2)!(j\omega+\gamma/2)^4} + \frac{2j\gamma^3(\alpha+4)(\alpha+5)}{(j\omega+\gamma/2)^5} - \\ &- \frac{5j\gamma^4(\alpha+5)}{(j\omega+\gamma/2)^6} + \frac{6j\gamma^5}{(j\omega+\gamma/2)^7}. \end{aligned}$$





Рис. 6.43. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 4$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [2; 4]$, $\alpha = 1$

$$[6.117] \quad \frac{\partial W_k^{[1]\{P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -j \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \frac{1}{((4s+1)\gamma/2+j\omega)^2}.$$

$$[6.118] \quad \frac{\partial W_k^{[2]\{P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \begin{cases} -\frac{j}{(\gamma/2+j\omega)^2}, & \text{если } k=0; \\ -\frac{j}{(4k+1)\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(4s+1)\gamma/2-j\omega}{(4s+1)\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(4k+1)\gamma/2+j\omega} + \right. \\ \left. + \gamma \sum_{s=0}^{k-1} \frac{4s+1}{((4s+1)\gamma/2)^2 + \omega^2} \right), & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[6.119] \quad \frac{\partial W_k^{[3]\{P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \begin{cases} -\frac{4j(\cos \varphi_0)^2}{\gamma^2} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k=0; \\ -\frac{2j \cos \varphi_k}{(4k+1)\gamma} \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right) \times \\ \times \left(\frac{2 \cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(4k+1)\gamma} + \right. \\ \left. + \frac{4}{\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{4s+1} \right), & \text{если } k>0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(4k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial W_0^{\{P_0^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(\gamma/2+j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial W_1^{\{P_1^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{2(\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{3j}{2(5\gamma/2+j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial W_2^{\{P_2^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{3j}{8(\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{15j}{4(5\gamma/2+j\omega)^2} -$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{35j}{8(9\gamma/2 + j\omega)^2}; \\
& \frac{\partial W_3^{\{P_{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{5j}{16(\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{105j}{16(5\gamma/2 + j\omega)^2} - \\
& -\frac{315j}{16(9\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{231j}{16(13\gamma/2 + j\omega)^2}; \\
& \frac{\partial W_4^{\{P_{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{35j}{128(\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{315j}{32} \times \\
& \times \frac{1}{(5\gamma/2 + j\omega)^2} - \frac{3465j}{64(9\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{3003j}{32(13\gamma/2 + j\omega)^2} - \\
& -\frac{6435j}{128(17\gamma/2 + j\omega)^2}; \\
& \frac{\partial W_5^{\{P_{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{63j}{256(\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{3465j}{256} \times \\
& \times \frac{1}{(5\gamma/2 + j\omega)^2} - \frac{15015j}{128(9\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{45045j}{128(13\gamma/2 + j\omega)^2} - \\
& -\frac{109395j}{256(17\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{46189j}{256(21\gamma/2 + j\omega)^2}.
\end{aligned}$$




Рис. 6.44. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$\begin{aligned}
[6.120] \quad & \frac{\partial W_k^{[1]\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\
& = -j \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{((2s+1)\gamma + j\omega)^2}.
\end{aligned}$$

$$[6.121] \quad \frac{\partial W_k^{[2]\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\
= \begin{cases} -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2}, & \text{если } k = 0; \\ -\frac{j}{(2k+1)\gamma + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+1)\gamma - j\omega}{(2s+1)\gamma + j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(2k+1)\gamma + j\omega} + \right. \\ \left. + 2\gamma \sum_{s=0}^{k-1} \frac{2s+1}{((2s+1)\gamma)^2 + \omega^2} \right), & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.122] \quad \frac{\partial W_k^{[3]\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\
= \begin{cases} -\frac{j(\cos \varphi_0)^2}{\gamma^2} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ -\frac{j \cos \varphi_k}{(2k+1)\gamma} \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) \times \\ \times \left(\frac{\cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(2k+1)\gamma} + \right. \\ \left. + \frac{2}{\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{2s+1} \right), & \text{если } k > 0, \end{cases} \\
\varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial W_0^{\{Leg_0(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2}; \\
& \frac{\partial W_1^{\{Leg_1(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{2j}{(3\gamma + j\omega)^2}; \\
& \frac{\partial W_2^{\{Leg_2(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{6j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \frac{6j}{(5\gamma + j\omega)^2}; \\
& \frac{\partial W_3^{\{Leg_3(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{12j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \\
& -\frac{30j}{(5\gamma + j\omega)^2} + \frac{20j}{(7\gamma + j\omega)^2}; \\
& \frac{\partial W_4^{\{Leg_4(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{20j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \\
& -\frac{90j}{(5\gamma + j\omega)^2} + \frac{140j}{(7\gamma + j\omega)^2} - \frac{70j}{(9\gamma + j\omega)^2}; \\
& \frac{\partial W_5^{\{Leg_5(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{30j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \\
& -\frac{210j}{(5\gamma + j\omega)^2} + \frac{560j}{(7\gamma + j\omega)^2} - \frac{630j}{(9\gamma + j\omega)^2} + \frac{252j}{(11\gamma + j\omega)^2}.
\end{aligned}$$




Рис. 6.45. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$

$$[6.123] \quad \frac{\partial W_k^{[1]\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = -j \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \frac{1}{((4s+3)\gamma/2+j\omega)^2}.$$

$$[6.124] \quad \frac{\partial W_k^{[2]\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{j}{(3\gamma/2+j\omega)^2}, & \text{если } k = 0; \\ -\frac{j}{(4k+3)\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(4s+3)\gamma/2-j\omega}{(4s+3)\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(4k+3)\gamma/2+j\omega} + \right. \\ \left. + \gamma \sum_{s=0}^{k-1} \frac{4s+3}{((4s+3)\gamma/2)^2 + \omega^2} \right), & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.125] \quad \frac{\partial W_k^{[3]\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{4j(\cos \varphi_0)^2}{\gamma^2} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ -\frac{2j \cos \varphi_k}{(4k+3)\gamma} \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) \times \\ \times \left(\frac{2 \cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(4k+3)\gamma} + \right. \\ \left. + \frac{4}{\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{4s+3} \right), & \text{если } k > 0, \end{cases} \\ \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(4k+3)\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_0^{\{P_0^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(3\gamma/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_1^{\{P_1^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{3j}{2(3\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{5j}{2(7\gamma/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_2^{\{P_2^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{15j}{8(3\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{35j}{4(7\gamma/2+j\omega)^2} - \\ &- \frac{63j}{8(11\gamma/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_3^{\{P_3^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{35j}{16(3\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{315j}{16(7\gamma/2+j\omega)^2} - \\ &- \frac{693j}{16(11\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{429j}{16(15\gamma/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_4^{\{P_4^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{315j}{128(3\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{1155j}{32} \times \\ &\times \frac{1}{(7\gamma/2+j\omega)^2} - \frac{9009j}{64(11\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{6435j}{32(15\gamma/2+j\omega)^2} - \\ &- \frac{12155j}{128(19\gamma/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_5^{\{P_5^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{693j}{256(3\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{15015j}{256} \times \\ &\times \frac{1}{(7\gamma/2+j\omega)^2} - \frac{45045j}{128(11\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{109395j}{128(15\gamma/2+j\omega)^2} - \\ &- \frac{230945j}{256(19\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{88179j}{256(23\gamma/2+j\omega)^2}. \end{aligned}$$




Рис. 6.46. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$[6.126] \quad \frac{\partial W_k^{[1]\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = -j \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \frac{1}{((s+1)\gamma + j\omega)^2}.$$

$$[6.127] \quad \frac{\partial W_k^{[2]\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2}, & \text{если } k = 0; \\ -\frac{j}{(k+1)\gamma + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(s+1)\gamma - j\omega}{(s+1)\gamma + j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(k+1)\gamma + j\omega} + \right. \\ \left. + 2\gamma \sum_{s=0}^{k-1} \frac{s+1}{((s+1)\gamma)^2 + \omega^2} \right), & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.128] \quad \frac{\partial W_k^{[3]\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{j(\cos \varphi_0)^2}{\gamma^2} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ -\frac{j \cos \varphi_k}{(k+1)\gamma} \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right) \times \\ \times \left(\frac{\cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(k+1)\gamma} + \right. \\ \left. + \frac{2}{\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{s+1} \right), & \text{если } k > 0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial W_0^{\{P_0^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial W_1^{\{P_1^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{2j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{3j}{(2\gamma + j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial W_2^{\{P_2^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{3j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{12j}{(2\gamma + j\omega)^2} - \frac{10j}{(3\gamma + j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial W_3^{\{P_3^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{4j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{30j}{(2\gamma + j\omega)^2} -$$

$$-\frac{60j}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{35j}{(4\gamma + j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial W_4^{\{P_4^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{5j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{60j}{(2\gamma + j\omega)^2} -$$

$$-\frac{210j}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{280j}{(4\gamma + j\omega)^2} - \frac{126j}{(5\gamma + j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial W_5^{\{P_5^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{6j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{105j}{(2\gamma + j\omega)^2} -$$

$$-\frac{560j}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{1260j}{(4\gamma + j\omega)^2} - \frac{1260j}{(5\gamma + j\omega)^2} + \frac{462j}{(6\gamma + j\omega)^2}.$$




Рис. 6.47. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[6.129] \quad \frac{\partial W_k^{[1]\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = -j \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \frac{1}{((2s+3)\gamma + j\omega)^2}.$$

$$[6.130] \quad \frac{\partial W_k^{[2]\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2}, & \text{если } k = 0; \\ -\frac{j}{(2k+3)\gamma + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+3)\gamma - j\omega}{(2s+3)\gamma + j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(2k+3)\gamma + j\omega} + \right. \\ \left. + 2\gamma \sum_{s=0}^{k-1} \frac{2s+3}{((2s+3)\gamma)^2 + \omega^2} \right), & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.131] \quad \frac{\partial W_k^{[3]\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{j(\cos \varphi_0)^2}{\gamma^2} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ -\frac{j \cos \varphi_k}{(2k+3)\gamma} \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) \times \\ \times \left(\frac{\cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(2k+3)\gamma} + \right. \\ \left. + \frac{2}{\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{2s+3} \right), & \text{если } k > 0, \end{cases} \\ \varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+3)\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_0^{\{P_0^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(3\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_1^{\{P_1^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{3j}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{4j}{(5\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_2^{\{P_2^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{6j}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{20j}{(5\gamma + j\omega)^2} - \frac{15j}{(7\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_3^{\{P_3^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{10j}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{60j}{(5\gamma + j\omega)^2} - \\ &- \frac{105j}{(7\gamma + j\omega)^2} + \frac{56j}{(9\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_4^{\{P_4^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{15j}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{140j}{(5\gamma + j\omega)^2} - \\ &- \frac{420j}{(7\gamma + j\omega)^2} + \frac{504j}{(9\gamma + j\omega)^2} - \frac{210j}{(11\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_5^{\{P_5^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{21j}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{280j}{(5\gamma + j\omega)^2} - \\ &- \frac{1260j}{(7\gamma + j\omega)^2} + \frac{2520j}{(9\gamma + j\omega)^2} - \frac{2310j}{(11\gamma + j\omega)^2} + \frac{792j}{(13\gamma + j\omega)^2}. \end{aligned}$$




Рис. 6.48. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

$$[6.132] \quad \frac{\partial W_k^{[1]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -j \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \\ \times \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \frac{1}{((2s+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)^2}.$$

$$[6.133] \quad \frac{\partial W_k^{[2]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{j}{((\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)^2}, & \text{если } k=0; \\ -\frac{j}{(2k+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+\alpha+1)c\gamma/2-j\omega}{(2s+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(2k+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} + 2c\gamma/2 \times \right. \\ \left. \times \sum_{s=0}^{k-1} \frac{2s+\alpha+1}{((2s+\alpha+1)c\gamma/2)^2 + \omega^2} \right), & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[6.134] \quad \frac{\partial W_k^{[3]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{4j(\cos \varphi_0)^2}{(\alpha+1)^2 c^2 \gamma^2} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k=0; \\ -\frac{2j \cos \varphi_k}{(2k+\alpha+1)c\gamma} \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) \times \\ \times \left(\frac{\cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(2k+\alpha+1)c\gamma/2} + \right. \\ \left. + \frac{4}{c\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{2s+\alpha+1} \right), & \text{если } k>0, \end{cases} \\ \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(2k+\alpha+1)c\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial W_0^{\{P_0^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(c\gamma(\alpha+1)/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_1^{\{P_1^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j(\alpha+1)}{(c\gamma(\alpha+1)/2+j\omega)^2} + j(\alpha+2) \times \\ \times \frac{1}{(c\gamma(\alpha+3)/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_2^{\{P_2^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j(\alpha+1)(\alpha+2)}{2(c\gamma(\alpha+1)/2+j\omega)^2} + j(\alpha+2) \times \\ \times \frac{(\alpha+3)}{2(c\gamma(\alpha+3)/2+j\omega)^2} - \frac{j(\alpha+3)(\alpha+4)}{2(c\gamma(\alpha+5)/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_3^{\{P_3^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j(\alpha+3)!}{6\alpha!(c\gamma(\alpha+1)/2+j\omega)^2} + \frac{j(\alpha+4)!}{2(\alpha+1)!} \times \\ \times \frac{1}{(c\gamma(\alpha+3)/2+j\omega)^2} - \frac{j(\alpha+5)!}{2(\alpha+2)!(c\gamma(\alpha+5)/2+j\omega)^2} + \\ + \frac{j(\alpha+6)!}{6(\alpha+3)!(c\gamma(\alpha+7)/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_4^{\{P_4^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j(\alpha+4)!}{24\alpha!(c\gamma(\alpha+1)/2+j\omega)^2} + \frac{j}{6} \times \\ \times \frac{(\alpha+5)!}{(\alpha+1)!(c\gamma(\alpha+3)/2+j\omega)^2} - \frac{j(\alpha+6)!}{4(\alpha+2)!(c\gamma(\alpha+5)/2+j\omega)^2} + \\ + \frac{j(\alpha+7)!}{6(\alpha+3)!(c\gamma(\alpha+7)/2+j\omega)^2} - \frac{j(\alpha+8)!}{24(\alpha+4)!(c\gamma(\alpha+9)/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_5^{\{P_5^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j(\alpha+5)!}{120\alpha!(c\gamma(\alpha+1)/2+j\omega)^2} + \frac{j}{24} \times \\ \times \frac{(\alpha+6)!}{(\alpha+1)!(c\gamma(\alpha+3)/2+j\omega)^2} - \frac{j(\alpha+7)!}{12(\alpha+2)!(c\gamma(\alpha+5)/2+j\omega)^2} + \\ + \frac{j(\alpha+8)!}{12(\alpha+3)!(c\gamma(\alpha+7)/2+j\omega)^2} - \frac{j(\alpha+9)!}{24(\alpha+4)!(c\gamma(\alpha+9)/2+j\omega)^2} + \\ + \frac{j(\alpha+10)!}{120(\alpha+5)!(c\gamma(\alpha+11)/2+j\omega)^2}.$$




Рис. 6.49. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha \in [0; 4]$, $\beta = 0$; б) $\gamma \in [0, 75; 2]$, $c = 2$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[6.135] \quad \frac{\partial W_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -j \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \frac{1}{((2s+1)\gamma + j\omega)^2}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial W_0^{\{P_0^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_1^{\{P_1^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{3j}{(3\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_2^{\{P_2^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{8j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \frac{10j}{(5\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_3^{\{P_3^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{15j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \\ &- \frac{45j}{(5\gamma + j\omega)^2} + \frac{35j}{(7\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_4^{\{P_4^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{24j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \\ &- \frac{126j}{(5\gamma + j\omega)^2} + \frac{224j}{(7\gamma + j\omega)^2} - \frac{126j}{(9\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_5^{\{P_5^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{35j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \\ &- \frac{280j}{(5\gamma + j\omega)^2} + \frac{840j}{(7\gamma + j\omega)^2} - \frac{1050j}{(9\gamma + j\omega)^2} + \frac{462j}{(11\gamma + j\omega)^2}. \end{aligned}$$




Рис. 6.50. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$[6.136] \quad \frac{\partial W_k^{\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -j \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \frac{1}{((2s+1)\gamma + j\omega)^2}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\frac{\partial W_0^{\{P_0^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2};$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial W_1^{\{P_1^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{4j}{(3\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_2^{\{P_2^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{10j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \frac{15j}{(5\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_3^{\{P_3^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{18j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \\ &- \frac{63j}{(5\gamma + j\omega)^2} + \frac{56j}{(7\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_4^{\{P_4^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{28j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \\ &- \frac{168j}{(5\gamma + j\omega)^2} + \frac{336j}{(7\gamma + j\omega)^2} - \frac{210j}{(9\gamma + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_5^{\{P_5^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(\gamma + j\omega)^2} + \frac{40j}{(3\gamma + j\omega)^2} - \\ &- \frac{360j}{(5\gamma + j\omega)^2} + \frac{1200j}{(7\gamma + j\omega)^2} - \frac{1650j}{(9\gamma + j\omega)^2} + \frac{792j}{(11\gamma + j\omega)^2}.\end{aligned}$$




Рис. 6.51. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$

$$[6.137] \quad \frac{\partial W_k^{\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -j \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \\ \times \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s \frac{1}{((2s+1)c\gamma/2 + j\omega)^2}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье функций 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}\frac{\partial W_0^{\{P_0^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(c\gamma/2 + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_1^{\{P_1^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(c\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{j(\beta+2)}{(3c\gamma/2 + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_2^{\{P_2^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{2(c\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{2j(\beta+3)}{(3c\gamma/2 + j\omega)^2} - \\ &- \frac{j(\beta+3)(\beta+4)}{2(5c\gamma/2 + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_3^{\{P_3^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(c\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{3j(\beta+4)}{(3c\gamma/2 + j\omega)^2} - \\ &- \frac{3j(\beta+3)(\beta+4)}{2(5c\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{j(\beta+6)!}{6(\beta+3)!(7c\gamma/2 + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_4^{\{P_4^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(c\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{4j(\beta+5)}{(3c\gamma/2 + j\omega)^2} - \\ &- \frac{3j(\beta+5)(\beta+6)}{(5c\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{2j(\beta+7)!}{3(\beta+4)!(7c\gamma/2 + j\omega)^2} - \\ &- \frac{j(\beta+8)!}{24(\beta+4)!(9c\gamma/2 + j\omega)^2}; \\ \frac{\partial W_5^{\{P_5^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{j}{(c\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{5j(\beta+6)}{(3c\gamma/2 + j\omega)^2} - \\ &- \frac{5j(\beta+6)(\beta+7)}{(5c\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{5j(\alpha+8)!}{3(\alpha+5)!(7c\gamma/2 + j\omega)^2} - \\ &- \frac{5j(\beta+9)!}{24(\beta+5)!(9c\gamma/2 + j\omega)^2} + \frac{j(\beta+10)!}{120(\beta+5)!(11c\gamma/2 + j\omega)^2}.\end{aligned}$$




Рис. 6.52. Вид производных преобразования Фурье ортогональных функций Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [0, 75; 2]$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

6.5 Производные преобразований Фурье ортогональных фильтров

$$[6.138] \quad \frac{\partial V_k^{[1]\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j\gamma}{(j\omega + \gamma/2)^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2}\right)^s (s+1).$$

$$[6.139] \quad \frac{\partial V_k^{[2]\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j\gamma(j\omega - \gamma(2k+1)/2)}{(j\omega + \gamma/2)^3} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2}\right)^{k-1}.$$

$$[6.140] \quad \frac{\partial V_k^{[3]\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{4j}{\gamma} (-1)^k (\cos \varphi)^2 \times \exp(-j(2k+1)\varphi) ((2k+1) \cos \varphi - j \sin \varphi), \\ \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\frac{\partial V_0^{\{L_0(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{\gamma(\omega + j\gamma/2)}{(j\omega - \gamma/2)(j\omega + \gamma/2)^2};$$

$$\frac{\partial V_1^{\{L_1(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{\gamma(\omega + 3j\gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^3};$$

$$\frac{\partial V_2^{\{L_2(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{\gamma(\omega + 5j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^4};$$

$$\frac{\partial V_3^{\{L_3(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{\gamma(\omega + 7j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^5};$$

$$\frac{\partial V_4^{\{L_4(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{\gamma(\omega + 9j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^6};$$

$$\frac{\partial V_5^{\{L_5(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \frac{\gamma(\omega + 11j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^7}.$$




Рис. 6.53. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4$

$$[6.141] \quad \frac{\partial V_k^{[1]\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j\gamma^2}{(j\omega + \gamma/2)^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2}\right)^s (s+2).$$

$$\begin{aligned} [6.142] \quad & \frac{\partial V_k^{[2]\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ & = -\frac{j\gamma^2(2j\omega - \gamma(2k+2)/2)}{(j\omega + \gamma/2)^4} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2}\right)^{k-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.143] \quad & \frac{\partial V_k^{[3]\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{8j}{\gamma}(-1)^k(\cos \varphi)^3 \times \\ & \times \exp(-j(2k+2)\varphi)((2k+2)\cos \varphi - 2j\sin \varphi), \\ & \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}. \end{aligned}$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_0^{\{L_0^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{2\gamma^2(\omega + j\gamma/2)}{(j\omega - \gamma/2)(j\omega + \gamma/2)^3}; \\ \frac{\partial V_1^{\{L_1^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{2\gamma^2(\omega + j\gamma)}{(j\omega + \gamma/2)^4}; \\ \frac{\partial V_2^{\{L_2^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{2\gamma^2(\omega + 3j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^5}; \\ \frac{\partial V_3^{\{L_3^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{2\gamma^2(\omega + 2j\gamma)(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^6}; \\ \frac{\partial V_4^{\{L_4^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{2\gamma^2(\omega + 5j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^7}; \\ \frac{\partial V_5^{\{L_5^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{2\gamma^2(\omega + 3j\gamma)(j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^8}. \end{aligned}$$




Рис. 6.54. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Сонина-Лагерра 0-5 порядков;
 $\gamma = 4$, $\alpha = 1$

$$\begin{aligned} [6.144] \quad & \frac{\partial V_k^{[1]\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ & = -\frac{j\gamma^3}{(j\omega + \gamma/2)^4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2}\right)^s (s+3). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.145] \quad & \frac{\partial V_k^{[2]\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ & = -\frac{j\gamma^3(3j\omega - \gamma(2k+3)/2)}{(j\omega + \gamma/2)^5} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2}\right)^{k-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [6.146] \quad & \frac{\partial V_k^{[3]\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{16j}{\gamma}(-1)^k(\cos \varphi)^4 \times \\ & \times \exp(-j(2k+3)\varphi)((2k+3)\cos \varphi - 3j\sin \varphi), \\ & \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}. \end{aligned}$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_0^{\{L_0^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{3\gamma^3(\omega + j\gamma/2)}{(j\omega - \gamma/2)(j\omega + \gamma/2)^4}; \\ \frac{\partial V_1^{\{L_1^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^3(3\omega + 5j\gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^5}; \\ \frac{\partial V_2^{\{L_2^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^3(3\omega + 7j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^6}; \\ \frac{\partial V_3^{\{L_3^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^3(3\omega + 9j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)^2}{(j\omega + \gamma/2)^7}; \\ \frac{\partial V_4^{\{L_4^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^3(3\omega + 11j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)^3}{(j\omega + \gamma/2)^8}; \\ \frac{\partial V_5^{\{L_5^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^3(3\omega + 13j\gamma/2)(j\omega - \gamma/2)^4}{(j\omega + \gamma/2)^9}. \end{aligned}$$




Рис. 6.55. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Сонина-Лагерра 0-5 порядков; $\gamma = 4$, $\alpha = 2$

$$[6.147] \quad \frac{\partial V_k^{[1]\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j\gamma^{\alpha+1}}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+2}} \sum_{s=0}^k \binom{k}{k-s} \left(\frac{-\gamma}{j\omega + \gamma/2}\right)^s (s+\alpha+1).$$

$$[6.148] \quad \frac{\partial V_k^{[2]\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -j\gamma^{\alpha+1} \times \\ \times \frac{((\alpha+1)j\omega - \gamma(2k+\alpha+1)/2)}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+3}} \left(\frac{j\omega - \gamma/2}{j\omega + \gamma/2}\right)^{k-1}.$$

$$[6.149] \quad \frac{\partial V_k^{[3]\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{2^{\alpha+2}j}{\gamma} (-1)^k \times \\ \times (\cos \varphi)^{\alpha+2} \exp(-j(2k+\alpha+1)\varphi) \times \\ \times ((2k+\alpha+1) \cos \varphi - j(\alpha+1) \sin \varphi), \quad \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_0^{\{L_0^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^{\alpha+1}((\alpha+1)\omega + j(\alpha+1)\gamma/2)}{(j\omega - \gamma/2)(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+2}}; \\ \frac{\partial V_1^{\{L_1^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^{\alpha+1}((\alpha+1)\omega + j(\alpha+3)\gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+3}}; \\ \frac{\partial V_2^{\{L_2^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^{\alpha+1}((\alpha+1)\omega + j(\alpha+5)\gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+4}} \times \\ &\times (j\omega - \gamma/2); \\ \frac{\partial V_3^{\{L_3^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^{\alpha+1}((\alpha+1)\omega + j(\alpha+7)\gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+5}} \times \\ &\times (j\omega - \gamma/2)^2; \\ \frac{\partial V_4^{\{L_4^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^{\alpha+1}((\alpha+1)\omega + j(\alpha+9)\gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+6}} \times \\ &\times (j\omega - \gamma/2)^3; \\ \frac{\partial V_5^{\{L_5^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= \frac{\gamma^{\alpha+1}((\alpha+1)\omega + j(\alpha+11)\gamma/2)}{(j\omega + \gamma/2)^{\alpha+7}} \times \\ &\times (j\omega - \gamma/2)^4. \end{aligned}$$





Рис. 6.56. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Сонина-Лагерра 2-ого порядка: а) $\gamma = 4$, $\alpha \in [1; 4]$; б) $\gamma \in [2; 4]$, $\alpha = 1$

$$[6.150] \quad \frac{\partial V_k^{[1]\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -j(4k+1)\gamma \times \\ \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \frac{1}{((4s+1)\gamma/2+j\omega)^2}.$$

$$[6.151] \quad \frac{\partial V_k^{[2]\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{j\gamma}{(\gamma/2+j\omega)^2}, & \text{если } k=0; \\ -\frac{j(4k+1)\gamma}{(4k+1)\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(4s+1)\gamma/2-j\omega}{(4s+1)\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(4k+1)\gamma/2+j\omega} + \right. \\ \left. + \gamma \sum_{s=0}^{k-1} \frac{4s+1}{((4s+1)\gamma/2)^2+\omega^2} \right), & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[6.152] \quad \frac{\partial V_k^{[3]\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{4j(\cos \varphi_0)^2}{\gamma} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k=0; \\ -2j \cos \varphi_k \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) \times \\ \times \left(\frac{2 \cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(4k+1)\gamma} + \right. \\ \left. + \frac{4}{\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{4s+1} \right), & \text{если } k>0, \end{cases} \\ \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(4k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\frac{\partial V_0^{\{P_0^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j\gamma}{(\gamma/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial V_1^{\{P_1^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{5j\gamma}{2(\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{15j\gamma}{2(5\gamma/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial V_2^{\{P_2^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{27j\gamma}{8(\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{135j\gamma}{4(5\gamma/2+j\omega)^2} - \\ -\frac{315j\gamma}{8(9\gamma/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial V_3^{\{P_3^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{65j\gamma}{16(\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{1365j\gamma}{16(5\gamma/2+j\omega)^2} - \\ -\frac{4095j\gamma}{16(9\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{3003j\gamma}{16(13\gamma/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial V_4^{\{P_4^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{595j\gamma}{128(\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{5355j\gamma}{32} \times \\ \times \frac{1}{(5\gamma/2+j\omega)^2} - \frac{58905j\gamma}{64(9\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{51051j\gamma}{32(13\gamma/2+j\omega)^2} -$$

$$-\frac{109395j\gamma}{128(17\gamma/2+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial V_5^{\{P_5^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{1323j\gamma}{256(\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{72765j\gamma}{256} \times \\ \times \frac{1}{(5\gamma/2+j\omega)^2} - \frac{315315j\gamma}{128(9\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{945945j\gamma}{128(13\gamma/2+j\omega)^2} - \\ -\frac{2297295j\gamma}{256(17\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{969969j\gamma}{256(21\gamma/2+j\omega)^2}.$$




Рис. 6.57. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = -1/2$, $\beta = 0$

$$[6.153] \quad \frac{\partial V_k^{[1]\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = -2j(2k+1)\gamma \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{((2s+1)\gamma+j\omega)^2}.$$

$$[6.154] \quad \frac{\partial V_k^{[2]\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{2j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2}, & \text{если } k=0; \\ -\frac{2j(2k+1)\gamma}{(2k+1)\gamma+j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+1)\gamma-j\omega}{(2s+1)\gamma+j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(2k+1)\gamma+j\omega} + \right. \\ \left. + 2\gamma \sum_{s=0}^{k-1} \frac{2s+1}{((2s+1)\gamma)^2+\omega^2} \right), & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 [6.155] \quad & \frac{\partial V_k^{[3]\{Leg_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\
 & = \begin{cases} -\frac{2j(\cos \varphi_0)^2}{\gamma} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k=0; \\ -2j \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right) \times \\ \times \left(\frac{\cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(2k+1)\gamma} + \right. \\ \left. + \frac{2}{\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{2s+1}\right), & \text{если } k>0, \end{cases} \\
 & \varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+1)\gamma}.
 \end{aligned}$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial V_0^{\{Leg_0(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{2j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2}; \\
 \frac{\partial V_1^{\{Leg_1(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{6j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2} + \frac{12j\gamma}{(3\gamma+j\omega)^2}; \\
 \frac{\partial V_2^{\{Leg_2(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{10j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2} + \frac{60j\gamma}{(3\gamma+j\omega)^2} - \frac{6j\gamma}{(5\gamma+j\omega)^2}; \\
 \frac{\partial V_3^{\{Leg_3(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{14j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2} + \frac{168j\gamma}{(3\gamma+j\omega)^2} - \\
 & - \frac{420j\gamma}{(5\gamma+j\omega)^2} + \frac{280j\gamma}{(7\gamma+j\omega)^2}; \\
 \frac{\partial V_4^{\{Leg_4(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{18j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2} + \frac{360j\gamma}{(3\gamma+j\omega)^2} - \\
 & - \frac{1620j\gamma}{(5\gamma+j\omega)^2} + \frac{2520j\gamma}{(7\gamma+j\omega)^2} - \frac{1260j\gamma}{(9\gamma+j\omega)^2}; \\
 \frac{\partial V_5^{\{Leg_5(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{22j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2} + \frac{660j\gamma}{(3\gamma+j\omega)^2} - \\
 & - \frac{4620j\gamma}{(5\gamma+j\omega)^2} + \frac{12320j\gamma}{(7\gamma+j\omega)^2} - \frac{13860j\gamma}{(9\gamma+j\omega)^2} + \frac{5544j\gamma}{(11\gamma+j\omega)^2}.
 \end{aligned}$$




Рис. 6.58. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Лежандра 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$

$$[6.156] \quad \frac{\partial V_k^{[1]\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -j(4k+3)\gamma \times \\
 \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \frac{1}{((4s+3)\gamma/2+j\omega)^2}.$$

$$[6.157] \quad \frac{\partial V_k^{[2]\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\
 = \begin{cases} -\frac{3j\gamma}{(3\gamma/2+j\omega)^2}, & \text{если } k=0; \\ -\frac{j(4k+3)\gamma}{(4k+3)\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(4s+3)\gamma/2-j\omega}{(4s+3)\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(4k+3)\gamma/2+j\omega} + \right. \\ \left. + \gamma \sum_{s=0}^{k-1} \frac{4s+3}{((4s+3)\gamma/2)^2+\omega^2}\right), & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[6.158] \quad \frac{\partial V_k^{[3]\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\
 = \begin{cases} -\frac{4j(\cos \varphi_0)^2}{3\gamma} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k=0; \\ -2j \cos \varphi_k \times \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right) \times \\ \times \left(\frac{2 \cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(4k+3)\gamma} + \right. \\ \left. + \frac{4}{\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{4s+3}\right), & \text{если } k>0, \end{cases} \\
 \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(4k+3)\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial V_0^{\{P_0^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{3j\gamma}{(3\gamma/2+j\omega)^2}; \\
 \frac{\partial V_1^{\{P_1^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{35j\gamma}{2(3\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{105j\gamma}{2(7\gamma/2+j\omega)^2}; \\
 \frac{\partial V_2^{\{P_2^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{297j\gamma}{8(3\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{1485j\gamma}{4(7\gamma/2+j\omega)^2} - \\
 & - \frac{3465j\gamma}{8(11\gamma/2+j\omega)^2}; \\
 \frac{\partial V_3^{\{P_3^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{975j\gamma}{16(3\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{20475j\gamma}{16(7\gamma/2+j\omega)^2} - \\
 & - \frac{61425j\gamma}{16(11\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{45045j\gamma}{16(15\gamma/2+j\omega)^2}; \\
 \frac{\partial V_4^{\{P_4^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{11305j\gamma}{128(3\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{101745j\gamma}{32} \times \\
 & \times \frac{1}{(7\gamma/2+j\omega)^2} - \frac{1119195j\gamma}{64(11\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{969969j\gamma}{32(15\gamma/2+j\omega)^2} - \\
 & - \frac{2078505j\gamma}{128(19\gamma/2+j\omega)^2};
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_5^{\{P_5^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{30429j\gamma}{256(3\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{1673595j\gamma}{256} \times \\ &\times \frac{1}{(7\gamma/2+j\omega)^2} - \frac{7252245j\gamma}{128(11\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{21756735j\gamma}{128(15\gamma/2+j\omega)^2} - \\ &- \frac{52837785j\gamma}{256(19\gamma/2+j\omega)^2} + \frac{22309287j\gamma}{256(23\gamma/2+j\omega)^2}. \end{aligned}$$




Рис. 6.59. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 1/2$, $\beta = 0$

$$[6.159] \quad \frac{\partial V_k^{[1]\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -2j(k+1)\gamma \times$$

$$\times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \frac{1}{((s+1)\gamma+j\omega)^2}.$$

$$[6.160] \quad \frac{\partial V_k^{[2]\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} =$$

$$= \begin{cases} -\frac{2j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2}, & \text{если } k = 0; \\ -\frac{2j(k+1)\gamma}{(k+1)\gamma+j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(s+1)\gamma-j\omega}{(s+1)\gamma+j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(k+1)\gamma+j\omega} + \right. \\ \left. + 2\gamma \sum_{s=0}^{k-1} \frac{s+1}{((s+1)\gamma)^2 + \omega^2} \right), & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.161] \quad \frac{\partial V_k^{[3]\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} =$$

$$= \begin{cases} -\frac{2j(\cos \varphi_0)^2}{\gamma} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ -2j \cos \varphi_k \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) \times \\ \times \left(\frac{\cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(k+1)\gamma} + \right. \\ \left. + \frac{2}{\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{s+1} \right), & \text{если } k > 0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(k+1)\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\frac{\partial V_0^{\{P_0^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{2j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial V_1^{\{P_1^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{8j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2} + \frac{12j\gamma}{(2\gamma+j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial V_2^{\{P_2^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{18j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2} + \frac{72j\gamma}{(2\gamma+j\omega)^2} - \frac{60j\gamma}{(3\gamma+j\omega)^2};$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_3^{\{P_3^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{32j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2} + \frac{240j\gamma}{(2\gamma+j\omega)^2} - \\ &- \frac{480j\gamma}{(3\gamma+j\omega)^2} + \frac{280j\gamma}{(4\gamma+j\omega)^2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_4^{\{P_4^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{50j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2} + \frac{600j\gamma}{(2\gamma+j\omega)^2} - \\ &- \frac{2100j\gamma}{(3\gamma+j\omega)^2} + \frac{2800j\gamma}{(4\gamma+j\omega)^2} - \frac{1260j\gamma}{(5\gamma+j\omega)^2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_5^{\{P_5^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{72j\gamma}{(\gamma+j\omega)^2} + \frac{1260j\gamma}{(2\gamma+j\omega)^2} - \\ &- \frac{6720j\gamma}{(3\gamma+j\omega)^2} + \frac{15120j\gamma}{(4\gamma+j\omega)^2} - \frac{15120j\gamma}{(5\gamma+j\omega)^2} + \frac{5544j\gamma}{(6\gamma+j\omega)^2}. \end{aligned}$$




Рис. 6.60. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$

$$[6.162] \quad \frac{\partial V_k^{[1]\{P_k^{(2,0)(\tau,\gamma)}\}(j\omega)}}{\partial \omega} = -2j(2k+3)\gamma \times \\ \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \frac{1}{((2s+3)\gamma + j\omega)^2}.$$

$$[6.163] \quad \frac{\partial V_k^{[2]\{P_k^{(2,0)(\tau,\gamma)}\}(j\omega)}}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{2j\gamma}{(\gamma + j\omega)^2}, & \text{если } k = 0; \\ -\frac{2j(2k+3)\gamma}{(2k+3)\gamma + j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+3)\gamma - j\omega}{(2s+3)\gamma + j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(2k+3)\gamma + j\omega} + \right. \\ \left. + 2\gamma \sum_{s=0}^{k-1} \frac{2s+3}{((2s+3)\gamma)^2 + \omega^2} \right), & \text{если } k > 0. \end{cases}$$

$$[6.164] \quad \frac{\partial V_k^{[3]\{P_k^{(2,0)(\tau,\gamma)}\}(j\omega)}}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{2j(\cos \varphi_0)^2}{\gamma} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k = 0; \\ -2j \cos \varphi_k \times \\ \times \exp \left(-j \left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s \right) \right) \times \\ \times \left(\frac{\cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(2k+3)\gamma} + \right. \\ \left. + \frac{2}{\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{2s+3} \right), & \text{если } k > 0, \end{cases}$$

$$\varphi_k = \arctan \frac{\omega}{(2k+3)\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\frac{\partial V_0^{\{P_0^{(2,0)(\tau,\gamma)}\}(j\omega)}}{\partial \omega} = -\frac{6j\gamma}{(3\gamma + j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial V_1^{\{P_1^{(2,0)(\tau,\gamma)}\}(j\omega)}}{\partial \omega} = -\frac{30j\gamma}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{40j\gamma}{(5\gamma + j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial V_2^{\{P_2^{(2,0)(\tau,\gamma)}\}(j\omega)}}{\partial \omega} = -\frac{84j\gamma}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{280j\gamma}{(5\gamma + j\omega)^2} - \frac{210j\gamma}{(7\gamma + j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial V_3^{\{P_3^{(2,0)(\tau,\gamma)}\}(j\omega)}}{\partial \omega} = -\frac{180j\gamma}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{1080j\gamma}{(5\gamma + j\omega)^2} - \\ - \frac{1890j\gamma}{(7\gamma + j\omega)^2} + \frac{1008j\gamma}{(9\gamma + j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial V_4^{\{P_4^{(2,0)(\tau,\gamma)}\}(j\omega)}}{\partial \omega} = -\frac{330j}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{3080j}{(5\gamma + j\omega)^2} - \\ - \frac{9240j\gamma}{(7\gamma + j\omega)^2} + \frac{11880j\gamma}{(9\gamma + j\omega)^2} - \frac{4620j\gamma}{(11\gamma + j\omega)^2};$$

$$\frac{\partial V_5^{\{P_5^{(2,0)(\tau,\gamma)}\}(j\omega)}}{\partial \omega} = -\frac{546j\gamma}{(3\gamma + j\omega)^2} + \frac{7280j\gamma}{(5\gamma + j\omega)^2} - \\ - \frac{32760j\gamma}{(7\gamma + j\omega)^2} + \frac{65520j\gamma}{(9\gamma + j\omega)^2} - \frac{60060j\gamma}{(11\gamma + j\omega)^2} + \frac{20592j\gamma}{(13\gamma + j\omega)^2}.$$




Рис. 6.61. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = 0$

[6.165]

$$\frac{\partial V_k^{[1]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -j(2k+\alpha+1)c\gamma \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \times \\ \times \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \frac{1}{((2s+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)^2}.$$

[6.166]

$$\frac{\partial V_k^{[2]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{j(\alpha+1)c\gamma}{((\alpha+1)c\gamma/2+j\omega)^2}, & \text{если } k=0; \\ -\frac{j(2k+\alpha+1)c\gamma}{(2k+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \prod_{s=0}^{k-1} \frac{(2s+\alpha+1)c\gamma/2-j\omega}{(2s+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(2k+\alpha+1)c\gamma/2+j\omega} + 2c\gamma/2 \right. \\ \left. \times \sum_{s=0}^{k-1} \frac{2s+\alpha+1}{((2s+\alpha+1)c\gamma/2)^2 + \omega^2} \right), & \text{если } k>0. \end{cases}$$

$$[6.167] \quad \frac{\partial V_k^{[3]\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = \\ = \begin{cases} -\frac{4j(\cos \varphi_0)^2}{(\alpha+1)c\gamma} \exp(-2j\varphi_0), & \text{если } k=0; \\ \times \exp\left(-j\left(\varphi_k + 2 \sum_{s=0}^{k-1} \varphi_s\right)\right) \times \\ \times \left(\frac{\cos \varphi_k \exp(-j\varphi_k)}{(2k+\alpha+1)c\gamma/2} + \right. \\ \left. + \frac{4}{c\gamma} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(\cos \varphi_k)^2}{2s+\alpha+1} \right), & \text{если } k>0, \end{cases} \\ \varphi_k = \arctan \frac{2\omega}{(2k+\alpha+1)c\gamma}.$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\frac{\partial V_0^{\{P_0^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j c \gamma (\alpha+1)}{(c \gamma (\alpha+1)/2 + j \omega)^2}; \\ \frac{\partial V_1^{\{P_1^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j c \gamma (\alpha+1)(\alpha+3)}{(c \gamma (\alpha+1)/2 + j \omega)^2} + j c \gamma (\alpha+2) \times \\ \times \frac{(\alpha+3)}{(c \gamma (\alpha+3)/2 + j \omega)^2}; \\ \frac{\partial V_2^{\{P_2^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j c \gamma (\alpha+1)(\alpha+2)(\alpha+5)}{2(c \gamma (\alpha+1)/2 + j \omega)^2} + j c \gamma \times \\ \times \frac{(\alpha+2)(\alpha+3)(\alpha+5)}{2(c \gamma (\alpha+3)/2 + j \omega)^2} - \frac{j c \gamma (\alpha+3)(\alpha+4)(\alpha+5)}{2(c \gamma (\alpha+5)/2 + j \omega)^2}; \\ \frac{\partial V_3^{\{P_3^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j c \gamma (\alpha+3)!(\alpha+7)}{6\alpha!(c \gamma (\alpha+1)/2 + j \omega)^2} + j c \gamma (\alpha+7) \times \\ \times \frac{(\alpha+4)!}{2(\alpha+1)!(c \gamma (\alpha+3)/2 + j \omega)^2} - \frac{j c \gamma (\alpha+5)!(\alpha+7)}{2(\alpha+2)!(c \gamma (\alpha+5)/2 + j \omega)^2} + \\ + \frac{j c \gamma (\alpha+6)!(\alpha+7)}{6(\alpha+3)!(c \gamma (\alpha+7)/2 + j \omega)^2}; \\ \frac{\partial V_4^{\{P_4^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j c \gamma (\alpha+4)!(\alpha+9)}{24\alpha!(c \gamma (\alpha+1)/2 + j \omega)^2} + \frac{j}{6} \times \\ \times \frac{c \gamma (\alpha+5)!(\alpha+9)}{(\alpha+1)!(c \gamma (\alpha+3)/2 + j \omega)^2} - \frac{j c \gamma (\alpha+6)!(\alpha+9)}{4(\alpha+2)!(c \gamma (\alpha+5)/2 + j \omega)^2} + \\ + \frac{j c \gamma (\alpha+7)!(\alpha+9)}{6(\alpha+3)!(c \gamma (\alpha+7)/2 + j \omega)^2} - \frac{j c \gamma (\alpha+8)!(\alpha+9)}{24(\alpha+4)!(c \gamma (\alpha+9)/2 + j \omega)^2}; \\ \frac{\partial V_5^{\{P_5^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{j c \gamma (\alpha+5)!(\alpha+11)}{120\alpha!(c \gamma (\alpha+1)/2 + j \omega)^2} + \frac{j}{24} \times \\ \times \frac{c \gamma (\alpha+6)!(\alpha+11)}{(\alpha+1)!(c \gamma (\alpha+3)/2 + j \omega)^2} - \frac{j c \gamma (\alpha+7)!(\alpha+11)}{12(\alpha+2)!(c \gamma (\alpha+5)/2 + j \omega)^2} + \\ + \frac{j c \gamma (\alpha+8)!(\alpha+11)}{12(\alpha+3)!(c \gamma (\alpha+7)/2 + j \omega)^2} - \frac{j c \gamma (\alpha+9)!(\alpha+11)}{24(\alpha+4)!(c \gamma (\alpha+9)/2 + j \omega)^2} + \\ + \frac{j c \gamma (\alpha+10)!(\alpha+11)}{120(\alpha+5)!(c \gamma (\alpha+11)/2 + j \omega)^2}.$$




Рис. 6.62. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 1, c = 2, \alpha \in [0; 5], \beta = 0$; б) $\gamma \in [0, 75; 2], c = 2, \alpha = 1, \beta = 0$

$$[6.168] \quad \frac{\partial V_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{8j\gamma^2(k+1)^2}{(2k+3)\gamma+j\omega} \times \\ \times \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)\gamma+j\omega} \times \\ \times \left(\frac{1}{(2s+1)\gamma+j\omega} + \frac{1}{(2k+3)\gamma+j\omega} \right).$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_0^{\{P_0^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{16j\gamma^2(2\gamma+j\omega)}{(\gamma+j\omega)^2(3\gamma+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial V_1^{\{P_1^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{32j\gamma^2}{(5\gamma+j\omega)} \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \frac{1}{5\gamma+j\omega} \right) \times \right. \\ &\times \frac{1}{\gamma+j\omega} - \left. \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \frac{1}{5\gamma+j\omega} \right) \frac{2}{3\gamma+j\omega} \right); \\ \frac{\partial V_2^{\{P_2^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{72j\gamma^2}{(7\gamma+j\omega)} \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \frac{1}{7\gamma+j\omega} \right) \times \right. \\ &\times \frac{1}{\gamma+j\omega} - \left. \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \frac{1}{7\gamma+j\omega} \right) \frac{6}{3\gamma+j\omega} + \left(\frac{1}{5\gamma+j\omega} + \right. \right. \\ &+ \left. \left. \frac{1}{7\gamma+j\omega} \right) \frac{6}{5\gamma+j\omega} \right); \\ \frac{\partial V_3^{\{P_3^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{128j\gamma^2}{(9\gamma+j\omega)} \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \frac{1}{9\gamma+j\omega} \right) \times \right. \\ &\times \frac{1}{\gamma+j\omega} - \left. \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \frac{1}{9\gamma+j\omega} \right) \frac{12}{3\gamma+j\omega} + \left(\frac{1}{5\gamma+j\omega} + \right. \right. \\ &+ \left. \left. \frac{1}{9\gamma+j\omega} \right) \frac{30}{5\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{7\gamma+j\omega} + \frac{1}{9\gamma+j\omega} \right) \frac{20}{7\gamma+j\omega} \right); \\ \frac{\partial V_4^{\{P_4^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{200j\gamma^2}{(11\gamma+j\omega)} \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} \right) \times \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\times \frac{1}{\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} \right) \frac{20}{3\gamma+j\omega} + \left(\frac{1}{5\gamma+j\omega} + \right. \\ &+ \left. \frac{1}{11\gamma+j\omega} \right) \frac{90}{5\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{7\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} \right) \frac{140}{7\gamma+j\omega} + \\ &+ \left(\frac{1}{9\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} \right) \frac{70}{11\gamma+j\omega} \right); \\ \frac{\partial V_5^{\{P_5^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} &= -\frac{288j\gamma^2}{(13\gamma+j\omega)} \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} \right) \times \right. \\ &\times \frac{1}{\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} \right) \frac{30}{3\gamma+j\omega} + \left(\frac{1}{5\gamma+j\omega} + \right. \\ &+ \left. \frac{1}{13\gamma+j\omega} \right) \frac{210}{5\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{7\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} \right) \frac{560}{7\gamma+j\omega} + \\ &+ \left(\frac{1}{9\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} \right) \frac{630}{9\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{11\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} \right) \times \\ &\times \frac{252}{11\gamma+j\omega} \right). \end{aligned}$$




Рис. 6.63. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$

$$[6.169] \quad \frac{\partial V_k^{\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{8j\gamma^3(2k+3)}{((2k+3)\gamma+j\omega)} \times \\ \times \frac{(k+1)(k+2)}{((2k+5)\gamma+j\omega)} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \times \\ \times \frac{1}{(2s+1)\gamma+j\omega} \left(\frac{1}{(2s+1)\gamma+j\omega} + \frac{1}{(2k+3)\gamma+j\omega} + \frac{1}{(2k+5)\gamma+j\omega} \right).$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\frac{\partial V_0^{\{P_0^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{144j\gamma^3(3\gamma+j\omega)}{(\gamma+j\omega)^2(3\gamma+j\omega)^2(5\gamma+j\omega)^2}; \\ \frac{\partial V_1^{\{P_1^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{240j\gamma^3}{(5\gamma+j\omega)(7\gamma+j\omega)} \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \frac{1}{5\gamma+j\omega} + \frac{1}{7\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \frac{1}{5\gamma+j\omega} + \frac{1}{7\gamma+j\omega} \right) \frac{2}{3\gamma+j\omega} \right); \\ \frac{\partial V_2^{\{P_2^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{672j\gamma^3}{(7\gamma+j\omega)(9\gamma+j\omega)} \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \frac{1}{7\gamma+j\omega} + \frac{1}{9\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \frac{1}{7\gamma+j\omega} + \frac{1}{9\gamma+j\omega} \right) \frac{6}{3\gamma+j\omega} + \left(\frac{1}{5\gamma+j\omega} + \frac{1}{7\gamma+j\omega} + \frac{1}{9\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{7\gamma+j\omega} \right) \times \\ \times \frac{6}{5\gamma+j\omega}; \\ \frac{\partial V_3^{\{P_3^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{1440j\gamma^3}{(9\gamma+j\omega)(11\gamma+j\omega)} \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \frac{1}{9\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \frac{1}{9\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} \right) \right).$$

$$+ \frac{1}{11\gamma+j\omega} \right) \frac{12}{3\gamma+j\omega} + \left(\frac{1}{5\gamma+j\omega} + \frac{1}{9\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} \right) \times \\ \times \frac{30}{5\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{7\gamma+j\omega} + \frac{1}{9\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} \right) \frac{20}{7\gamma+j\omega}; \\ \frac{\partial V_4^{\{P_4^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{2640j\gamma^3}{(11\gamma+j\omega)(13\gamma+j\omega)} \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} \right) \frac{20}{3\gamma+j\omega} + \frac{90}{5\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{7\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} \right) \frac{140}{7\gamma+j\omega} + \left(\frac{1}{9\gamma+j\omega} + \frac{1}{11\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} \right) \frac{70}{11\gamma+j\omega} \right); \\ \frac{\partial V_5^{\{P_5^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = -\frac{4368j\gamma^3}{(13\gamma+j\omega)(15\gamma+j\omega)} \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} + \frac{1}{15\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} + \frac{1}{15\gamma+j\omega} \right) \frac{30}{3\gamma+j\omega} + \frac{210}{5\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{7\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} + \frac{1}{15\gamma+j\omega} \right) \frac{560}{7\gamma+j\omega} + \left(\frac{1}{9\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} + \frac{1}{15\gamma+j\omega} \right) \frac{630}{9\gamma+j\omega} - \left(\frac{1}{11\gamma+j\omega} + \frac{1}{13\gamma+j\omega} + \frac{1}{15\gamma+j\omega} \right) \frac{252}{11\gamma+j\omega} \right).$$




Рис. 6.64. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 0-5 порядков; $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$

$$\begin{aligned} [6.170] \quad \frac{\partial V_k^{\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = & -\frac{j\gamma^{\beta+1}(k+\beta)!}{k!} \times \\ & \times \frac{(2k+\beta+1)}{\prod_{p=0}^{\beta} (2k+2p+1)\gamma+j\omega} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \times \\ & \times \frac{1}{(2s+1)\gamma+j\omega} \left(\frac{1}{(2s+1)\gamma+j\omega} + \right. \\ & \left. + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2k+2p+1)\gamma+j\omega} \right). \end{aligned}$$

Частные случаи для производных преобразования Фурье фильтров 0-5 порядков:

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_0^{\{P_0^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = & -\frac{j\gamma^{\beta+1}(\beta+1)!}{\prod_{p=0}^{\beta} (2p+1)\gamma+j\omega} \left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \right. \\ & + \left. \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+1)\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega}; \\ \frac{\partial V_1^{\{P_1^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = & -\frac{j\gamma^{\beta+1}(\beta+1)!(\beta+3)}{\prod_{p=0}^{\beta} (2p+3)\gamma+j\omega} \times \\ & \times \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+3)\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega} - \right. \\ & - \left. \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+3)\gamma+j\omega} \right) \frac{2}{3\gamma+j\omega} \right); \\ \frac{\partial V_2^{\{P_2^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = & -\frac{j\gamma^{\beta+1}(\beta+2)!(\beta+5)}{2 \prod_{p=0}^{\beta} (2p+5)\gamma+j\omega} \times \\ & \times \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+5)\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega} - \right. \\ & - \left. \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+5)\gamma+j\omega} \right) \frac{6}{3\gamma+j\omega} + \right. \\ & + \left. \left(\frac{1}{5\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+5)\gamma+j\omega} \right) \frac{6}{5\gamma+j\omega} \right); \\ \frac{\partial V_3^{\{P_3^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = & -\frac{j\gamma^{\beta+1}(\beta+3)!(\beta+7)}{6 \prod_{p=0}^{\beta} (2p+7)\gamma+j\omega} \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \times \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+7)\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega} - \right. \\ & - \left. \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+7)\gamma+j\omega} \right) \frac{12}{3\gamma+j\omega} + \right. \\ & + \left. \left(\frac{1}{5\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+7)\gamma+j\omega} \right) \frac{30}{5\gamma+j\omega} - \right. \\ & - \left. \left(\frac{1}{7\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+7)\gamma+j\omega} \right) \frac{20}{7\gamma+j\omega} \right); \\ \frac{\partial V_4^{\{P_4^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = & -\frac{j\gamma^{\beta+1}(\beta+4)!(\beta+9)}{24 \prod_{p=0}^{\beta} (2p+9)\gamma+j\omega} \times \\ & \times \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+9)\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega} - \right. \\ & - \left. \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+9)\gamma+j\omega} \right) \frac{20}{3\gamma+j\omega} + \right. \\ & + \left. \left(\frac{1}{5\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+9)\gamma+j\omega} \right) \frac{90}{5\gamma+j\omega} - \right. \\ & - \left. \left(\frac{1}{7\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+9)\gamma+j\omega} \right) \frac{140}{7\gamma+j\omega} + \right. \\ & + \left. \left(\frac{1}{9\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+9)\gamma+j\omega} \right) \frac{70}{11\gamma+j\omega} \right); \\ \frac{\partial V_5^{\{P_5^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} = & -\frac{j\gamma^{\beta+1}(\beta+5)!(\beta+11)}{120 \prod_{p=0}^{\beta} (2p+11)\gamma+j\omega} \times \\ & \times \left(\left(\frac{1}{\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+11)\gamma+j\omega} \right) \frac{1}{\gamma+j\omega} - \right. \\ & - \left. \left(\frac{1}{3\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+11)\gamma+j\omega} \right) \frac{30}{3\gamma+j\omega} + \right. \\ & + \left. \left(\frac{1}{5\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+11)\gamma+j\omega} \right) \frac{210}{5\gamma+j\omega} - \right. \\ & - \left. \left(\frac{1}{7\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+11)\gamma+j\omega} \right) \frac{560}{7\gamma+j\omega} + \right. \\ & + \left. \left(\frac{1}{9\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+11)\gamma+j\omega} \right) \frac{630}{9\gamma+j\omega} - \right. \\ & - \left. \left(\frac{1}{11\gamma+j\omega} + \sum_{p=0}^{\beta} \frac{1}{(2p+11)\gamma+j\omega} \right) \frac{252}{11\gamma+j\omega} \right). \end{aligned}$$




Рис. 6.65. Вид производных преобразования Фурье ортогональных фильтров Якоби 2-ого порядка: а) $\gamma = 1, c = 2, \alpha = 0, \beta \in [0; 5]$;
б) $\gamma \in [0, 75; 2], c = 2, \alpha = 0, \beta = 1$

Глава 7

Основные и расширенные свойства в частотной области

Определение.

Ортогональные функции в частотной области, как и во временной, обладают рядом общих свойств [5]

$$\begin{cases} \int_0^\infty \operatorname{Re} W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega = \frac{\pi}{2} \psi_k(0, \gamma); \\ \int_0^\infty \operatorname{Im} W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega = 0. \end{cases}$$

Как и во временной, в частотной области были выделены дополнительные свойства [5]

$$\begin{cases} \operatorname{Re} W_k^{\left\{\frac{\partial \psi_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(0) = -\psi_k(0, \gamma); \\ \operatorname{Im} W_k^{\left\{\frac{\partial \psi_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(0) = 0. \end{cases}$$

Таблица 7.1. Основные и расширенные свойства в частотной области

$\psi_k(\tau, \gamma)$	$\int_0^\infty \text{Re}W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)d\omega$	$\int_0^\infty \text{Im}W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)d\omega$	$\text{Re}W_k^{\left\{\frac{\partial \psi_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(0)$	$\text{Im}W_k^{\left\{\frac{\partial \psi_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(0)$
$L_k(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi}{2}$	0	-1	0
$L_k^{(1)}(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi(k+1)}{2}$	0	$-k-1$	0
$L_k^{(2)}(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi(k+1)(k+2)}{4}$	0	$-\frac{(k+1)(k+2)}{2}$	0
$L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi}{2} \binom{k+\alpha}{\alpha}$	0	$-\binom{k+\alpha}{\alpha}$	0
$P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi}{2}(-1)^k$	0	$(-1)^{k+1}$	0
$Leg_k(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi}{2}(-1)^k$	0	$(-1)^{k+1}$	0
$P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi}{2}(-1)^k$	0	$(-1)^{k+1}$	0
$P_k^{(1, 0)}(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi}{2}(-1)^k$	0	$(-1)^{k+1}$	0
$P_k^{(2, 0)}(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi}{2}(-1)^k$	0	$(-1)^{k+1}$	0
$P_k^{(\alpha, 0)}(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi}{2}(-1)^k$	0	$(-1)^{k+1}$	0
$P_k^{(0, 1)}(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi(k+1)}{2}(-1)^k$	0	$(-1)^{k+1}(k+1)$	0
$P_k^{(0, 2)}(\tau, \gamma)$	$\frac{\pi(k+1)(k+2)}{4}(-1)^k$	0	$(-1)^{k+1} \frac{(k+1)(k+2)}{2}$	0
$P_k^{(0, \beta)}(\tau, \gamma)$	$(-1)^k \frac{\pi}{2} \binom{k+\beta}{\beta}$	0	$(-1)^{k+1} \binom{k+\beta}{\beta}$	0

Глава 8

Основные и расширенные соотношения ортогональности в частотной области

Определение.

Для ортогональных функций с единичной весовой функцией в частотной области также справедливы соотношения ортогональности [8, 10, 5]

$$\begin{cases} \int_0^\infty \operatorname{Re} W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \operatorname{Re} W_n^{\{\psi_n(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega = \frac{\pi}{2} \|\psi_k\|^2 \delta_{k,n}; \\ \int_0^\infty \operatorname{Im} W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \operatorname{Im} W_n^{\{\psi_n(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega = \frac{\pi}{2} \|\psi_k\|^2 \delta_{k,n}. \end{cases}$$

Соотношение ортогональности дает возможность записать равенство, связывающее временную и частотную области (теорема Парсеваля) [5, 12]

$$\int_0^\infty (\operatorname{Re} W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega))^2 d\omega = \frac{\pi}{2} \int_0^\infty (\psi_k(\tau, \gamma))^2 d\tau.$$

8.1 Основные соотношения ортогональности

$$[8.1] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\{L_s(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \operatorname{Re} W_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{2\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.2] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\{L_s(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \operatorname{Im} W_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{2\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.1], [8.2]} = \frac{\pi}{2\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$




Рис. 8.1. Графическое представление соотношений [8.1], [8.2] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$




Рис. 8.2. Графическое представление соотношений [8.4], [??] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[8.3] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\{P_s^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{2(4k+1)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.5] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\{Leg_s(\tau,\gamma)\}}(j\omega) \operatorname{Re} W_k^{\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{4(2k+1)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.4] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\{P_s^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{2(4k+1)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.6] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\{Leg_s(\tau,\gamma)\}}(j\omega) \operatorname{Im} W_k^{\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{4(2k+1)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.4],[??]} = \frac{\pi}{4\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/13 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/21 \end{pmatrix}.$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.5],[8.6]} = \frac{\pi}{4\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/11 \end{pmatrix}.$$




Рис. 8.3. Графическое представление соотношений [8.5], [8.6] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$




Рис. 8.4. Графическое представление соотношений [8.7], [8.8] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[8.7] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\{P_s^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{2(4k+3)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.9] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\{P_s^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{4(k+1)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.8] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\{P_s^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{2(4k+3)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.10] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\{P_s^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{4(k+1)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.7],[8.8]} = \frac{\pi}{4\gamma} \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/11 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/15 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/19 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/23 \end{pmatrix}.$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.9],[8.10]} = \frac{\pi}{4\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/6 \end{pmatrix}.$$




Рис. 8.5. Графическое представление соотношений [8.9], [8.10] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$




Рис. 8.6. Графическое представление соотношений [8.11], [8.12] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[8.11] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\{P_s^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)(\tau,\gamma) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{4(2k+3)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.12] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\{P_s^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)(\tau,\gamma) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{4(2k+3)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.11],[8.12]} = \frac{\pi}{4\gamma} \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/13 \end{pmatrix}.$$

$$[8.13] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\{P_s^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)(\tau,\gamma) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{2c(2k+\alpha+1)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.14] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\{P_s^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)(\tau,\gamma) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{\pi}{2c(2k+\alpha+1)\gamma}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.13],[8.14]} = \frac{\pi}{2c\gamma} \times \\ \times \begin{pmatrix} \frac{1}{(\alpha+1)} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{(\alpha+3)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{(\alpha+5)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{(\alpha+7)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{(\alpha+9)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{(\alpha+11)} \end{pmatrix}.$$




Рис. 8.7. Графическое представление соотношения [8.13], [8.14] при $k = 0..5$ и $k = s$: а) $\gamma = 1$, $c = 2$, $\alpha \in [0; 5]$; б) $\gamma \in [0, 5; 5, 5]$, $c = 2$, $\alpha = 1$

8.2 Расширенные соотношения ортогональности

$$[8.15] \quad \int_0^\infty \frac{\partial \operatorname{Im} W_s^{\{L_s(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} \operatorname{Re} W_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega =$$

$$= \begin{cases} \frac{(k+1)\pi}{2\gamma^2}, & \text{если } k = s-1; \\ -\frac{(2k+1)\pi}{2\gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ \frac{k\pi}{2\gamma^2}, & \text{если } k = s+1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.15]} = \frac{\pi}{2\gamma^2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -9 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & -11 \end{pmatrix}.$$

$$[8.16] \quad \int_0^\infty \frac{\partial \operatorname{Re} W_s^{\{L_s(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} \operatorname{Im} W_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega =$$

$$= \begin{cases} -\frac{(k+1)\pi}{2\gamma^2}, & \text{если } k = s-1; \\ \frac{(2k+1)\pi}{2\gamma^2}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{k\pi}{2\gamma^2}, & \text{если } k = s+1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:




Рис. 8.8. Графическое представление соотношений [8.15], [8.16] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[8.17] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\left\{ \frac{\partial L_s(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \operatorname{Re} W_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega =$$

$$= \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.18] \quad \int_0^\infty \text{Im}W_s^{\left\{\frac{\partial L_s(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) \text{Im}W_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.17],[8.18]} = \frac{\pi}{2} \times \\ \times \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1/2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

Рис. 8.9. Графическое представление соотношений [8.17], [8.18] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[8.19] \quad \int_0^\infty \text{Im}W_s^{\left\{\frac{\partial L_s(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) \frac{\partial \text{Re}W_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{(k+1)\pi}{4\gamma}, & \text{если } k = s-1; \\ -\frac{\pi}{4\gamma}, & \text{если } k = s; \\ \frac{k\pi}{4\gamma}, & \text{если } k = s+1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.19]} = \frac{\pi}{4\gamma} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$[8.20] \quad \int_0^\infty \text{Re}W_s^{\left\{\frac{\partial L_s(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) \frac{\partial \text{Im}W_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{\partial \omega} d\omega = \\ = \begin{cases} \frac{(k+1)\pi}{4\gamma}, & \text{если } k = s-1; \\ \frac{\pi}{4\gamma}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{k\pi}{4\gamma}, & \text{если } k = s+1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.20]} = \frac{\pi}{4\gamma} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$




Рис. 8.10. Графическое представление соотношений [8.19], [8.20] при $k = 0..5, s = 0..5; \gamma = 1$

$$[8.21] \quad \int_0^\infty \text{Re}W_s^{\left\{\frac{\partial L_s(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) \text{Re}W_k^{\left\{\frac{\partial L_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) d\omega - \\ - \frac{(2k+1)\gamma\pi}{4} = \begin{cases} -\frac{(k-s)\gamma\pi}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\gamma\pi}{8}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.22] \quad \int_0^\infty \text{Im}W_s^{\left\{\frac{\partial L_s(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) \text{Im}W_k^{\left\{\frac{\partial L_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau}\right\}}(j\omega) d\omega - \\ - \frac{(2k+1)\gamma\pi}{4} = \begin{cases} -\frac{(k-s)\gamma\pi}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\gamma\pi}{8}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5; s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.21],[8.22]} = \frac{\pi\gamma}{2} \times$$




Рис. 8.11. Графическое представление соотношений [8.21], [8.22] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[8.23] \quad \int_0^\infty \text{Im}W_s^{\{L_s(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \text{Re}W_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega =$$

$$\begin{cases} \frac{1}{s-k}, & \text{если } (k+1) \bmod 2 \neq 0; \\ -\frac{1}{2k+1}, & \text{если } k = s; \\ -\frac{1}{k+s+1}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.23]} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1/3 & -1/3 & -1/5 & -1/5 \\ 1 & -1/3 & -1 & -1/5 & -1/3 & -1/7 \\ -1/3 & 1 & -1/5 & -1 & -1/7 & -1/3 \\ 1/3 & -1/5 & 1 & -1/7 & -1 & -1/9 \\ -1/5 & 1/3 & -1/7 & 1 & -1/9 & -1 \\ 1/5 & -1/7 & 1/3 & -1/9 & 1 & -1/11 \end{pmatrix}.$$

$$[8.24] \quad \int_0^\infty \text{Re}W_s^{\{L_s(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \text{Im}W_k^{\{L_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega =$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{s-k}, & \text{если } (k+1) \bmod 2 \neq 0; \\ \frac{1}{2k+1}, & \text{если } k = s; \\ \frac{1}{k+s+1}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.24]} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1/3 & 1/3 & -1/5 & 1/5 \\ -1 & -1/3 & 1 & -1/5 & 1/3 & -1/7 \\ -1/3 & -1 & -1/5 & 1 & -1/7 & 1/3 \\ -1/3 & -1/5 & -1 & -1/7 & 1 & -1/9 \\ -1/5 & -1/3 & -1/7 & -1 & -1/9 & 1 \\ -1/5 & -1/7 & -1/3 & -1/9 & -1 & -1/11 \end{pmatrix}.$$




Рис. 8.12. Графическое представление соотношений [8.23], [8.24] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[8.25] \quad \int_0^\infty \text{Re}W_s^{\{L_s^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \text{Re}W_k^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega -$$

$$-\frac{\pi(k+1)}{2\gamma} = \begin{cases} -\frac{(k-s)\gamma\pi}{2}, & \text{если } k > s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.26] \quad \int_0^\infty \text{Im}W_s^{\{L_s^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \text{Im}W_k^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega -$$

$$-\frac{\pi(k+1)}{2\gamma} = \begin{cases} -\frac{(k-s)\gamma\pi}{2}, & \text{если } k > s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.25], [8.26]} = \frac{\pi}{2\gamma} \times$$

$$\times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & -3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$




Рис. 8.13. Графическое представление соотношений [8.25],
[8.26] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$




Рис. 8.14. Графическое представление соотношений [8.27],
[8.28] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[8.27] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\left\{ \frac{\partial P_s^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.28] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\left\{ \frac{\partial P_s^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.27],[8.28]} = \frac{\pi}{2} \times \\ \times \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$$[8.29] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\left\{ \frac{\partial \operatorname{Leg}_s(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{\operatorname{Leg}_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.30] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\left\{ \frac{\partial \operatorname{Leg}_s(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{\operatorname{Leg}_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.29],[8.30]} = \frac{\pi}{2} \times \\ \times \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1/2 \end{pmatrix}.$$




Рис. 8.15. Графическое представление соотношений [8.29],
[8.30] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$




Рис. 8.16. Графическое представление соотношений [8.31],
[8.32] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[8.31] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\left\{ \frac{\partial P_s^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.32] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\left\{ \frac{\partial P_s^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.31],[8.32]} = \frac{\pi}{2} \times \\ \times \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$$[8.33] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\left\{ \frac{\partial P_s^{(1,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.34] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\left\{ \frac{\partial P_s^{(1,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:

$$\mathcal{M}_{[8.33],[8.34]} = \frac{\pi}{2} \times \\ \times \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1/2 \end{pmatrix}.$$




Рис. 8.17. Графическое представление соотношений [8.33],
[8.34] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[8.35] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\left\{ \frac{\partial P_s^{(2,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.36] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\left\{ \frac{\partial P_s^{(2,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица значений при $k = 0..5$; $s = 0..5$:
 $\mathcal{M}_{[8.35],[8.36]} = \frac{\pi}{2} \times$

$$\times \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & -1/2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1/2 \end{pmatrix}.$$




Рис. 8.18. Графическое представление соотношений [8.35],
[8.36] при $k = 0..5$, $s = 0..5$; $\gamma = 1$

$$[8.37] \quad \int_0^\infty \operatorname{Re} W_s^{\left\{ \frac{\partial P_s^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Re} W_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[8.38] \quad \int_0^\infty \operatorname{Im} W_s^{\left\{ \frac{\partial P_s^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)}{\partial \tau} \right\}}(j\omega) \times \\ \times \operatorname{Im} W_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \begin{cases} -\frac{\pi(-1)^{k+s}}{2}, & \text{если } k > s; \\ -\frac{\pi}{4}, & \text{если } k = s; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Глава 9

Рекуррентные соотношения

Определение.

Для ортогональных многочленов Якоби справедливо следующее рекуррентное соотношение [13, 15]:

$$\begin{aligned} & 2(k+1)(\alpha + \beta + k + 1)(\alpha + \beta + 2k)P_{k+1}^{(\alpha, \beta)}(x) = \\ & = ((\alpha + \beta + 2k)(\alpha + \beta + 2k + 2)x + \alpha^2 - \beta^2)(\alpha + \beta + 2k + 1)P_k^{(\alpha, \beta)}(x) - \\ & - 2(\alpha + k)(\beta + k)(\alpha + \beta + 2k + 2)P_{k-1}^{(\alpha, \beta)}(x). \end{aligned}$$

Для обобщенных многочленов Лагерра справедливо следующее рекуррентное соотношение [13, 15]:

$$(k+1)L_{k+1}^{(\alpha)}(x) = (\alpha + 2k + 1 - x)L_k^{(\alpha)}(x) - (\alpha + k)L_{k-1}^{(\alpha)}(x).$$

Аналогичные соотношения для ортогональных функций получены с учетом замен переменных, приведенных в Главе 1 [9].

9.1 Рекуррентные соотношения для ортогональных функций

$$\begin{aligned} [9.1] \quad L_k(\tau, \gamma) = & \frac{2k-1-\gamma\tau}{k}L_{k-1}(\tau, \gamma) - \\ & - \frac{k-1}{k}L_{k-2}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$[9.2] \quad L_k^{(1)}(\tau, \gamma) = \frac{2k-\gamma\tau}{k}L_{k-1}^{(1)}(\tau, \gamma) - L_{k-2}^{(1)}(\tau, \gamma).$$

$$\begin{aligned} [9.3] \quad L_k^{(2)}(\tau, \gamma) = & \frac{2k+1-\gamma\tau}{k}L_{k-1}^{(2)}(\tau, \gamma) - \\ & - \frac{k+1}{k}L_{k-2}^{(2)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.4] \quad L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) = & \frac{2k+\alpha-1-\gamma\tau}{k}L_{k-1}^{(\alpha)}(\tau, \gamma) - \\ & - \frac{k+\alpha-1}{k}L_{k-2}^{(\alpha)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.5] \quad P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) = & \\ & = \frac{((4k-5)(4k-1)(1-2\exp(-2\gamma\tau))+1)}{4k(4k-5)(2k-1)} \times \\ & \times (4k-3)P_{k-1}^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma) - \frac{(k-1)(2k-3)(4k-1)}{k(2k-1)(4k-5)} \times \\ & \times P_{k-2}^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.6] \quad Leg_k(\tau, \gamma) = & \frac{2k-1}{k}(1-2\exp(-2\gamma\tau)) \times \\ & \times Leg_{k-1}(\tau, \gamma) - \frac{k-1}{k}Leg_{k-2}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.7] \quad P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma) = & \\ & = \frac{((4k-3)(4k+1)(1-2\exp(-2\gamma\tau))+1)}{4k(4k-3)(2k+1)} \times \\ & \times (4k-1)P_{k-1}^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma) - \frac{(k-1)(2k-1)(4k+1)}{k(2k+1)(4k-3)} \times \\ & \times P_{k-2}^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.8] \quad P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) &= \\ &= \frac{\left((2k-1)(2k+1)(1-2\exp(-\gamma\tau))+1\right)}{(2k-1)(k+1)} \times \\ &\quad \times P_{k-1}^{(1,0)}(\tau, \gamma) - \frac{(k-1)(2k+1)}{(2k-1)(k+1)} P_{k-2}^{(1,0)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.9] \quad P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) &= \\ &= \frac{\left(k(k+1)(1-2\exp(-2\gamma\tau))+1\right)(2k+1)}{k^2(k+2)} \times \\ &\quad \times P_{k-1}^{(2,0)}(\tau, \gamma) - \frac{(k-1)(k+1)^2}{k^2(k+2)} P_{k-2}^{(2,0)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.10] \quad P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) &= \\ &= \frac{\left((\alpha+2k)(\alpha+2k-2)(1-2\exp(-c\gamma\tau))+\alpha^2\right)}{2k(\alpha+2k-2)(\alpha+k)} \times \\ &\quad \times (\alpha+2k-1)P_{k-1}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) - \frac{(\alpha+k-1)(k-1)(\alpha+2k)}{k(\alpha+2k-2)(\alpha+k)} \times \\ &\quad \times P_{k-2}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.11] \quad P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) &= \\ &= \frac{\left((2k-1)(2k+1)(1-2\exp(-2\gamma\tau))-1\right)}{(k+1)(2k-1)} \times \\ &\quad \times P_{k-1}^{(0,1)}(\tau, \gamma) - \frac{(k-1)(2k+1)}{(k+1)(2k-1)} P_{k-2}^{(0,1)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.12] \quad P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) &= \\ &= \frac{\left(k(k+1)(1-2\exp(-2\gamma\tau))-1\right)(2k+1)}{k^2(k+2)} \times \\ &\quad \times P_{k-1}^{(0,2)}(\tau, \gamma) - \frac{(k-1)(k+1)^2}{k^2(k+2)} P_{k-2}^{(0,2)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.13] \quad P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) &= \\ &= \frac{\left((\beta+2k)(\beta+2k-2)(1-2\exp(-c\gamma\tau))-\beta^2\right)}{2k(\beta+2k-2)(\beta+k)} \times \\ &\quad \times (\beta+2k-1)P_{k-1}^{(0,\beta)}(\tau, \gamma) - \frac{(\beta+k-1)(k-1)(\beta+2k)}{k(\beta+2k-2)(\beta+k)} \times \\ &\quad \times P_{k-2}^{(0,\beta)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

9.2 Рекуррентные соотношения для производных ортогональных функций

$$\begin{aligned} [9.14] \quad \frac{\partial P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\partial P_{k-2}^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} - \\ &- \gamma \left(\frac{(4k+1)}{2} P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) - (4k-3) P_{k-1}^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{(4k-7)}{2} P_{k-2}^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.15] \quad \frac{\partial \text{Leg}_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\partial \text{Leg}_{k-2}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} - \\ &- \gamma \left((2k+1) \text{Leg}_k(\tau, \gamma) - 2(2k-1) \text{Leg}_{k-1}(\tau, \gamma) + \right. \\ &\quad \left. + (2k-3) \text{Leg}_{k-2}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.16] \quad \frac{\partial P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\partial P_{k-2}^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} - \\ &- \gamma \left(\frac{(4k+3)}{2} P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) - (4k-1) P_{k-1}^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{(4k-5)}{2} P_{k-2}^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.17] \quad \frac{\partial P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\partial P_{k-2}^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} - \\ &- \gamma \left((k+1) P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) - 2k P_{k-1}^{(1,0)}(\tau, \gamma) + \right. \\ &\quad \left. + (k-1) P_{k-2}^{(1,0)}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.18] \quad \frac{\partial P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\partial P_{k-2}^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} - \\ &- \gamma \left((2k+3) P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) - 2(2k+1) P_{k-1}^{(2,0)}(\tau, \gamma) + \right. \\ &\quad \left. + (2k-1) P_{k-2}^{(2,0)}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.19] \quad \frac{\partial P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \frac{\partial P_{k-2}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} - \\ &- c\gamma/2 \left((\alpha+2k+1) P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) - 2(\alpha+2k-1) \times \right. \\ &\quad \left. \times P_{k-1}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) + (\alpha+2k-3) P_{k-2}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.20] \quad \frac{\partial P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= \\ &= \frac{(2k+1)}{(k+1)} \left(\frac{\partial \text{Leg}_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} + \frac{\partial \text{Leg}_{k-1}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right) - \\ &- \frac{((2k-1)(2k+1)+1)}{(k+1)(2k-1)} \frac{\partial P_{k-1}^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} - \\ &- \frac{(k-1)(2k+1)}{(k+1)(2k-1)} \frac{\partial P_{k-2}^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.21] \quad & \frac{\partial P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \\ & = \frac{2(k+1)}{k(k+2)} \left(k \frac{\partial P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} + (k+1) \frac{\partial P_{k-1}^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right) - \\ & - \frac{(k(k+1)+1)}{k^2(k+2)} (2k+1) \frac{\partial P_{k-1}^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} - \\ & - \frac{(k-1)(k+1)^2}{k^2(k+2)} \frac{\partial P_{k-2}^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.22] \quad & \frac{\partial P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = \frac{(\beta+2k)}{k(\beta+k)} \times \\ & \times \left(k \frac{\partial P_k^{(0,\beta-1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} + (k+\beta-1) \frac{\partial P_{k-1}^{(0,\beta-1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} \right) - \\ & - \frac{((\beta+2k)(\beta+2k-2)+1)}{2k(\beta+2k-2)(\beta+k)} (\beta+2k-1) \frac{\partial P_{k-1}^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} - \\ & - \frac{(\beta+k-1)(k-1)(\beta+2k)}{k(\beta+2k-2)(\beta+k)} \frac{\partial P_{k-2}^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau}. \end{aligned}$$

9.3 Рекуррентные соотношения для неопределенных интегралов от ортогональных функций

$$[9.23] \quad \int L_k(\tau, \gamma) d\tau = -2 \sum_{\nu=0}^{k-1} \int L_\nu(\tau, \gamma) d\tau - \frac{2}{\gamma} L_k(\tau, \gamma).$$

$$\begin{aligned} [9.24] \quad & \int \tau L_k(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{k+1}{\gamma} \int L_{k+1}(\tau, \gamma) d\tau + \\ & + \frac{2k+1}{\gamma} \int L_k(\tau, \gamma) d\tau - \frac{k}{\gamma} \int L_{k-1}(\tau, \gamma) d\tau. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.25] \quad & \int \tau L_k(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{4}{\gamma} \sum_{\nu=0}^{k-1} \left(L_\nu(\tau, \gamma) \tau - \right. \\ & \left. - \int L_\nu(\tau, \gamma) d\tau \right) (-1)^{k+\nu} - \frac{2}{\gamma} \left(L_k(\tau, \gamma) \tau - \int L_k(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.26] \quad & \int L_k^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \int \tau L_k(\tau, \gamma) d\tau + \int L_{k-1}^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.27] \quad & \int L_k^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = -\frac{1}{2} \int \tau L_{k+1}(\tau, \gamma) d\tau + \frac{1}{\gamma} \int L_{k+1}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{1}{\gamma} \tau L_{k+1}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.28] \quad & \int \tau L_k^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = -\frac{k+1}{\gamma} \int L_{k+1}^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau + \frac{2(k+1)}{\gamma} \times \\ & \times \int L_k^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{k+1}{\gamma} \int L_{k-1}^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.29] \quad & \int L_k^{(2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \int \tau L_k^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau + \\ & + \int \tau L_{k-1}^{(2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.30] \quad & \int L_k^{(2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = -\frac{1}{2} \int \tau L_{k+1}^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau + \frac{2}{\gamma} \times \\ & \times \int L_{k+1}^{(1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{1}{\gamma} \tau^2 L_{k+1}^{(1)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.31] \quad & \int \tau L_k^{(2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = -\frac{k+1}{\gamma} \int L_{k+1}^{(2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau + \frac{2k+3}{\gamma} \times \\ & \times \int L_k^{(2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{k+2}{\gamma} \int L_{k-1}^{(2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.32] \quad & \int L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \int L_k^{(\alpha-1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(\alpha-1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau + \\ & + \int L_{k-1}^{(\alpha-1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(\alpha-1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.33] \quad & \int L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = -\frac{1}{2} \int \tau L_{k+1}^{(\alpha-1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(\alpha-1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau + \frac{\alpha}{\gamma} \times \\ & \times \int L_{k+1}^{(\alpha-1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(\alpha-1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{1}{\gamma} \tau^\alpha \times \\ & \times L_{k+1}^{(\alpha-1)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.34] \quad & \int \tau L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = -\frac{k+1}{\gamma} \int L_{k+1}^{(\alpha)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau + \\ & + \frac{2k+\alpha+1}{\gamma} \int L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{k+\alpha}{\gamma} \int L_{k-1}^{(\alpha)}(\tau, \gamma) \mu^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.35] \quad & \int P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2(4k-3)}{4k+1} \times \\ & \times \int P_{k-1}^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{(4k-7)}{4k+1} \int P_{k-2}^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{2}{\gamma(4k+1)} \left(P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) - P_{k-2}^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.36] \quad & \int \tau P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2(4k-3)}{4k+1} \times \\ & \times \int \tau P_{k-1}^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{(4k-7)}{4k+1} \times \\ & \times \int \tau P_{k-2}^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{2}{\gamma(4k+1)} \times \\ & \times \left(\left(P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) - P_{k-2}^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) \right) \tau - \right. \\ & \left. - \int P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau + \int P_{k-2}^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.37] \quad & \int \tau P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{4}{\gamma(4k+1)} \times \\ & \times \sum_{\nu=0}^{k-1} \left(P_\nu^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) \tau - \int P_\nu^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right) - \\ & - \frac{2}{\gamma(4k+1)} \left(P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) \tau - \int P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.38] \quad & \int Leg_k(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2(2k-1)}{2k+1} \int Leg_{k-1}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{(2k-3)}{2k+1} \int Leg_{k-2}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{1}{\gamma(2k+1)} \times \\ & \times \left(Leg_k(\tau, \gamma) - Leg_{k-2}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.39] \quad & \int \tau Leg_k(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2(2k-1)}{2k+1} \times \\ & \times \int \tau Leg_{k-1}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{(2k-3)}{2k+1} \int \tau Leg_{k-2}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{1}{\gamma(2k+1)} \left(\left(Leg_k(\tau, \gamma) - Leg_{k-2}(\tau, \gamma) \right) \tau - \right. \\ & \left. - \int Leg_k(\tau, \gamma) d\tau + \int Leg_{k-2}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.40] \quad & \int \tau Leg_k(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma(2k+1)} \times \\ & \times \sum_{\nu=0}^{k-1} \left(Leg_\nu(\tau, \gamma) \tau - \int Leg_\nu(\tau, \gamma) d\tau \right) - \\ & - \frac{1}{\gamma(2k+1)} \left(Leg_k(\tau, \gamma) \tau - \int Leg_k(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.41] \quad & \int P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2(4k-1)}{4k+3} \times \\ & \times \int P_{k-1}^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{(4k-5)}{4k+3} \int P_{k-2}^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{2}{\gamma(4k+3)} \left(P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) - P_{k-2}^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.42] \quad & \int \tau P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2(4k-1)}{4k+3} \times \\ & \times \int \tau P_{k-1}^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{(4k-5)}{4k+3} \int \tau P_{k-2}^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{2}{\gamma(4k+3)} \left(\left(P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) - P_{k-2}^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) \right) \tau - \right. \\ & \left. - \int P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau + \int P_{k-2}^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.43] \quad & \int \tau P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{4}{\gamma(4k+3)} \times \\ & \times \sum_{\nu=0}^{k-1} \left(P_\nu^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) \tau - \int P_\nu^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right) - \\ & - \frac{2}{\gamma(4k+3)} \left(P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) \tau - \int P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.44] \quad & \int P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2k}{k+1} \int P_{k-1}^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{(k-1)}{k+1} \int P_{k-2}^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{1}{\gamma(k+1)} \times \\ & \times \left(P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) - P_{k-2}^{(1,0)}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.45] \quad & \int \tau P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2k}{k+1} \int \tau P_{k-1}^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{k-1}{k+1} \int \tau P_{k-2}^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{1}{\gamma(k+1)} \left(\left(P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) - \right. \right. \\ & \left. \left. - P_{k-2}^{(1,0)}(\tau, \gamma) \right) \tau - \int P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau + \int P_{k-2}^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.46] \quad & \int \tau P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma(k+1)} \times \\ & \times \sum_{\nu=0}^{k-1} \left(P_\nu^{(1,0)}(\tau, \gamma) \tau - \int P_\nu^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right) - \\ & - \frac{1}{\gamma(k+1)} \left(P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) \tau - \int P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.47] \quad & \int P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2(2k+1)}{2k+3} \int P_{k-1}^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{(2k-1)}{2k+3} \int P_{k-2}^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{1}{\gamma(2k+3)} \times \\ & \times \left(P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) - P_{k-2}^{(2,0)}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.48] \quad & \int \tau P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2(2k+1)}{2k+3} \times \\ & \times \int \tau P_{k-1}^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{2k-1}{2k+3} \int \tau P_{k-2}^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{1}{\gamma(2k+3)} \left(\left(P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) - P_{k-2}^{(2,0)}(\tau, \gamma) \right) \tau - \right. \\ & \left. - \int P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau + \int P_{k-2}^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.49] \quad & \int \tau P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma(2k+3)} \times \\ & \times \sum_{\nu=0}^{k-1} \left(P_\nu^{(2,0)}(\tau, \gamma) \tau - \int P_\nu^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right) - \\ & - \frac{1}{\gamma(2k+3)} \left(P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) \tau - \int P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.50] \quad & \int P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2(\alpha+2k-1)}{\alpha+2k+1} \times \\ & \times \int P_{k-1}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{(\alpha+2k-3)}{\alpha+2k+1} \int P_{k-2}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{2}{c\gamma(\alpha+2k+1)} \left(P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) - P_{k-2}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.51] \quad & \int \tau P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = \frac{2(\alpha+2k-1)}{\alpha+2k+1} \times \\ & \times \int \tau P_{k-1}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \frac{\alpha+2k-3}{\alpha+2k+1} \int \tau P_{k-2}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau - \\ & - \frac{2}{c\gamma(\alpha+2k+1)} \left(\left(P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) - P_{k-2}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) \right) \tau - \right. \\ & \left. - \int P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau + \int P_{k-2}^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.52] \quad & \int \tau P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{4}{c\gamma(\alpha+2k+1)} \times \\ & \times \sum_{\nu=0}^{k-1} \left(P_\nu^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) \tau - \int P_\nu^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right) - \\ & - \frac{2}{c\gamma(\alpha+2k+1)} \left(P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) \tau - \int P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.53] \quad & \int P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \frac{1}{2} \left(\int Leg_{k+1}(\tau, \gamma) d\tau + \int Leg_k(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.54] \quad & \int \tau P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) \mu^{\{P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \frac{1}{2} \left(\int \tau Leg_{k+1}(\tau, \gamma) d\tau + \int \tau Leg_k(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.55] \quad & \int P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \frac{1}{2(2k+3)} \left((k+1) \int Leg_{k+2}(\tau, \gamma) d\tau + (2k+3) \times \right. \\ & \left. \times \int Leg_{k+1}(\tau, \gamma) d\tau + (k+2) \int Leg_k(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.56] \quad & \int \tau P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) \mu^{\{P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = \\ & = \frac{1}{2(2k+3)} \left((k+1) \int \tau Leg_{k+2}(\tau, \gamma) d\tau + (2k+3) \times \right. \\ & \left. \times \int \tau Leg_{k+1}(\tau, \gamma) d\tau + (k+2) \int \tau Leg_k(\tau, \gamma) d\tau \right). \end{aligned}$$

9.4 Рекуррентные соотношения для преобразований Фурье

$$\begin{aligned} [9.57] \quad & W_k^{\{L_k^{(\alpha+1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ & = \frac{1}{\gamma} \left(1 - W_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)(j\omega - \gamma/2) \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.58] \quad & W_k^{\{L_k^{(\alpha+1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ & = \frac{1}{\gamma} \left(1 + W_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \frac{\gamma}{2 \cos \varphi} \exp(-j\varphi) \right), \\ & \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.59] \quad & V_k^{\{L_k^{(\alpha+1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ & = \frac{\gamma}{(j\omega + \gamma/2)} V_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [9.60] \quad & V_k^{\{L_k^{(\alpha+1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ & = 2V_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \cos \varphi \exp(-j\varphi), \\ & \varphi = \arctan \frac{2\omega}{\gamma}. \end{aligned}$$

Глава 10

Соотношения взаимосвязи базисных функций

Определение.

Данные определения получены на основе представления функциональной характеристику k -того порядка $\vartheta_k(\tau, \gamma)$, связанной с $\psi_k(\tau, \gamma)$ в виде [7, 11, 5]

$$\vartheta_k(\tau, \gamma) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \beta_{k,\nu} \psi_{\nu}(\tau, \gamma),$$

где

$$\beta_{k,\nu} = \frac{1}{\|\psi_{\nu}(\gamma)\|^2} \int_0^{\infty} \vartheta_k(\tau, \gamma) \psi_{\nu}(\tau, \gamma) \mu^{\{\psi_{\nu}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau$$

– коэффициенты разложения ряда, и понятии расширенного соотношения ортогональности [5].

$$[10.1] \quad \int_0^{\infty} \vartheta_k(\tau, \gamma) \psi_{\nu}(\tau, \gamma) \mu^{\{\psi_{\nu}(\tau, \gamma)\}}(\tau, \gamma) d\tau = h_{k,\nu}(\gamma) \quad (k = 0..K, \nu = 0..K).$$

10.1 Соотношения взаимосвязи ортогональных функций

$$[10.2] \quad L_k^{(1)}(\tau, \gamma) = \sum_{\nu=0}^k L_{\nu}(\tau, \gamma).$$

$$[10.3] \quad L_k^{(2)}(\tau, \gamma) = \sum_{\nu=0}^k (k - \nu + 1) L_{\nu}(\tau, \gamma).$$

$$[10.4] \quad L_k(\tau, \gamma) = L_k^{(1)}(\tau, \gamma) - L_{k-1}^{(1)}(\tau, \gamma).$$

$$[10.5] \quad L_k^{(1)}(\tau, \gamma) = L_k^{(2)}(\tau, \gamma) - L_{k-1}^{(2)}(\tau, \gamma).$$

$$[10.6] \quad L_k^{(\alpha+1)}(\tau, \gamma) = \begin{cases} \sum_{\nu=0}^k L_{\nu}(\tau, \gamma), & \text{если } \alpha = 0; \\ \sum_{\nu=0}^k L_{\nu}(\tau, \gamma) \prod_{p=0}^{\alpha-1} \frac{k+p+1-\nu}{p+1}, & \text{если } \alpha > 0, \end{cases}$$

$$[10.7] \quad P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) = \frac{1}{k+1} \sum_{\nu=0}^k (2\nu+1)(-1)^{k+\nu} Leg_{\nu}(\tau, \gamma).$$

$$[10.8] \quad P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) = \begin{aligned} &= \frac{1}{(k+1)(k+2)} \sum_{\nu=0}^k (2\nu+1)(-1)^{k+\nu} Leg_{\nu}(\tau, \gamma) \times \\ &\quad \times ((k+1)(k+2) - \nu(\nu+1)). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.9] \quad Leg_k(\tau, \gamma) &= \frac{(k+1)}{2k+1} P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) + \\ &\quad + \frac{k}{2k+1} P_{k-1}^{(0,1)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.10] \quad P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma) &= \frac{(k+2)}{2(k+1)} P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma) + \\ &\quad + \frac{k}{2(k+1)} P_{k-1}^{(0,2)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.11] \quad P_k^{*(0,\beta+1)}(\tau, \gamma) &= \frac{(-1)^k}{k+1} \times \\ &\quad \times \begin{cases} \sum_{\nu=0}^k (2\nu+1)(-1)^\nu Leg_\nu(\tau, \gamma), & \text{если } \beta = 0; \\ \sum_{\nu=0}^k (2\nu+1)(-1)^\nu Leg_\nu(\tau, \gamma) \times \\ \times \prod_{p=0}^{\beta-1} \frac{(k+p+1-\nu)(k+p+2+\nu)}{(p+1)(k+p+2)}, & \text{если } \beta > 0, \end{cases} \\ &\quad \beta \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

10.2 Соотношения взаимосвязи ортогональных функций и производных ортогональных функций

$$[10.12] \quad \frac{\partial L_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \sum_{\nu=0}^{k-1} L_\nu(\tau, \gamma) - \frac{\gamma}{2} L_k(\tau, \gamma).$$

$$[10.13] \quad \frac{\partial L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \sum_{\nu=0}^{k-1} L_\nu^{(1)}(\tau, \gamma) - \frac{\gamma}{2} L_k^{(1)}(\tau, \gamma).$$

$$\begin{aligned} [10.14] \quad \frac{\partial L_k^{(1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{\gamma}{2} \sum_{\nu=0}^{k-1} (2(k-\nu)+1) L_\nu(\tau, \gamma) - \\ &\quad - \frac{\gamma}{2} L_k(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$[10.15] \quad \frac{\partial L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \sum_{\nu=0}^{k-1} L_\nu^{(2)}(\tau, \gamma) - \frac{\gamma}{2} L_k^{(2)}(\tau, \gamma).$$

$$\begin{aligned} [10.16] \quad \frac{\partial L_k^{(2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{\gamma}{2} \sum_{\nu=0}^{k-1} (k-\nu+1)^2 L_\nu(\tau, \gamma) - \\ &\quad - \frac{\gamma}{2} L_k(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$[10.17] \quad \frac{\partial L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} = -\gamma \sum_{\nu=0}^{k-1} L_\nu^{(\alpha)}(\tau, \gamma) - \frac{\gamma}{2} L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma).$$

$$\begin{aligned} [10.18] \quad \frac{\partial P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\gamma \sum_{\nu=0}^{k-1} (4\nu+1)(-1)^{k+\nu} \times \\ &\quad \times P_\nu^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) - \frac{\gamma(4k+1)}{2} P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.19] \quad \frac{\partial Leg_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -2\gamma \sum_{\nu=0}^{k-1} (2\nu+1)(-1)^{k+\nu} \times \\ &\quad \times Leg_\nu(\tau, \gamma) - \gamma(2k+1) Leg_k(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.20] \quad \frac{\partial P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\gamma \sum_{\nu=0}^{k-1} (4\nu+3)(-1)^{k+\nu} \times \\ &\quad \times P_\nu^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) - \frac{\gamma(4k+3)}{2} P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.21] \quad \frac{\partial P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -2\gamma \sum_{\nu=0}^{k-1} (\nu+1)(-1)^{k+\nu} \times \\ &\quad \times P_\nu^{(1,0)}(\tau, \gamma) - \gamma(k+1) P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.22] \quad \frac{\partial P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -2\gamma \sum_{\nu=0}^{k-1} (2\nu+3)(-1)^{k+\nu} \times \\ &\quad \times P_\nu^{(2,0)}(\tau, \gamma) - \gamma(2k+3) P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.23] \quad \frac{\partial P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -c\gamma \sum_{\nu=0}^{k-1} (\alpha+2\nu+1)(-1)^{k+\nu} \times \\ &\quad \times P_\nu^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) - c\gamma/2(\alpha+2k+1) P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.24] \quad \frac{\partial P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{4\gamma}{(k+1)} \sum_{\nu=0}^{k-1} (\nu+1)^2 (-1)^{k+\nu} \times \\ &\quad \times P_\nu^{(0,1)}(\tau, \gamma) - \gamma(2k+1) P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.25] \quad \frac{\partial P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{\gamma}{(k+1)} \sum_{\nu=0}^{k-1} \left(2k(k+1) - \right. \\ &\quad \left. - 2\nu(\nu+1) + 2k+1 \right) (-1)^{k+\nu} (2\nu+1) Leg_\nu(\tau, \gamma) - \\ &\quad - \frac{\gamma(2k+1)^2}{(k+1)} Leg_k(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.26] \quad \frac{\partial P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{2\gamma}{(k+1)(k+2)} \sum_{\nu=0}^{k-1} (\nu+1) \times \\ &\quad \times (\nu+2)(-1)^{k+\nu} (2\nu+3) P_\nu^{(0,2)}(\tau, \gamma) - \\ &\quad - \gamma(2k+1) P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [10.27] \quad \frac{\partial P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)}{\partial \tau} &= -\frac{\gamma}{(k+1)(k+2)} \times \\ &\quad \times \sum_{\nu=0}^{k-1} \left((k+1)(k+2)(k(k+3)+1) - (2k(k+3)+3) \right. \\ &\quad \left. \times \nu(\nu+1) + \nu^2(\nu+1)^2 \right) (-1)^{k+\nu} (2\nu+1) Leg_\nu(\tau, \gamma) - \\ &\quad - \frac{2\gamma(2k+1)^2}{(k+2)} Leg_k(\tau, \gamma). \end{aligned}$$

10.3 Соотношения взаимосвязи ортогональных функций и неопределенных интегралов от ортогональных функций

$$[10.28] \quad \int L_k(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{4}{\gamma} \sum_{\nu=0}^{k-1} (-1)^{k+\nu} L_\nu(\tau, \gamma) - \frac{2}{\gamma} L_k(\tau, \gamma).$$

$$[10.29] \quad \int P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{4}{\gamma(4k+1)} \times \\ \times \sum_{\nu=0}^{k-1} P_\nu^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma) - \frac{2}{\gamma(4k+1)} P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma).$$

$$[10.30] \quad \int Leg_k(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma(2k+1)} \sum_{\nu=0}^{k-1} Leg_\nu(\tau, \gamma) - \frac{1}{\gamma(2k+1)} Leg_k(\tau, \gamma).$$

$$[10.31] \quad \int P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{4}{\gamma(4k+3)} \times \\ \times \sum_{\nu=0}^{k-1} P_\nu^{(1/2,0)}(\tau, \gamma) - \frac{2}{\gamma(4k+3)} P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma).$$

$$[10.32] \quad \int P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma(k+1)} \sum_{\nu=0}^{k-1} P_\nu^{(1,0)}(\tau, \gamma) - \frac{1}{\gamma(k+1)} P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma).$$

$$[10.33] \quad \int P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{2}{\gamma(2k+3)} \sum_{\nu=0}^{k-1} P_\nu^{(2,0)}(\tau, \gamma) - \frac{1}{\gamma(2k+3)} P_k^{(2,0)}(\tau, \gamma).$$

$$[10.34] \quad \int P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) d\tau = -\frac{4}{c\gamma(\alpha+2k+1)} \times \\ \times \sum_{\nu=0}^{k-1} P_\nu^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma) - \frac{2}{c\gamma(\alpha+2k+1)} P_k^{(\alpha,0)}(\tau, \gamma).$$

10.4 Соотношения взаимосвязи преобразований Фурье

$$[10.35] \quad W_k^{\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \sum_{\nu=0}^k W_\nu^{\{L_\nu(\tau, \gamma)\}}(j\omega).$$

$$[10.36] \quad W_k^{\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \sum_{\nu=0}^k (k-\nu+1) W_\nu^{\{L_\nu(\tau, \gamma)\}}(j\omega).$$

$$[10.37] \quad W_k^{\{L_k^{(\alpha+1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \\ = \begin{cases} \sum_{\nu=0}^k W_\nu^{\{L_\nu(\tau, \gamma)\}}(j\omega), & \text{если } \alpha = 0; \\ \sum_{\nu=0}^k W_\nu^{\{L_\nu(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \prod_{p=0}^{\alpha-1} \frac{k+p+1-\nu}{p+1}, & \text{если } \alpha > 0, \end{cases}$$

$\alpha \in \mathbb{N}_0.$

$$[10.38] \quad W_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{k+1} \sum_{\nu=0}^k (2\nu+1) \times \\ \times (-1)^{k+\nu} W_\nu^{\{Leg_\nu(\tau, \gamma)\}}(j\omega).$$

$$[10.39] \quad W_k^{\{P_k^{(0,2)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{1}{(k+1)(k+2)} \times \\ \times \sum_{\nu=0}^k (2\nu+1)(-1)^{k+\nu} ((k+1)(k+2)-\nu(\nu+1)) \times \\ \times W_\nu^{\{Leg_\nu(\tau, \gamma)\}}(j\omega).$$

$$[10.40] \quad W_k^{\{P_k^{(0,\beta)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega) = \frac{(-1)^k}{k+1} \times \\ \times \begin{cases} \sum_{\nu=0}^k (2\nu+1)(-1)^\nu W_\nu^{\{Leg_\nu(\tau, \gamma)\}}(j\omega), & \text{если } \beta = 0; \\ \sum_{\nu=0}^k (2\nu+1)(-1)^\nu W_\nu^{\{Leg_\nu(\tau, \gamma)\}}(j\omega) \times \\ \times \prod_{p=0}^{\beta-1} \frac{(k+p+1-\nu)(k+p+2+\nu)}{(p+1)(k+p+2)}, & \text{если } \beta > 0, \end{cases}$$

$\beta \in \mathbb{N}_0.$

Глава 11

Обобщенные характеристики ортогональных функций

Определение.

По аналогии с известными определениями длительности и моментных характеристик введены следующие понятия:

– длительности ортогональных функций во временной области [6]

$$\tau_k^{(2)\{\psi_k(\tau,\gamma)\}} = \frac{\int_0^\infty \psi_k(\tau, \gamma) d\tau}{|\psi_k(0, \gamma)|};$$

$$\tau_k^{(4)\{\psi_k(\tau,\gamma)\}} = \frac{\int_0^\infty (\psi_k(\tau, \gamma))^2 d\tau}{(\psi_k(0, \gamma))^2};$$

– длительности ортогональных функций в частотной области

$$\Delta\omega_k^{(2)\{\text{Re}W_k^{\{\psi_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\int_0^\infty \text{Re}W_k^{\{\psi_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega) d\omega}{|\text{Re}W_k^{\{\psi_k(\tau,\gamma)\}}(0)|};$$

$$\Delta\omega_k^{(4)\{\text{Re}W_k^{\{\psi_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\int_0^\infty (\text{Re}W_k^{\{\psi_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega))^2 d\omega}{(\text{Re}W_k^{\{\psi_k(\tau,\gamma)\}}(0))^2};$$

– моментные характеристики во временной области [6, 14]

$$\mu_k^{(n)[1]\{\psi_k(\tau,\gamma)\}} = \int_0^\infty \tau^n \psi_k(\tau, \gamma) d\tau;$$

$$\mu_k^{(n)[2]\{\psi_k(\tau, \gamma)\}} = j^n \frac{d^n W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{d\omega^n} \Big|_{j\omega=0};$$

— моментные характеристики в частотной области

$$\mu_k^{(n)[1]\{W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \int_0^\infty \omega^n W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega;$$

$$\mu_k^{(n)[2]\{W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2} (-1)^n \left. \frac{\partial^n \psi_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} \right|_{\tau=0}.$$

11.1 Длительности ортогональных функций во временной области

$$[11.1] \quad \tau_k^{(2)\{L_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{2(-1)^k}{\gamma}, \\ k = 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$[11.2] \quad \tau_k^{(4)\{L_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{\gamma}.$$

$$[11.3] \quad \tau_k^{(2)\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{2((k+1) \bmod 2)}{\gamma(k+1)}, \\ k = 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$[11.4] \quad \tau_k^{(4)\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{\gamma(k+1)}.$$

$$[11.5] \quad \tau_k^{(2)\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{4((k+2) \text{ div } 2)}{\gamma(k+1)(k+2)}.$$

$$[11.6] \quad \tau_k^{(4)\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{2(2k+3)}{3\gamma(k+1)(k+2)}.$$

$$[11.7] \quad \tau_k^{(2)\{P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{2}{\gamma(4k+1)}.$$

$$[11.8] \quad \tau_k^{(4)\{P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{\gamma(4k+1)}.$$

$$[11.9] \quad \tau_k^{(2)\{Leg_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{\gamma(2k+1)}.$$

$$[11.10] \quad \tau_k^{(4)\{Leg_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{2\gamma(2k+1)}.$$

$$[11.11] \quad \tau_k^{(2)\{P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{2}{\gamma(4k+3)}.$$

$$[11.12] \quad \tau_k^{(4)\{P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{\gamma(4k+3)}.$$

$$[11.13] \quad \tau_k^{(2)\{P_k^{(1, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{\gamma(k+1)}.$$

$$[11.14] \quad \tau_k^{(4)\{P_k^{(1, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{2\gamma(k+1)}.$$

$$[11.15] \quad \tau_k^{(2)\{P_k^{(2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{\gamma(2k+3)}.$$

$$[11.16] \quad \tau_k^{(4)\{P_k^{(2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{2\gamma(2k+3)}.$$

$$[11.17] \quad \tau_k^{(2)\{P_k^{(0, 1)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{((k+1) \bmod 2)}{\gamma(k+1)^2}, \\ k = 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$[11.18] \quad \tau_k^{(4)\{P_k^{(0, 1)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{2\gamma(k+1)^2}.$$

$$[11.19] \quad \tau_k^{(2)\{P_k^{(0, 2)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{4(-1)^k ((k+2) \text{ div } 2)^2}{\gamma(k+1)^2(k+2)^2}, \\ k = 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$[11.20] \quad \tau_k^{(4)\{P_k^{(0, 2)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{2((k+1)(k+2)+1)}{3\gamma(k+1)^2(k+2)^2}.$$

11.2 Моментные характеристики ортогональных функций во временной области

$$[11.21] \quad \mu_k^{(0)\{L_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{2(-1)^k}{\gamma}.$$

$$[11.22] \quad \mu_k^{(1)\{L_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{4(-1)^k (2k+1)}{\gamma^2}.$$

$$[11.23] \quad \mu_k^{(2)\{L_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{8(-1)^k ((2k+1)^2 + 1)}{\gamma^3}.$$

$$[11.24] \quad \mu_k^{(3)\{L_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{16(-1)^k ((2k+1)^3 + 5(2k+1))}{\gamma^4}.$$

$$[11.25] \quad \mu_k^{(n)\{L_k(\tau, \gamma)\}} = n! \left(\frac{2}{\gamma} \right)^{n+1} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{s+n}{s} (-2)^s.$$

$$[11.26] \quad \mu_k^{(0)\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{2((k+1) \bmod 2)}{\gamma}.$$

$$[11.27] \quad \mu_k^{(1)\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{4(-1)^k (k+1)}{\gamma^2}.$$

$$[11.28] \quad \mu_k^{(2)\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{16(-1)^k (k+1)^2}{\gamma^3}.$$

$$[11.29] \quad \mu_k^{(3)\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{16}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} (-2)^s (s+1)(s+2)(s+3).$$

$$[11.30] \quad \mu_k^{(n)\{L_k^{(1)}(\tau, \gamma)\}} = n! \left(\frac{2}{\gamma} \right)^{n+1} \sum_{s=0}^k \binom{k+1}{k-s} \binom{s+n}{s} (-2)^s.$$

$$[11.31] \quad \mu_k^{(0)\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{2((k+2) \text{ div } 2)}{\gamma}.$$

$$[11.32] \quad \mu_k^{(1)\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{4(-1)^k ((k+2) \text{ div } 2)}{\gamma^2}.$$

$$[11.33] \quad \mu_k^{(2)\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{8(-1)^k (k+1)(k+2)}{\gamma^3}.$$

$$[11.34] \quad \mu_k^{(3)\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{16}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} (s+1)(s+2)(s+3)(-2)^s.$$

$$[11.35] \quad \mu_k^{(n)\{L_k^{(2)}(\tau, \gamma)\}} = n! \left(\frac{2}{\gamma} \right)^{n+1} \sum_{s=0}^k \binom{k+2}{k-s} \binom{s+n}{s} (-2)^s.$$

$$[11.36] \quad \mu_k^{(0)\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{2}{\gamma} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} (-2)^s.$$

$$[11.37] \quad \mu_k^{(1)\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{4}{\gamma^2} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} (-2)^s (s+1).$$

$$[11.38] \quad \mu_k^{(2)\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{8}{\gamma^3} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} (-2)^s (s+1)(s+2).$$

$$[11.39] \quad \mu_k^{(3)\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{16}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} (-2)^s (s+1)(s+2)(s+3).$$

$$[11.40] \quad \mu_k^{(n)\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}} = n! \left(\frac{2}{\gamma} \right)^{n+1} \sum_{s=0}^k \binom{k+\alpha}{k-s} \binom{s+n}{s} (-2)^s.$$

$$[11.41] \quad \mu_k^{(0)\{P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{2}{\gamma(4k+1)}.$$

$$[11.42] \quad \mu_k^{(1)\{P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{4}{\gamma^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+1)^2}.$$

$$[11.43] \quad \mu_k^{(2)\{P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{16}{\gamma^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+1)^3}.$$

$$[11.44] \quad \mu_k^{(3)\{P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{96}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+1)^4}.$$

$$[11.45] \quad \mu_k^{(n)\{P_k^{(-1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = n! \left(\frac{2}{\gamma} \right)^{n+1} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+1)^{n+1}}.$$

$$[11.46] \quad \mu_k^{(0)\{Leg_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{\gamma(2k+1)}.$$

$$[11.47] \quad \mu_k^{(1)\{Leg_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{1}{\gamma^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^2}.$$

$$[11.48] \quad \mu_k^{(2)\{Leg_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{2}{\gamma^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^3}.$$

$$[11.49] \quad \mu_k^{(3)\{Leg_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{6}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^4}.$$

$$[11.50] \quad \mu_k^{(n)\{Leg_k(\tau, \gamma)\}} = \frac{n!}{\gamma^{n+1}} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^{n+1}}.$$

$$[11.51] \quad \mu_k^{(0)\{P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{2}{\gamma(4k+3)}.$$

$$[11.52] \quad \mu_k^{(1)\{P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{4}{\gamma^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+3)^2}.$$

$$[11.53] \quad \mu_k^{(2)\{P_k^{(1/2, 0)}(\tau, \gamma)\}} = \frac{16}{\gamma^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+3)^3}.$$

$$[11.54] \quad \mu_k^{(3)\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{96}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+3)^4}.$$

$$[11.55] \quad \mu_k^{(n)\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = n! \left(\frac{2}{\gamma} \right)^{n+1} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s \frac{1}{(4s+3)^{n+1}}.$$

$$[11.56] \quad \mu_k^{(0)\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}} = \frac{1}{\gamma(k+1)}.$$

$$[11.57] \quad \mu_k^{(1)\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{1}{\gamma^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \frac{1}{(s+1)^2}.$$

$$[11.58] \quad \mu_k^{(2)\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{2}{\gamma^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \frac{1}{(s+1)^3}.$$

$$[11.59] \quad \mu_k^{(3)\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{6}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \frac{1}{(s+1)^4}.$$

$$[11.60] \quad \mu_k^{(n)\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{n!}{\gamma^{n+1}} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s \frac{1}{(s+1)^{n+1}}.$$

$$[11.61] \quad \mu_k^{(0)\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}} = \frac{1}{\gamma(2k+3)}.$$

$$[11.62] \quad \mu_k^{(1)\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{1}{\gamma^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \frac{1}{(2s+3)^2}.$$

$$[11.63] \quad \mu_k^{(2)\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{2}{\gamma^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \frac{1}{(2s+3)^3}.$$

$$[11.64] \quad \mu_k^{(3)\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{6}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \frac{1}{(2s+3)^4}.$$

$$[11.65] \quad \mu_k^{(n)\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{n!}{\gamma^{n+1}} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s \frac{1}{(2s+3)^{n+1}}.$$

$$[11.66] \quad \mu_k^{(0)\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}} = \frac{2}{c\gamma(2k+\alpha+1)}.$$

$$[11.67] \quad \mu_k^{(1)\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{4}{c^2\gamma^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \frac{1}{(2s+\alpha+1)^2}.$$

$$[11.68] \quad \mu_k^{(2)\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{16}{c^3\gamma^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \frac{1}{(2s+\alpha+1)^3}.$$

$$[11.69] \quad \mu_k^{(3)\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{96}{c^4\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \frac{1}{(2s+\alpha+1)^4}.$$

$$[11.70] \quad \mu_k^{(n)\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{2^{n+1}n!}{(c\gamma)^{n+1}} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s \frac{1}{(2s+\alpha+1)^{n+1}}.$$

$$[11.71] \quad \mu_k^{(0)\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{1}{\gamma} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)}.$$

$$[11.72] \quad \mu_k^{(1)\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{1}{\gamma^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^2}.$$

$$[11.73] \quad \mu_k^{(2)\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{2}{\gamma^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^3}.$$

$$[11.74] \quad \mu_k^{(3)\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{6}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^4}.$$

$$[11.75] \quad \mu_k^{(n)\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}} = \\ = \frac{n!}{\gamma^{n+1}} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^{n+1}}.$$

$$\begin{aligned} [11.76] \quad \mu_k^{(0)\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}} &= \\ &= \frac{1}{\gamma} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.77] \quad \mu_k^{(1)\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}} &= \\ &= \frac{1}{\gamma^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.78] \quad \mu_k^{(2)\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}} &= \\ &= \frac{2}{\gamma^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.79] \quad \mu_k^{(3)\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}} &= \\ &= \frac{6}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^4}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.80] \quad \mu_k^{(n)\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}} &= \\ &= \frac{n!}{\gamma^{n+1}} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^{n+1}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.81] \quad \mu_k^{(0)\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}} &= \\ &= \frac{1}{\gamma} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.82] \quad \mu_k^{(1)\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}} &= \\ &= \frac{1}{\gamma^2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.83] \quad \mu_k^{(2)\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}} &= \\ &= \frac{2}{\gamma^3} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.84] \quad \mu_k^{(3)\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}} &= \\ &= \frac{6}{\gamma^4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^4}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.85] \quad \mu_k^{(n)\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}} &= \\ &= \frac{n!}{\gamma^{n+1}} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s \frac{1}{(2s+1)^{n+1}}. \end{aligned}$$

11.3 Длительности ортогональных функций в частотной области

$$\begin{aligned} [11.86] \quad \Delta\omega_k^{(2)\{\text{Re}W_k^{\{L_k^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} &= \frac{\pi\gamma(k+1)}{4((k+1) \bmod 2)}, \\ k &= 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.87] \quad \Delta\omega_k^{(4)\{\text{Re}W_k^{\{L_k^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} &= \\ &= \frac{\pi\gamma(k+1)}{8((k+1) \bmod 2)^2}, \quad k = 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

$$[11.88] \quad \Delta\omega_k^{(2)\{\text{Re}W_k^{\{L_k^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma(k+1)(k+2)}{8((k+2) \bmod 2)}.$$

$$\begin{aligned} [11.89] \quad \Delta\omega_k^{(4)\{\text{Re}W_k^{\{L_k^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} &= \\ &= \frac{\pi\gamma(2k+3)(k+1)(k+2)}{4((k+2) \bmod 2)^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [11.90] \quad \Delta\omega_k^{(2)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} &= \\ &= \frac{\pi\gamma(-1)^k(4k+1)}{4}, \quad k = 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

$$[11.91] \quad \Delta\omega_k^{(4)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma(4k+1)}{8}.$$

$$\begin{aligned} [11.92] \quad \Delta\omega_k^{(2)\{\text{Re}W_k^{\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} &= \frac{\pi\gamma(-1)^k(2k+1)}{2}, \\ k &= 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

$$[11.93] \quad \Delta\omega_k^{(4)\{\text{Re}W_k^{\{Leg_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma(2k+1)}{4}.$$

$$\begin{aligned} [11.94] \quad \Delta\omega_k^{(2)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} &= \\ &= \frac{\pi\gamma(-1)^k(4k+3)}{4}, \quad k = 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

$$[11.95] \quad \Delta\omega_k^{(4)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma(4k+3)}{8}.$$

$$\begin{aligned} [11.96] \quad \Delta\omega_k^{(2)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} &= \frac{\pi\gamma(-1)^k(k+1)}{2}, \\ k &= 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

$$[11.97] \quad \Delta\omega_k^{(4)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma(k+1)}{4}.$$

$$\begin{aligned} [11.98] \quad \Delta\omega_k^{(2)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} &= \\ &= \frac{\pi\gamma(-1)^k(2k+3)}{2}, \quad k = 0, 2, 4, \dots, 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

$$[11.99] \Delta\omega_k^{(4)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma(2k+3)}{4}.$$

$$[11.100] \Delta\omega_k^{(2)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma(k+1)^2}{2((k+1) \bmod 2)}, k=0,2,4,\dots 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$[11.101] \Delta\omega_k^{(4)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma(k+1)^2}{4((k+1) \bmod 2)^2}, k=0,2,4,\dots 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$[11.102] \Delta\omega_k^{(2)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma(-1)^k(k+1)^2(k+2)^2}{8((k+2) \text{ div } 2)^2}, \\ k=0,2,4,\dots 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$[11.103] \Delta\omega_k^{(4)\{\text{Re}W_k^{\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma((k+1)(k+2)+1)(k+1)^2(k+2)^2}{48((k+2) \text{ div } 2)^4}, \\ k=0,2,4,\dots 2n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

11.4 Моментные характеристики ортогональных функций в частотной области

$$[11.104] \mu_k^{(0)\{W_k^{\{L_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2}.$$

$$[11.105] \mu_k^{(1)\{W_k^{\{L_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma(2k+1)}{4}.$$

$$[11.106] \mu_k^{(2)\{W_k^{\{L_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma^2((2k+1)^2+1)}{16}.$$

$$[11.107] \mu_k^{(3)\{W_k^{\{L_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^3((2k+1)^3+5(2k+1))}{96}.$$

$$[11.108] \mu_k^{(n)\{W_k^{\{L_k(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma^n}{2} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \binom{k}{n-j}, & \text{если } k-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[11.109] \mu_k^{(0)\{W_k^{\{L_k^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi(k+1)}{2}.$$

$$[11.110] \mu_k^{(1)\{W_k^{\{L_k^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma(k+1)^2}{4}.$$

$$[11.111] \mu_k^{(2)\{W_k^{\{L_k^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^2(k+1)(2k^2+4k+3)}{24}.$$

$$[11.112] \mu_k^{(3)\{W_k^{\{L_k^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^3(k+1)^2(k^2+2k+3)}{48}.$$

$$[11.113] \mu_k^{(n)\{W_k^{\{L_k^{(1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma^n}{2} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \binom{k+1}{n-j+1}, & \text{если } k-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[11.114] \mu_k^{(0)\{W_k^{\{L_k^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi(k+1)(k+2)}{4}.$$

$$[11.115] \mu_k^{(1)\{W_k^{\{L_k^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma(k+1)(k+2)(2k+3)}{24}.$$

$$[11.116] \mu_k^{(2)\{W_k^{\{L_k^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^2(k+1)(k+2)(k^2+3k+3)}{48}.$$

$$[11.117] \mu_k^{(3)\{W_k^{\{L_k^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^3(k+1)(k+2)(2k+3)(k^2+3k+5)}{480}.$$

$$[11.118] \mu_k^{(n)\{W_k^{\{L_k^{(2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma^n}{2} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \binom{k+2}{n-j+2}, & \text{если } k-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[11.119] \mu_k^{(0)\{W_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{4} \binom{k+\alpha}{k}.$$

$$[11.120] \mu_k^{(1)\{W_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma}{2} \sum_{j=0}^1 \binom{1}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \binom{k+2}{3-j}, & \text{если } k-1+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[11.121] \mu_k^{(2)\{W_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma^2}{2} \sum_{j=0}^2 \binom{2}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \binom{k+2}{4-j}, & \text{если } k-2+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[11.122] \quad \mu_k^{(3)\{W_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma^3}{2} \sum_{j=0}^3 \binom{3}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \binom{k+2}{5-j}, & \text{если } k-3+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[11.123] \quad \mu_k^{(n)\{W_k^{\{L_k^{(\alpha)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi\gamma^n}{2} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 2^{-j} \times \\ \times \begin{cases} \binom{k+2}{n-j+2}, & \text{если } k-n+j \geq 0; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$[11.124] \quad \mu_k^{(0)\{W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2} (-1)^k.$$

$$[11.125] \quad \mu_k^{(1)\{W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma}{4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s (4s+1).$$

$$[11.126] \quad \mu_k^{(2)\{W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^2}{8} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s (4s+1)^2.$$

$$[11.127] \quad \mu_k^{(3)\{W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^3}{16} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s (4s+1)^3.$$

$$[11.128] \quad \mu_k^{(n)\{W_k^{\{P_k^{(-1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi(\gamma/2)^n}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s-1/2}{s-1/2} (-1)^s (4s+1)^n.$$

$$[11.129] \quad \mu_k^{(0)\{W_k^{\{Leg_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2} (-1)^k.$$

$$[11.130] \quad \mu_k^{(1)\{W_k^{\{Leg_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s (2s+1).$$

$$[11.131] \quad \mu_k^{(2)\{W_k^{\{Leg_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^2}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s (2s+1)^2.$$

$$[11.132] \quad \mu_k^{(3)\{W_k^{\{Leg_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^3}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s (2s+1)^3.$$

$$[11.133] \quad \mu_k^{(n)\{W_k^{\{Leg_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^n}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s}{s} (-1)^s (2s+1)^n.$$

$$[11.134] \quad \mu_k^{(0)\{W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2} (-1)^k.$$

$$[11.135] \quad \mu_k^{(1)\{W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma}{4} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s (4s+3).$$

$$[11.136] \quad \mu_k^{(2)\{W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^2}{8} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s (4s+3)^2.$$

$$[11.137] \quad \mu_k^{(3)\{W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^3}{16} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s (4s+3)^3.$$

$$[11.138] \quad \mu_k^{(n)\{W_k^{\{P_k^{(1/2,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi(\gamma/2)^n}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1/2}{s+1/2} (-1)^s (4s+3)^n.$$

$$[11.139] \quad \mu_k^{(0)\{W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2} (-1)^k.$$

$$[11.140] \quad \mu_k^{(1)\{W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s (s+1).$$

$$[11.141] \quad \mu_k^{(2)\{W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^2}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s (s+1)^2.$$

$$[11.142] \quad \mu_k^{(3)\{W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^3}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s (s+1)^3.$$

$$[11.143] \quad \mu_k^{(n)\{W_k^{\{P_k^{(1,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^n}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s+1} (-1)^s (s+1)^n.$$

$$[11.144] \quad \mu_k^{(0)\{W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2} (-1)^k.$$

$$[11.145] \quad \mu_k^{(1)\{W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s (2s+3).$$

$$[11.146] \quad \mu_k^{(2)\{W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^2}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s (2s+3)^2.$$

$$[11.147] \quad \mu_k^{(3)\{W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^3}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s (2s+3)^3.$$

$$[11.148] \quad \mu_k^{(n)\{W_k^{\{P_k^{(2,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^n}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s+2} (-1)^s (2s+3)^n.$$

$$[11.149] \quad \mu_k^{(0)\{W_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2} (-1)^k.$$

$$[11.150] \quad \mu_k^{(1)\{W_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi c\gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s (2s+\alpha+1).$$

$$[11.151] \quad \mu_k^{(2)\{W_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi c^2\gamma^2}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s (2s+\alpha+1)^2.$$

$$[11.152] \quad \mu_k^{(3)\{W_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi c^3\gamma^3}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s (2s+\alpha+1)^3.$$

$$[11.153] \quad \mu_k^{(n)\{W_k^{\{P_k^{(\alpha,0)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi c^n\gamma^n}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\alpha}{s+\alpha} (-1)^s (2s+\alpha+1)^n.$$

$$[11.154] \quad \mu_k^{(0)\{W_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2} (-1)^k.$$

$$[11.155] \quad \mu_k^{(1)\{W_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s (2s+1).$$

$$[11.156] \quad \mu_k^{(2)\{W_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^2}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s (2s+1)^2.$$

$$[11.157] \quad \mu_k^{(3)\{W_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^3}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s (2s+1)^3.$$

$$[11.158] \quad \mu_k^{(n)\{W_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^n}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+1}{s} (-1)^s (2s+1)^n.$$

$$[11.159] \quad \mu_k^{(0)\{W_k^{\{P_k^{(0,1)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2} (-1)^k.$$

$$[11.160] \quad \mu_k^{(1)\{W_k^{\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s (2s+1).$$

$$[11.161] \quad \mu_k^{(2)\{W_k^{\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^2}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s (2s+1)^2.$$

$$[11.162] \quad \mu_k^{(3)\{W_k^{\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^3}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s (2s+1)^3.$$

$$[11.163] \quad \mu_k^{(n)\{W_k^{\{P_k^{(0,2)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi\gamma^n}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+2}{s} (-1)^s (2s+1)^n.$$

$$[11.164] \quad \mu_k^{(0)\{W_k^{\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2} (-1)^k.$$

$$[11.165] \quad \mu_k^{(1)\{W_k^{\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi c \gamma}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s (2s+1).$$

$$[11.166] \quad \mu_k^{(2)\{W_k^{\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi c^2 \gamma^2}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s (2s+1)^2.$$

$$[11.167] \quad \mu_k^{(3)\{W_k^{\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi c^3 \gamma^3}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s (2s+1)^3.$$

$$[11.168] \quad \mu_k^{(n)\{W_k^{\{P_k^{(0,\beta)}(\tau,\gamma)\}}(j\omega)\}} = \\ = \frac{\pi c^n \gamma^n}{2} \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \binom{k+s+\beta}{s} (-1)^s (2s+1)^n.$$

Глава 12

Соотношения неопределенности

Определение.

На основе понятий длительности ортогональных функций во временной и частотной областях, приведенных в Главе 11, получены соотношения неопределенности.

$$[12.1] \int_0^\infty (\psi_k(\tau, \gamma))^2 d\tau = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty (\operatorname{Re} W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega))^2 d\omega.$$

$$[12.2] \tau_k^{(2)\{\psi_k(\tau, \gamma)\}} \Delta\omega_k^{(2)\{\operatorname{Re} W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}} = \frac{\pi}{2}.$$

$$[12.3] \tau_k^{(4)\{\psi_k(\tau, \gamma)\}} \frac{(\Delta\omega_k^{(2)\{\operatorname{Re} W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}})^2}{\Delta\omega_k^{(4)\{\operatorname{Re} W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)\}}} = \frac{\pi}{2}.$$

$$[12.4] \int_0^\infty \tau^n \psi_k(\tau, \gamma) d\tau = j^n \left. \frac{d^n W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega)}{d\omega^n} \right|_{j\omega=0}.$$

$$[12.5] \int_0^\infty \omega^n W_k^{\{\psi_k(\tau, \gamma)\}}(j\omega) d\omega = \\ = \frac{\pi}{2} (-1)^n \left. \frac{\partial^n \psi_k(\tau, \gamma)}{\partial \tau^n} \right|_{\tau=0}.$$

Список использованных источников

- 1 *Ван дер Поль, Б.* Операционное исчисление на основе двустороннего преобразования Лапласа: пер. с англ./Б. Ван дер Поль, Х. Бреммер.— М.: издательство иностранной литературы, 1952.—506 с.
- 2 *Геронимус, Я.Л.* Теория ортогональных многочленов. Обзор достижений отечественной математики/Я.Л. Геронимус.— М.,Л.: Государственной издательство технико -теоретической литературы, 1950.—164 с.
- 3 *Дедус, Ф.Ф.* Обобщенный спектрально - аналитический метод обработки информационных массивов. Задачи анализа изображений и распознавания образов/Под рецензией Ф.Ф. Дедуса/Ф.Ф. Дедус, С.А. Махортых, М.Н. Устинин, А.Ф. Дедус.— М.: Машиностроение, 1999.—357 с.
- 4 *Джексон, Д.* Ряды Фурье и ортогональные полиномы: пер. с англ./Д. Джексон.— М.,Л.: Главное издательство иностранной литературы, 1948.—260 с.
- 5 *Куликовских, И.М.* Построение моделей корреляционно-спектральных характеристик методом аналитических разложений: диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.18 / Куликовских Илона Марковна.— Самара, 2011.— 133 с.
- 6 *Прохоров, С.А.* Аппроксимативный анализ случайных процессов/С.А. Прохоров.—2-е изд., перераб. и доп.— Самара: СНЦ РАН, 2001.—380 с.
- 7 *Прохоров, С.А.* Методы оценки коэффициентов разложения ортогональных рядов/С.А. Прохоров, И.М. Куликовских// Идентификация, измерение характеристик и имитация случайных сигналов (состояние, перспективы развития) (ИИИ'2009): сборник материалов международной конференции. —Новосибирск: НГТУ, 2009. — С. 168-171.
- 8 *Прохоров, С.А.* О некоторых свойствах ортогональности/С.А. Прохоров, И.М. Куликовских// Информатика, моделирование, автоматизация проектирования (ИМАП-2009): сборник научных трудов Российской школы-семинара аспирантов, студентов и молодых ученых. —Ульяновск, 2009. — С. 195-197.
- 9 *Прохоров, С.А.* Ортогональные модели корреляционно - спектральных характеристик случайных процессов. Лабораторный практикум/С.А. Прохоров, И.М. Куликовских.— Самара: СНЦ РАН, 2008.—301 с.
- 10 *Прохоров, С.А.* Погрешность оценки спектра по параметрам аппроксимирующего выражения корреляционной функции/С.А. Прохоров, И.М. Куликов-

- ских//Математическое моделирование и краевые задачи: труды пятой Всероссийской научной конференции с международным участием. – Ч.4.–Самара, 2008. – С. 116-120.
- 11 *Прохоров, С.А.* Применение метода ортогональных разложений для выявления зависимостей между характеристиками ортогональных базисов/ С.А. Прохоров, И.М. Куликовских//Аналитические и численные методы моделирования естественнонаучных и социальных проблем: сборник статей IV Международной научно - технической конференции.—Пенза: Приволжский Дом знаний, 2009. – С. 81-83.
- 12 *Сато, Ю.* Без паники! Цифровая обработка сигналов: пер. с яп. Селиной Т.Г./Ю. Сато.— М.: Додэка-XXI, 2010.—176 с.
- 13 *Суэтин, П.К.* Классические ортогональные многочлены: в 2-х томах/П.К. Суэтин.— М.: Наука, 1976.-Т. 1. –328 с.
- 14 *Тихонов, В.И.* Выбросы траекторий случайных процессов/В.И. Тихонов, В.И. Хименко.— М.: Наука, 1987.—304 с.
- 15 *Ismail, Mourad E.H.* Structure relations for orthogonal polynomials/Mourad E.H. Ismail //Pacific journal of mathematics.–2009.– № 2 (240).—pp. 309-319.
- 16 *Masjed-Jamei, M.* Some new classes of orthogonal polynomials and special functions: a symmetric generalization of Sturm-Liouville problems and its consequences: Ph.D thesis supervised by Professor Wolfram KOEPF/M. Masjed-Jamei.—Germany, University of Kassel, Department of Mathematics, 2006.—120 p.
- 17 *Olver, Frank W.J.* NIST Handbook of Mathematical functions/Frank W.J. Olver, Daniel W. Lozier, Ronald F. Boisvert, Charles W. Clark.—Cambridge University Press, National Institute of Standards and Technology, 2010.—967 p.
- 18 *Szego, G.* Orthogonal polynomials/ G. Szego.—Rhode Island: American Mathematical Society Providence, 1939.—431 p.
- 19 *Totik, V.* Orthogonal polynomials/V. Totik//Surveys in Approximation Theory.–2005.– № 1 (2005).—pp. 70-125.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК